



Le Monografie. Vol 2

Documento di **V**alutazione sui determinanti di **S**alute e sulle **S**trategie del servizio sanitario regionale

La mortalità evitabile in Umbria 1994 - 2004

A cura di:

Servizio II

Programmazione Socio - Sanitaria,
dell'assistenza di base ed ospedaliera
e Osservatorio Epidemiologico Regionale


Università degli Studi di Perugia

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche e Sanità Pubblica.
Sezione di Sanità Pubblica

ReNCaM

Registro Nominativo delle Cause di Morte





Regione Umbria
Assessorato Sanità

Collana:

Le Monografie

Documento di Valutazione sui determinanti di Salute
e sulle Strategie del servizio sanitario regionale

MONOGRAFIA 2:

La mortalità evitabile in Umbria. 1994 - 2004

A cura di:

Antonio Canosa
Liliana Minelli
Fabrizio Stracci
Tiziani Cassetti
Carlo Romagnoli
Francesco La Rosa
Gruppo di Lavoro ReNCaM

Coordinamento generale:

Carlo Romagnoli
Dirigente del Servizio II
Programmazione Socio - Sanitaria, dell'assistenza di base ed ospedaliera e
Osservatorio Epidemiologico Regionale

Coordinamento
tecnico scientifico:

Fabrizio Stracci
Osservatorio Epidemiologico Regionale Umbro
Patrizia Montagnoli
Giuseppina Angellotti - Segreteria tecnica

Edito da:

Agenzia SEDES di Perugia
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia
Direttore Giorgio Bonaduce

Responsabile editoriale:

Giovanni Santoro
Coordinatore Scientifico - Agenzia Sedes

Copyleft DVSS:

All rights reserved to the people
È auspicata la più ampia diffusione della metodologia e dei contenuti del DVSS.
Si ringrazia per la citazione della fonte e degli autori.


Grafica ed impaginazione:

PromoADV - Perugia

Stampa:

Litograf Editor - Città di Castello

PRIMA EDIZIONE: AGOSTO 2006 - PERUGIA



PRESENTAZIONE

Questa monografia del DVSS illustra l'andamento della mortalità evitabile in Umbria dal 1994 al 2004, assunta come indicatore di efficacia pratica del servizio sanitario.

La documentazione dei risultati di salute raggiunti dal nostro SSR sulla base di uno studio programmato dall'Osservatorio epidemiologico regionale e realizzato in questo caso con il contributo determinante del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche e Sanità Pubblica - Sezione di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Perugia, rappresenta:


- > un salto di qualità per la nostra programmazione sanitaria, che dispone ora di approfondite conoscenze per meglio orientare il nuovo ciclo programmatico;*
- > un debito informativo nei confronti dei cittadini che finanziano con i loro contributi il servizio sanitario ed hanno tutto il diritto di conoscere dati sulla sua efficacia globale;*
- > un prezioso elemento di conoscenza e riflessione per le forze politiche, sindacali e per le associazioni di volontariato e del terzo settore, in quanto permettono la formazione di un giudizio più oggettivo e articolato sul funzionamento del SSR e quindi lo sviluppo di proposte sempre più orientate al rispondere in modo efficace, appropriato e sostenibile ai bisogni di salute dei cittadini.*

I risultati qui riportati sono confrontabili sul piano metodologico e concordanti con le valutazioni emerse in altre indagini condotte a livello nazionale, testimoniando così del grado di efficacia pratica che i nostri servizi sanitari raggiungono sia quando confrontati con altri servizi sanitari (saremmo al quinto posto nella graduatoria di efficacia dei servizi sanitari regionali), sia delle variazioni osservate all'interno della nostra regione tra ASL e distretti (dove continuano ad avere migliori risultati le due ASL dei capoluoghi di provincia), sia infine per aree assistenziali dove è possibile osservare, accanto ad andamenti generali soddisfacenti, alcune aree problematiche riferibili sostanzialmente all'eccesso di decessi per overdose.

In conclusione ritengo che su queste basi sia concretamente possibile migliorare il ciclo programmatico e l'attività dei servizi socio sanitari.

Una base eccellente dunque di conoscenze per la redazione del nuovo Piano Sanitario regionale e allo stesso tempo un importante elemento di riflessione per i decisori che dispongono di ulteriori elementi per scegliere ciò che è più efficace per la salute degli Umbri.

Maurizio Rosi
Assessore alla Sanità
Regione Umbria



INTRODUZIONE AL VOLUME

Il presente Rapporto a titolo “Mortalità evitabile in Umbria, 1994-2004”, segue ed è completamento del volume di La Rosa et al. “La mortalità per cause in Umbria, 1994-2004”⁽¹⁾. I dati riportati nella pubblicazione sono quelli raccolti dal Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM) attraverso un flusso informativo, ormai collaudato e validato nel corso degli anni, dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Umbria, gestito dal Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche e Sanità Pubblica – Sezione di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Comuni della Regione stessa. In questo lavoro viene messa sotto osservazione dettagliata la quota evitabile di mortalità, dal livello regionale fino a quello distrettuale, cercando di dimensionare quanta vita potrebbe essere risparmiata attraverso adeguati e possibili interventi, in quali settori ed anche con quale tipologia di interventi. Naturalmente occorre tenere in considerazione due avvertenze, una teorica riguardante la scelta della cause di morte evitabile per settori di intervento, che è continuamente sotto revisione, visto che attiene strettamente all’avanzamento delle conoscenze sulla storia naturale delle malattie e sullo sviluppo scientifico del loro contrasto; l’altra metodologica inherente la bassa numerosità degli eventi - soprattutto quando si scende al livello distrettuale di analisi -, che può portare ad ampie variazioni casuali non facilmente riconducibili alle azioni sanitarie intraprese. Per questo motivo, nella prima parte del rapporto, abbiamo ritenuto utile narrare la storia del concetto di morte evitabile e riportare i principali studi nazionali ed internazionali che su questa problematica sono stati intrapresi. Tenuto conto delle limitazioni accennate, tuttavia ci sembra importante presentare l’analisi della mortalità evitabile come

un ulteriore tassello di conoscenza da utilizzare insieme a tanti altri, per saperne di più sul funzionamento del nostro servizio sanitario e aggiungere valutazioni in grado di contribuire a governare al meglio la sanità.

Sinteticamente, le informazioni principali che emergono sono:

- › la maggior parte della mortalità evitabile in Umbria (circa il 55%) è ricollegabile a cause che possono essere prevenute con interventi mirati alla prevenzione primaria ed al cambiamento degli stili di vita;
- › negli undici anni osservati, la mortalità evitabile complessivamente tende a diminuire, sia nei maschi che nelle femmine;
- › sono i maschi a perdere il maggior numero di anni di vita potenziali. Negli anni 1994-2004 la popolazione maschile tra 5 e 64 anni perde mediamente circa 3000 anni di vita potenziale/anno, mentre la popolazione femminile ne perde mediamente circa 1350/anno;
- › sia nei maschi che nelle femmine, le morti violente (cause esterne di mortalità) sono la principale causa di morte evitabile (nelle classi di età 15-24 anni sono la causa più rilevante di morte prematura). Nei maschi al secondo e terzo posto vi sono le malattie ischemiche del cuore e il tumore maligno del polmone rispettivamente, mentre nelle femmine il tumore maligno della mammella e le malattie ischemiche del cuore;
- › il quadro della mortalità evitabile delle singole ASL e aree distrettuali, pur tenendo conto anche dell’esiguità dei casi osservati, consente di evidenziare differenze geografiche riassumibili in valori leggermente peggiori per le aree territoriali dell’ASL 1 e migliori per quelle delle ASL 2 e 4.

⁽¹⁾ La Rosa F. et al. La mortalità per cause in Umbria. 1994-2004. Regione dell’Umbria, Perugia, 2005.

Indice generale

3	Parte I INTRODUZIONE Il concetto di “mortalità evitabile” Scopo del rapporto
9	Parte II MATERIALI E METODI Fonte dei dati Raccolta e classificazione dei dati Elaborazione dei dati
17	Parte III RISULTATI Analisi degli eventi a livello regionale Mortalità evitabile attraverso interventi di prevenzione primaria (Gruppo I) Mortalità evitabile attraverso interventi di diagnosi precoce (Gruppo II) Mortalità evitabile attraverso interventi di assistenza sanitaria e Igiene (Gruppo III) Mortalità evitabile e YPLL nelle ASL e nei Distretti di base Discussione Conclusioni
53	BIBLIOGRAFIA
55	APPENDICE

A cura di: Antonio Canosa
Liliana Minelli
Fabrizio Stracci
Tiziani Cassetti
Carlo Romagnoli
Francesco La Rosa
Gruppo di Lavoro ReNCaM

Parte I

Introduzione

Il concetto di “mortalità evitabile”

La mortalità evitabile è un indicatore utilizzato per valutare l'efficacia pratica dei sistemi sanitari. Si può affermare, in linea generale, che, in assenza di qualsiasi intervento dei servizi sanitari, la mortalità sarebbe determinata esclusivamente da fattori sociali, ambientali e genetici. I servizi sanitari, pertanto, intervengono per modificare l'influenza di alcuni di tali fattori con l'obiettivo di ridurre la mortalità e la morbosità nella popolazione. La conoscenza medica e le attuali possibilità terapeutiche sono sufficientemente avanzate da poter evitare che un soggetto muoia per determinate patologie, quantomeno in certe fasce d'età. Quindi, l'evitabilità della morte per tali condizioni è il risultato di un intervento sanitario puntuale ed adeguato mentre il verificarsi di casi di morte per cause ritenute evitabili indica qualche disfunzione in uno o più punti del sistema sanitario. Alcuni autori anglosassoni parlano di morti premature evitate data “timely and effective healthcare” (Korda RJ et al., 2006) (16), o considerano la mortalità evitabile come indicatore di “outcome of health care” complessiva (Westerling R et al., 2002) (27bis).

L'analisi dei dati di mortalità evitabile consente di monitorare i servizi sanitari e rappresenta un importante punto di partenza per stabilire gli obiettivi fondamentali da realizzare per implementare l'offerta di interventi. La mortalità evitabile è considerata, dunque, un indicatore sanitario dei bisogni e dei risultati in termini di salute e di qualità della vita che può essere utilizzata dai servizi sanitari. Permette, infatti, di evidenziare alcuni fenomeni più direttamente correlabili al territorio e all'ambiente professionale e/o di vita, all'azione di prevenzione e all'efficacia pratica nell'erogare cure ed assistenza da parte delle aziende sanitarie.

Lo sviluppo del concetto di mortalità evitabile trae origine dall'idea di “evento sentinella” elaborato per la prima volta da Rutstein nel 1976 (24-25). Con il termine di “evento sentinella”, l'Autore intendeva quei casi di malattia, di morte o di alterazione del benessere psichico o fisico per i quali esistevano, almeno a priori, metodiche preventive o diagnostico-terapeutiche potenzialmente in grado di evitarne la

Introduzione

comparsa. In tale ottica, il verificarsi di un “evento sentinella” o l’aumento del numero di eventi riportati poteva essere a tutti gli effetti considerato come un segnale di allarme indicativo della necessità di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria. Rutstein aveva in tal senso proposto una lista di circa 60 condizioni responsabili di malattie evitabili, invalidità evitabili e morti premature evitabili ed aveva definito di conseguenza tre differenti categorie di “eventi sentinella”. La prima categoria comprende quegli eventi che non si sarebbero dovuti verificare perché esistono metodiche ben note e di uso consolidato per evitarne l’insorgenza, per cui il verificarsi anche di un caso solo richiede una valutazione delle cause che lo hanno reso possibile. La seconda categoria è rappresentata dagli eventi per i quali, pur esistendo tecniche ben note di prevenzione o terapie adeguate, non si può considerarne realistica la totale eliminazione. L’ultima categoria è formata da quegli eventi capaci di incidere pesantemente sulla salute per i quali sono conosciute metodiche di intervento efficaci ma per i quali non esiste ancora una possibilità di prevenzione certa. Attraverso questo tipo di approccio era possibile una valutazione della qualità dei servizi e si potevano altresì effettuare dei confronti tra le diverse popolazioni. La predisposizione, inoltre, di apposite liste di “eventi sentinella” permetteva un coinvolgimento degli operatori di Sanità Pubblica nell’individuazione delle priorità sulle quali orientarsi e dei fenomeni da monitorare, consentendo di adeguare lo strumento alle specificità delle diverse realtà territoriali. Dalla lista originale di Rutstein sono state elaborate diverse classificazioni delle cause di morte evitabile. Il concetto, infatti, fu sviluppato ulteriormente da Charlton, Hartley, Silver e Holland (8), da Charlton e Velez (10) e da Charlton, Lakhani e Aristidou (9) che utilizzarono una selezione di cause di morte dalla lista di Rutstein (tabella 1) e per primi coniarono il termine di “mortalità evitabile”. Nella loro analisi, condotta in Inghilterra e Galles, Charlton e coll. esclusero quelle condizioni il cui controllo dipendeva dalla prevenzione primaria, in quanto non considerate sotto l’influenza del servizio sanitario, e presero in considerazione complessivamente 14 cause evitabili.

Sempre traendo spunto dal modello di Rutstein, nel 1983 sono stati costituiti gruppi di lavoro europei sulle “morti evitabili” tra i quali il “Preventable and Manageable Disease Working Group”, coordinato da W.W. Holland e finanziato dalla Comunità Economica Europea, finalizzato ad identificare aree geografiche dove l’efficacia dei servizi sanitari poteva essere insoddisfacente. Questo gruppo di lavoro ha prodotto due Atlanti Europei di mortalità evitabile riguardanti rispettivamente gli anni 1974-78 e 1979-84, relativi ai Paesi membri della CEE, nei quali vengono analizzate le differenze geografiche internazionali ed intranazionali esistenti nell’ambito della Comunità Europea (12-14). Nella realizzazione di questo studio, Holland e coll.

crearono una lista di cause di mortalità evitabili alternativa a quella stilata da Charlton. Holland, infatti, seguì il sistema di Rutstein dividendo le cause di mortalità evitabile in due gruppi, rappresentati rispettivamente da “medical care indicators” e “health policy indicators”. I primi erano una selezione di cause tratte dalla lista di Rutstein, mentre gli altri comprendevano il tumore del polmone, la cirrosi epatica e gli incidenti con mezzi di trasporto. Queste cause di morte erano viste come indicatori dell’efficacia delle campagne informative sui rischi correlati all’abuso di bevande alcoliche, al fumo di sigaretta e alla guida imprudente (tabella 2). Rispetto alla classificazione di Charlton, quella di Holland è sicuramente più ampia e comprende un maggior numero di decessi attribuibili a cause evitabili.

In un altro studio in cui Humblet e coll., analizzano l’andamento della mortalità evitabile in Belgio tra il 1974 ed il 1994, viene proposta un’ulteriore suddivisione delle cause di mortalità evitabile (15) (tabella 3). Humblet, infatti, distingue le cause di mortalità evitabile in due principali categorie. Il primo gruppo comprende le cause riconducibili alla Prevenzione (Preventive indicators), mentre il secondo quelle associate al Trattamento (Curative indicators). Prendendo in considerazione tutti i decessi per cause evitabili, gli Autori calcolano il tasso standardizzato di anni di vita potenziali persi (YPLL), un indicatore che misura il numero complessivo di anni di vita persi a causa di una morte prematura.

Tra le varie classificazioni proposte va, infine, ricordata quella utilizzata da Simonato e coll. in uno studio, pubblicato nel 1998, finalizzato ad analizzare l’andamento della mortalità evitabile in 21 nazioni europee tra il 1955 ed il 1994 (26). In questa classificazione, sono state incluse alcune delle cause della lista originale di Rutstein e quelle indicate da Charlton e Holland, ad eccezione delle anemie carenziali; inoltre sono state inserite altre condizioni non indicate in precedenti classificazioni (tumori delle alte vie aeree e del tratto digestivo, del fegato, della vescica e della mammella femminile, leucemie e morti violente) (tabella 4). Le 24 cause di morte evitabili così individuate sono state quindi distinte in tre gruppi principali in base alle prestazioni sanitarie attuabili per evitarle. Il primo gruppo, denominato “Prevenzione Primaria”, fa riferimento a quelle cause di morte che potrebbero essere evitate riducendone l’incidenza, ovvero in seguito all’adozione di normative, comportamenti individuali e collettivi e stili di vita inquadrabili nell’ambito della prevenzione primaria. Questo gruppo comprende condizioni la cui eziologia è in parte attribuibile allo stile di vita, soprattutto al consumo eccessivo di alcool associato al fumo di sigaretta (disturbi circolatori dell’encefalo, neoplasie delle prime vie digestive e del tratto respiratorio, del polmone, della vescica e del fegato) a altre condizioni principalmente associate all’abuso di bevande alcoliche (malattie croniche del fegato). In aggiunta, molti tumori facenti parte di questo gruppo hanno

anche un'eziologia occupazionale (fegato, vescica, polmone). Il primo gruppo comprende anche cause violente (avvelenamenti, traumatismi, incidenti) che potrebbero essere prevenute mediante l'eliminazione o la riduzione dell'esposizione ai fattori di rischio (rispetto dei limiti di velocità, utilizzo delle cinture di sicurezza, del casco, ecc...). Il secondo gruppo, definito "Diagnosi e trattamento precoce" comprende tutte quelle cause di morte per la maggior parte evitabili con interventi di prevenzione secondaria, cioè con metodiche diagnostiche ed interventi terapeutici precoci. Questo gruppo comprende i tumori della mammella e della cervice uterina, per i quali sono disponibili su vasta scala programmi di screening di comprovata efficacia ed il melanoma maligno della cute che, per la sede, può essere agevolmente individuato in fase precoce e successivamente trattato in maniera adeguata. I tumori del corpo uterino e quelli dell'utero non specificati sono altresì compresi in questo gruppo perché spesso difficilmente distinguibili dalle neoplasie della cervice a causa di imprecisioni nella classificazione. A questo gruppo appartengono inoltre i tumori del testicolo ed il linfoma di Hodgkin per i quali sono ampiamente disponibili terapie adeguate ed efficaci. Al terzo gruppo, denominato "Assistenza sanitaria ed Igiene", appartiene un insieme eterogeneo di malattie evitabili migliorando le prestazioni sanitarie di tipo

terapeutico ed assistenziale.

Rientrano in questa categoria, tra gli altri, i decessi per malattie infettive, evitabili attraverso l'impostazione di un'adeguata terapia antibiotica, tramite la vaccinazione e grazie alla disponibilità di acqua e cibo non contaminati. Fanno parte di questo gruppo anche altre condizioni, come quelle che richiedono interventi chirurgici e terapie mediche (ipertensione arteriosa, ulcera peptica, appendicite, ernia, colelitiasi), patologie il cui trattamento presuppone una perfetta integrazione all'interno del sistema sanitario, comprendente un'appropriata diagnosi, un tempestivo trasporto in ospedale, un'adeguata assistenza ed un'appropriata terapia medica o chirurgica.

Scopo del rapporto

Il presente studio esamina la mortalità evitabile nella popolazione residente in Umbria, per l'arco di tempo 1994-2004, con l'obiettivo di valutare il contributo complessivo del sistema di assistenza sanitaria regionale nel declino dell'indicatore considerato nel passato decennio e di evidenziare eventuali differenze geografiche intraregionali, a livello di Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Distretti Sanitari di Base (DSB).

Introduzione

TABELLA 1. Classificazione di Charlton (10)

	Età	ICD - 9
Tubercolosi	5-64	010-019
Cardiopatia reumatica cronica	5-44	393-398
Ernia addominale	5-64	550-553
Appendicite	5-64	540-543
Colecistite e colelitiasi	5-64	574-575
Asma	5-49	493
Malattia di Hodgkin	5-34	201
Morti materne	10-44	630-678
Tumore della cervice uterina	5-64	180
Ipertensione arteriosa	5-64	401-405
Polmonite e bronchite	5-49	480-483,485-486,490
Malattie respiratorie acute	5-49	487
Anemie carenziali	5-64	280-281
Infezioni batteriche	5-64	004-009, 020-034, 320-322, 381-383, 390-392, 680-686, 711-730

TABELLA 2. Classificazione di Holland (12)

	Età	ICD - 9
Tubercolosi	5-64	010-019
Cardiopatia reumatica cronica	5-44	393-398
Ernia addominale	5-64	550-553
Appendicite	5-64	540-543
Colecistite e colelitiasi	5-64	574-575
Asma	5-44	493
Malattia di Hodgkin	5-64	201
Morti materne	Tutte	630-678
Tumore della cervice uterina e del corpo dell'utero	15-64	179, 180, 182
Ipertensione e malattie cerebrovascolari	35-64	401-405, 430-438
Malattie respiratorie	1-14	460-519
Pertosse	0-14	033
Osteomielite	1-64	720
Tetano	0-64	037
Morbillo	1-14	055
Tifo	5-64	001
<i>Health policy indicators</i>		
Cirrosi epatica	15-64	162
Tumore della trachea, dei bronchi e del polmone	5-64	571

TABELLA 3. Classificazione di Humblet (15)

	ICD - 8	ICD - 9
<i>Curative indicators</i>		
Tubercolosi	010-019	010-018,137
Tumori maligni della mammella	174	174
Tumori maligni delle cervice/del corpo dell'utero	180,182	179-180,182
Tumori maligni del testicolo	186	186
Malattia di Hodgkin	201	201
Cardiopatia reumatica cronica	393-398	393-398
Ipertensione e malattie cerebrovascolari	400-404,430-438	401-405,430-438
Asma	493	493
Ulcera peptica	531-534	531-534
Appendicite	540-543	540-543
Ernia addominale	550-553	550-553
Colecistite e colelitiasi	574-575	574-575.1,576.1
Mortalità materna	630-678	630-676
<i>Preventive indicators</i>		
Tumori maligni della trachea,dei bronchi e del lmone	162	162
Tumori maligni della cute (non melanoma)	173	173
Cardiopatia ischemica	410-414	410-414,429.2
Cirrosi epatica	571	571
Incidenti con mezzi di trasporto	E810-823	E810-825

Introduzione

TABELLA 4. Classificazione di Simonato (26)

Cause di morte	ICD-7	ICD-8	ICD-9
Gruppo 1 <i>Cause evitabili attraverso la prevenzione primaria</i>			
Tumori maligni delle alte vie respiratorie e del tratto digestivo	140-150,161	140-150,161	140-150,161
Tumori maligni del fegato	155	155	155.0
Tumori maligni della trachea, dei bronchi e del polmone	162-163	162	162
Tumori maligni della vescica	181	188	188
Disturbi circolatori dell'encefalo	330-334	430-438	430-438
Malattie croniche del fegato e cirrosi	581	571	571
Incidenti e avvelenamenti	800-899	800-999	800-999
Gruppo 2 <i>Cause evitabili attraverso la diagnosi precoce</i>			
Neoplasie maligne della pelle (melanoma e non-melanoma)	190-191	172-173	172-173
Neoplasie maligne della mammella femminile	170	174	174
Neoplasie maligne della cervice uterina	171	180	180
Neoplasie maligne dell'utero	172-174	182	179,182
Gruppo 3 <i>Cause evitabili attraverso l'assistenza sanitaria e l'igiene</i>			
Infezioni e malattie parassitarie	001-138	000-136	001-139
Tumori maligni del testicolo	178	186	186
Malattia di Hodgkin	201	201	201
Leucemie	204	204-207	204-208
Cardiopatia reumatica cronica	410-416	393-398	393-398
Iipertensione	440-447	400-404	401-405
Malattie dell'apparato respiratorio	470-527	460-519	460-519
Ulcera gastrica e duodenale	540-541	531-533	531-533
Appendicite	550-553	540-543	540-543
Ernia addominale	560-561,570	550-553,560	550-553
Colelitiasi e altre malattie biliari	584-585	574-575	574-575.1
Mortalità materna	640-689	636-678	630-676

Parte II

Materiali e Metodi

Fonte dei dati

a. Dati di mortalità

I dati di mortalità sono stati acquisiti dal Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM). Questo flusso per la rilevazione dei dati di mortalità dei propri residenti è stato istituito dalla Regione Umbria dalla seconda metà degli anni ottanta. Per la dichiarazione della causa di morte sono in uso quattro modelli predisposti dall'ISTAT, due per i morti oltre il primo anno di vita ("D4" per maschio e "D5" per femmina) e 2 per i morti nel primo anno di vita ("D4 bis" per maschio e "D5 bis" per femmina). La scheda è composta da due parti, la parte A è compilata dal medico curante (di famiglia o ospedaliero) o dal medico necroscopo, questo nel caso in cui la morte sia avvenuta senza assistenza medica. La parte B viene compilata successivamente dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. Il Comune separa le due copie della scheda e ne invia rispettivamente una all'ISTAT attraverso le Prefetture e gli uffici provinciali dell'ISTAT e l'altra all'Azienda Sanitaria dove è avvenuta la morte. La trasmissione della copia all'Azienda Sanitaria da parte dei Comuni deve avvenire, per legge, entro trenta giorni dalla data del decesso. Qualora i deceduti fossero residenti in un'Azienda Sanitaria diversa da quella in cui è avvenuta la morte, sarà quest'ultima ad inviare, entro ulteriori trenta giorni, copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria di residenza. Ogni Azienda Sanitaria ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato, per ogni Comune incluso nel proprio territorio, un registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. In Umbria tali registri sono attualmente tenuti presso i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. Ognuna delle Aziende Sanitarie,

Materiali e Metodi

trasmette al ReNCaM copia delle schede di morte relative ai deceduti nel proprio territorio di competenza, con una periodicità mensile. Le schede che giungono al ReNCaM ogni anno sono circa 9500. Il materiale arrivato al ReNCaM dalle Aziende Sanitarie viene inizialmente controllato sotto il profilo della completezza e ad ogni scheda viene assegnato un numero progressivo che, insieme all'anno di morte, identifica ogni singolo documento dell'archivio. La causa di morte viene codificata seguendo le regole di selezione e codifica della Classificazione Internazionale delle Malattie, dei Traumatismi e delle Cause di Morte, pubblicata dall'OMS. Delle schede che, dopo i controlli di completezza, risultino presentare parti mancanti o illeggibili sono richieste nuove fotocopie all'Azienda Sanitaria. In ogni record individuale vengono registrati i seguenti dati:

Dati registrati nel record individuale
<ul style="list-style-type: none"> · Cognome e Nome · Data di nascita (gg/mm/aaaa) · Sesso · Comune di morte (codice ISTAT) · Data di morte (gg/mm/aaaa) · Luogo di morte · Comune di nascita (codice ISTAT) · Comune di residenza · Causa di morte · Cause di morte violenta (codice E) · Seconda causa di morte · Codice fiscale

Terminato l'inserimento di tutti i certificati di morte relativi all'anno in oggetto vengono effettuati controlli volti a verificare la completezza e la qualità dei dati inseriti.

Le Anagrafi comunali dei 92 Comuni umbri inviano al ReNCaM l'elenco dei propri deceduti. In questo modo è possibile incrociare i dati con quelli forniti dalle Aziende Sanitarie, verificare l'eventuale esistenza di incongruenze ed effettuare le correzioni in base al dato dell'anagrafe comunale. La qualità dei dati viene verificata anche attraverso il confronto con i dati ISTAT. Terminata l'archiviazione ed il controllo di qualità dei dati inseriti, l'archivio viene generalmente considerato chiuso (figura 1). Il flusso informativo così prodotto contiene l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte, divisi per ogni singolo comune. Ad ogni ASL viene quindi riconsegnata la parte di archivio nominativo che comprende i propri residenti, implementato con le informazioni aggiuntive per qualità e quantità scaturite dal linkage effettuato. Il ReNCaM produce e pubblica i dati riepilogativi di mortalità generale suddivisi per causa, per sesso e classi di età, riferiti ai singoli comuni o alle varie ASL.




FIGURA 1 - Flusso dei dati relativi ai decessi dei residenti in Umbria e al Registro Nominativo delle Cause di Morte.

b. Dati di popolazione

I dati sulla popolazione utilizzata come denominatore per il calcolo dei tassi fanno riferimento alla popolazione residente e, similmente ai dati sui decessi, sono distinti per sesso, classi di età quinquennale, provincia e regione.

L'analisi della mortalità evitabile ha riguardato l'intero territorio regionale, le quattro Aziende Sanitarie Locali (ASL) e i dodici Distretti Sanitari di Base (DSB) (tabella 5) in cui l'Umbria è suddivisa, al 31.12.2005.

TABELLA 5. Comuni della Regione dell'Umbria aggregati per Azienda Sanitaria Locale (ASL) e Distretto sanitario di base (DSB).

ASL 1 DSB 1	ASL 1 DSB 2
054011 Citerna	054016 Costacciaro
054013 Città di Castello	054019 Fossato di Vico
054025 Lisciano Niccone	054023 Gualdo Tadino
054032 Monte Santa Maria Tiberina	054024 Gubbio
054033 Montone	054046 Scheggia e Pascelupo
054041 Pietralunga	054049 Sigillo
054044 San Giustino	
054056 Umbertide	

ASL 2 DSB 1	ASL 2 DSB 2	ASL 2 DSB 3	ASL2 DSB 4
054015 Corciano	054001 Assisi	054014 Collazzone	054009 Castiglione del Lago
054039 Perugia	054002 Bastia	054017 Deruta	054012 Città della Pieve
054053 Torgiano	054003 Bettuna	054020 Fratta Todina	054026 Magione
	054006 Cannara	054027 Marsciano	054036 Paciano
	054057 Valfabbrica	054028 Massa Martana	054037 Panicale
		054029 Monte Castello Vibio	054038 Passignano sul Trasimeno
		055030 San Venanzo	054040 Piegaro
		054052 Todi	054055 Tuoro sul Trasimeno

Materiali e Metodi

Segue TAB. 5

ASL 3 DSB 1	ASL 3 DSB 2	ASL 3 DSB 3
054007 Cascia	054005 Campello sul Clitunno	054004 Bevagna
054010 Cerreto di Spoleto	054008 Castel Ritaldi	054018 Foligno
054031 Monteleone di Spoleto	054021 Giano dell'Umbria	054022 Gualdo Cattaneo
054035 Norcia	054051 Spoleto	054030 Montefalco
054042 Poggiodomo		054034 Nocera Umbra
054043 Preci		054048 Sellano
054045 Sant'Anatolia di Narco		054050 Spello
054047 Scheggino		054054 Trevi
054058 Vallo di Nera		054059 Valtopina

ASL 4 DSB 1	ASL 4 DSB 2	ASL4 DSB 3
055001 Acquasparta	055003 Alviano	055002 Allerona
055005 Arrone	055004 Amelia	055007 Baschi
055012 Ferentillo	055006 Attigliano	055009 Castel Giorgio
055019 Montefranco	055033 Avigliano Umbro	055010 Castel Viscardo
055027 Polino	055008 Calvi dell'Umbria	055011 Fabro
055029 San Gemini	055014 Giove	055013 Ficulle
055031 Stroncone	055015 Guardea	055018 Montecchio
055032 Terni	055016 Lugnano in Teverina	055020 Montegabbione
	055017 Montecastrilli	055021 Monteleone D'Orvieto
	055022 Narni	055023 Orvieto
	055024 Otricoli	055025 Parrano
	055026 Penna in Teverina	055028 Porano

Raccolta e classificazione dei dati

Tutti i dati inerenti i casi di morte e quelli demografici sono stati acquisiti per i trienni 1994-97, 1997-1999, 2000-02 e per il biennio 2003-2004. Il raggruppamento in trienni/biennio è stato deciso per ovviare, in primo luogo, al problema della ridotta numerosità nelle frequenze dei decessi registrabili per alcuni gruppi di cause e quindi per rendere i tassi più stabili, e anche in considerazione dell'evoluzione generalmente lenta del fenomeno in studio, la quale avrebbe reso meno evidenti variazioni su scala annua.

Le cause di morte sono state classificate secondo il “Manual of the International Statistical Classification of Diseases and Causes of Death” IX revisione (ICD IX) del 1975 e X revisione (ICD X) del 1992 (28-29). Tra tutti i decessi occorsi nel periodo 1994-2004 sono stati quindi analizzati solo quelli dovuti alle cause di morte evitabile mostrate in tabella, aggregate, nel loro insieme, in tre grandi gruppi secondo le caratteristiche di prevenibilità dei fenomeni morbosì (tabella 6). Più precisamente, in base alla tipologia di intervento sanitario sono stati distinti:

1. Gruppo I: cause di morte evitabili attraverso la prevenzione primaria (Prevenzione Primaria).

2. Gruppo II: cause di morte evitabili attraverso la diagnosi precoce e la conseguente terapia efficace (Diagnosi Precoce).

3. Gruppo III: cause di morte evitabili attraverso l'assistenza sanitaria e le misure di igiene (Assistenza Ospedaliera e Territoriale e Igiene).

Le cause incluse comprendono quelle proposte da Simonato et al., alle quali sono state aggiunte altre condizioni considerate evitabili. In particolare, nel primo gruppo, sono state inserite la farmacodipendenza e le patologie correlate a dipendenza da alcool in quanto si tratta di cause in cui hanno un peso rilevante gli interventi di prevenzione primaria. Nel gruppo della Diagnosi Precoce sono stati aggiunti i tumori del colon-retto per i quali esiste la possibilità di effettuare lo screening con interventi di comprovata efficacia; nel terzo gruppo è stata aggiunta la sindrome da immunodeficienza acquisita. Per le diverse cause prese in esame sono state considerate le morti avvenute in età 5-64 anni, tranne che per le morti violente (tutte le età) e per le leucemie infantili (0-14).

TABELLA 6. Classificazione utilizzata

I Gruppo – Prevenzione Primaria			
Cause di morte	ICD IX	ICD X	Età
Tumori maligni prime vie aereo-digestive	140-150	C00-C15	5-64
Tumori maligni del fegato	155	C22	5-64
Tumore maligno della laringe	161	C32	5-64
Tumori maligni trachea, bronchi, polmone	162	C33-34	5-64
Tumore maligno della vescica	188	C67	5-64
Disturbi circolatori dell'encefalo	430-438	I60-I69	5-64
Cirrosi epatica	571	K70-76	5-64
Morti violente	E800-E999	V01-Y98	0-ω
› Incidenti da mezzi di trasporto	E800-E829	V01-V99	0-ω
› Omicidi	E960-E969	X85-Y09	0-ω
› Suicidi	E950-E959	X60-X84	0-ω

Materiali e Metodi

Segue TAB. 6

I Gruppo – Prevenzione Primaria			
Cause di morte	ICD IX	ICD X	Età
Overdose (farmacodipendenza)	304-305	F11-F19	5-64
Alcoolismo e psicosi alcoliche	291.9	F10.5	5-64
Dipendenza dall'alcool	303	F10.0	5-64
II Gruppo – Diagnosi precoce			
Cause di morte	ICD IX	ICD X	Età
Tumori maligni della pelle	172-173	C43-C44	5-64
Tumori maligni della mammella	174	C50	5-64
Tumore maligno del collo dell'utero	180	C53	5-64
Tumore maligno del corpo dell'utero	182	C54	5-64
Tumore maligno dell'utero n.s.	179	C55	5-64
Tumori maligni del colon	153	C18-19	5-64
Tumori maligni del retto	154	C20-C21	5-64
III Gruppo-Assistenza ospedaliera e territoriale e Igiene			
Cause di morte	ICD IX	ICD X	Età
Malattie infettive	001-139	A00-B99	5-64
AIDS	279.1	B24	5-64
Malattia di Hodgkin	201	C81	5-64
Tumore maligno del testicolo	186	C62	5-64
Leucemie	204-208	C91-C95	0-14
Cardiopatia reumatica cronica	393-398	I05 -I09	5-64
Ipertensione	401-405	I10-I15	5-64
Malattie ischemiche del cuore	410-414	I20-I25	5-64
Polmoniti, bronchiti, mal.respiratorie acute	480-486	J10-J22	5-64
BPCO	490-496	J40-J47	5-64
Ulcera peptica	531-534	K25-K28	5-64
Appendicite	540-543	K35-K38	5-64
Ernia addominale	550-553	K40-K46	5-64
Colecistite acuta e cronica	574-575	K80-K82	5-64
Gravidanza, parto e puerperio	630-676	O00-O99	15-49

Elaborazione dei dati

Per ciascuna causa di mortalità evitabile sono stati calcolati:

- › numero assoluto dei decessi;
- › tassi di mortalità grezzi e standardizzati (con la popolazione italiana);
- › anni di vita potenziali persi (YPLL: Years Potential Life Lost) complessivi;
- › tassi standardizzati di YPLL;
- › rapporto standardizzato di mortalità
- › variazioni percentuali.

Il denominatore utilizzato per il calcolo dei tassi è stato stimato utilizzando la popolazione residente alla metà del triennio considerato.

Di seguito sono riportati gli indicatori adottati ed il loro significato.

Número assoluto dei decessi: numero complessivo degli eventi morte nella popolazione umbra (per sesso, classe di età, settore nosologico o causa selezionata). La semplice rilevazione del numero di decessi come misura della frequenza dell'“evento morte” rappresenta, in realtà, un'informazione generica non sufficiente a descrivere il fenomeno. Nonostante ciò, il numero di morti per alcune cause e la relativa proporzione sulla totalità dei decessi, in particolare per patologie ad elevata letalità e a bassa sopravvivenza, è un elemento sicuramente rilevante per la programmazione ed il dimensionamento di alcuni servizi sanitari in quanto può orientare in modo attendibile sulla diffusione di tali malattie. Inoltre la conoscenza del numero totale dei decessi in un determinato arco temporale è necessaria per la valutazione del volume di attività lavorativa richiesta ai servizi sanitari.

Tasso grezzo di mortalità: è definito come il numero totale delle morti in un anno diviso il numero totale dei soggetti componenti la popolazione a metà anno, prendendo come riferimento l'anno centrale del triennio.

Tassi specifici di mortalità: i tassi vengono calcolati come i tassi grezzi ma limitatamente a categorie particolarmente importanti nella dinamica della mortalità (età, sesso, causa di morte).

Tasso standardizzato di mortalità: in questo caso si adottano tecniche statistiche che permettono di confrontare appropriatamente popolazioni che possono differire in modo sostanziale in relazione alle caratteristiche demografiche

(età, sesso). Tra le tecniche di standardizzazione le più frequentemente utilizzate nell'analisi della mortalità sono quelle basate sul metodo diretto e sul metodo indiretto. In entrambe le circostanze è necessario scegliere una popolazione standard, che in questo studio è rappresentata dalla popolazione italiana e da quella umbra. Nel caso specifico del metodo diretto alla popolazione standard prescelta verranno applicati i tassi specifici per età e sesso delle varie popolazioni a confronto. Nel caso del metodo indiretto, invece, la popolazione standard fornisce i tassi specifici da applicare alle popolazioni a confronto in modo da ottenere un numero di casi attesi da rapportare ai casi osservati. Con questo ultimo metodo si otterrà il cosiddetto Rapporto Standardizzato di Mortalità.

YPLL (Years of Potential Life Lost): definiti come anni di vita potenzialmente perduti, si misurano calcolando la differenza tra l'età reale alla morte di ciascun individuo deceduto nell'anno o nel periodo in studio e l'età media alla morte della popolazione di riferimento nello stesso periodo di tempo. In questo studio il valore di età preso come riferimento è pari a 65 anni. È stato scelto il compimento dei 65 anni come limite massimo di età, come effettuato da altri Autori, in quanto l'accuratezza nella certificazione delle cause di morte è maggiore in questi soggetti e diminuisce con l'aumentare dell'età; inoltre è possibile che interventi sanitari di per sé efficaci siano inapplicabili o abbiano minore effetto in soggetti con scadenti condizioni di salute, maggiormente frequenti in età più avanzata anche a causa di altre malattie eventualmente presenti. In generale gli YPLL sono utilizzati per enfatizzare le morti in giovane età. In questo caso si pesano in maggiore misura i casi di decesso tra i giovani rispetto agli anziani; in effetti si tratta di un indicatore di mortalità prematura che evidenzia l'importanza di quelle cause di morte che sottraggono alle persone molti anni di vita potenziale in confronto ad altre cause che, anche se molto diffuse, colpiscono generalmente la popolazione più anziana. A questo schema generale fanno eccezione le cause di morti violente valutate globalmente (0-85+anni) e le leucemie infantili (0-14 anni). È stato inoltre scelto di non valutare la mortalità in età inferiore a 5 anni perché solo su alcune delle cause di decesso di questa fascia di età influiscono cause esterne note, potenzialmente eliminabili.

Tassi di YPLL: corrispondono al rapporto tra gli YPLL totali e la popolazione in età inferiore a 65 anni nel periodo considerato. Attraverso questo indicatore è possibile effettuare confronti geografici e temporali.

Rapporto standardizzato di mortalità (SRR%): esprime il rapporto percentuale tra il tasso standardizzato (con il metodo diretto) relativo all'ambito territoriale esaminato ed il tasso umbro.

Parte III

Risultati

Analisi degli eventi a livello regionale.

Mortalità evitabile.

Nel triennio 1994-1996 si sono verificati 3461 decessi per cause evitabili (maschi 2265, femmine 1196), su un totale di 27605 morti (maschi 14551, femmine 13054). La mortalità evitabile, pertanto ha contribuito nell'ambito della mortalità generale per il 12,53% (maschi 15,56%, femmine 9,16%). Nel triennio 1997-1999 le morti evitabili sono state 3120 (maschi 2098, femmine 1022) su un totale di 28850 decessi (maschi 14735, femmine 13815), con una mortalità evitabile pari all'10,92% (maschi 14,23%, femmine 7,39%). Nel triennio 2000-2002 i morti per cause evitabili sono stati 2698 (maschi 1834, femmine 864) su un totale di 27977 decessi (maschi 14286, femmine 13691); in questo caso la mortalità evitabile ha contribuito alla mortalità generale per il 9,64% (maschi 12,83%, femmine 6,31%). Nel biennio 2003-2004 si sono verificati 1808 decessi per cause evitabili (maschi 1162, femmine 646), su un totale di 18811 morti (maschi 9602, femmine 9209), per una mortalità evitabile pari al 9,61% (maschi 12,10%, femmine 7,00%) (figura 2).

In sintesi, dunque, le morti evitabili in Umbria oscillano intorno a mille casi/anno; sono più frequenti nel sesso maschile rispetto a quello femminile; nel corso del tempo considerato si è avuta una riduzione costante e progressiva delle morti evitabili nel sesso maschile, mentre nel sesso femminile dopo un primo decremento il dato nell'ultimo biennio sembra stabilizzarsi.

Se si analizzano i tassi standardizzati di mortalità evitabile per i singoli gruppi di cause (figura 3) si evidenzia che, in entrambi i sessi, al primo posto per frequenza figurano le condizioni appartenenti al gruppo definito "cause di morte evitabili attraverso la prevenzione primaria". Nei maschi, al secondo posto per frequenza si collocano le cause del gruppo "assistenza sanitaria e igiene" seguite, in ultimo, da quelle evitabili attraverso la diagnosi precoce e terapia. Viceversa, nelle femmine, al secondo posto troviamo le cause di morte del gruppo "diagnosi precoce", mentre quelle evitabili mediante un'adeguata assistenza sanitaria e attraverso le misure di igiene sono le meno frequenti. Tale differenza può essere

Risultati

verosimilmente spiegata sulla base del fatto che il secondo gruppo di cause comprende due neoplasie proprie del sesso femminile, ovvero il carcinoma della mammella e il carcinoma uterino, che pur essendosi numericamente ridotti nel tempo, continuano a svolgere un ruolo di primo piano tra le cause di mortalità evitabile. In entrambi i sessi, la riduzione maggiore di morti evitabili si è avuta nell'ambito delle cause incluse nel primo gruppo della classificazione.

Nel sesso maschile il tasso standardizzato di mortalità evitabile riferito a 100000 residenti per cause appartenenti al primo gruppo corrisponde, rispettivamente a 119,7 nel triennio 1994-1996, a 109,3 nel triennio 1997-1999, a 96,5 nel periodo 2000-2002 e a 90,2 nel biennio 2003-2004. Le cause del gruppo "assistenza sanitaria e misure di igiene" determinano tassi di mortalità pari a 58,8 nel periodo 1994-1996, a 54,5 nel triennio successivo, a 47,1 nel triennio 2000-2002 e a 41,2 negli anni 2003-2004. Per entrambi i gruppi di cause pertanto, è riscontrabile un graduale e progressivo decremento nel tempo, che sta ad indicare un sostanziale miglioramento dell'assistenza sanitaria ed una reale efficacia degli interventi di prevenzione primaria. Per le cause facenti parte del secondo gruppo della classificazione, che complessivamente sono quelle ad incidere in misura minore nella mortalità evitabile del sesso maschile, si osserva un andamento dei tassi caratterizzato da una corrispondenza tra il valore iniziale e quello finale (pari a 11,2 nel triennio 1994-1996 e nel biennio 2003-2004).

Nel sesso femminile, il tasso standardizzato di mortalità evitabile per cause appartenenti al primo gruppo corrisponde, rispettivamente a 34,6 nel triennio 1994-1996, a 31,3 nel triennio 1997-1999, a 27,9 nel periodo 2000-2002 e a 25,8 nel biennio 2003-2004, con una progressiva riduzione nel tempo.

Le cause del gruppo "assistenza sanitaria e misure di igiene", che nel sesso femminile figurano al terzo posto in ordine di frequenza, determinano tassi di mortalità pari a 19,3 nel periodo 1994-1996, a 17,2 nel triennio successivo, a 14,3 negli anni 2000-2002 e a 16,0 nel biennio 2003-2004. Per le cause facenti parte del secondo gruppo della classificazione, che nel sesso femminile si collocano al secondo posto in ordine di frequenza, i tassi passano da 30,6 nel triennio iniziale, a 25,5 negli anni 1997-1999, per poi aumentare di nuovo a valori di 26,4 nel triennio 2000-2002 fino a diminuire nuovamente nel biennio conclusivo.

Anni di vita potenziali persi (YPLL)

Per quanto concerne il dato relativo al numero assoluto di Anni di vita potenziali persi (YPLL, years potential life lost), si evidenzia che nel primo triennio questi ammontano

complessivamente a 12349 di cui 8509 nei maschi e 3840 nelle femmine. Nel secondo triennio il totale di YPLL è stato pari a 11236 (maschi 7727, femmine 3509), mentre nel triennio 2000-2002 gli anni di vita potenziali persi sono stati in tutto 10046 (maschi 6944, femmine 3102). Nel biennio 2003-2004 il numero assoluto di anni di vita potenziali persi è stato pari a 9561, di cui 6407 nei maschi e 3154 nelle femmine. Dal confronto tra i due sessi, emerge che gli YPLL sono oltre due volte più elevati nei maschi rispetto alle femmine, con una differente distribuzione nei tre gruppi di cause di mortalità evitabile. In figura 4 è rappresentata la composizione percentuale degli YPLL per gruppi di cause, nei vari periodi di osservazione e nei due sessi.

I tassi standardizzati di YPLL (per 100.000) nei maschi, per le cause di morte evitabile appartenenti al primo gruppo, equivalgono a 1761,1 nel triennio 1994-1996, a 1612,8 nel triennio successivo, a 1565,8 nel triennio 2000-2002 e 1397,3 nell'ultimo biennio. Relativamente alle cause del secondo gruppo, i tassi di YPLL corrispondono a 88,2 nel primo triennio, 106,0 nel secondo triennio, 81,2 nel triennio 2000-2002 e 107,5 nel biennio 2003-2004. Infine, sempre nel sesso maschile, i tassi di YPLL per quanto concerne le cause di morte evitabile facenti parte del gruppo "assistenza sanitaria ed igiene" sono pari a 693,3 nel triennio 1994-1996, a 566,9 nel triennio successivo, a 485,2 nel triennio 2000-2002 e 392,4 nel biennio 2003-2004 (figura 5).

Nelle femmine, i tassi standardizzati di YPLL relativi al primo gruppo di cause corrispondono a 563,2 nel primo triennio, 575,4 nel secondo, 478,8 in quello 2000-2002 ed infine 448,9 nel biennio 2003-2004. Per quanto riguarda i tassi standardizzati di YPLL del secondo gruppo di cause, questi sono pari a 315,1 nel triennio 1994-1996, a 260,7 nel triennio successivo, 272,8 nel terzo triennio e 270,4 nel biennio finale. Infine, per le cause incluse nel terzo gruppo della classificazione, i tassi di YPLL nelle femmine sono risultati rispettivamente pari a 251,6, a 201,7, a 170,3 e a 188,3 nei vari periodi di osservazione (figura 5).

Dal confronto tra i due sessi, emerge che gli YPLL sono globalmente oltre due volte più elevati nei maschi rispetto alle femmine, con una differente distribuzione nei tre gruppi di cause. Analogamente a quanto riscontrato per i tassi di mortalità standardizzati, infatti, nel sesso maschile si registra un maggior numero di anni di vita potenziali persi per il primo gruppo di cause, seguito dal gruppo "assistenza sanitaria e igiene", mentre i decessi per cause appartenenti al secondo gruppo sono responsabili del minor numero di anni di vita potenziali persi. Nel sesso femminile, come in quello maschile, il contributo maggiore in termini di YPLL è attribuibile a cause del primo gruppo, seguite in questo caso da quelle appartenenti al secondo gruppo, mentre il minor numero di

anni di vita potenziali persi è legato a cause appartenenti al terzo gruppo della classificazione. Nel sesso maschile si può osservare una progressiva riduzione del numero totale

YPLL, mentre nel sesso femminile si osserva una diminuzione costante per il gruppo I e II di cause evitabili, ma non per il gruppo III, che nell'ultimo periodo aumenta.




FIGURA 2. Distribuzione percentuale della mortalità evitabile, rispetto alla mortalità generale

Risultati




FIGURA 3. Tassi standardizzati di mortalità evitabile (per 100.000) per gruppi di cause e sesso.





FIGURA 4. Distribuzione percentuale degli Anni di Vita Potenziali Persi.

Risultati

MASCHI



FEMMINE




FIGURA 5. Tassi standardizzati di YPLL (per 100.000) per gruppi di cause e sesso.

La mortalità evitabile attraverso interventi di prevenzione primaria (Gruppo I)

Per prevenzione primaria si intende l'insieme di interventi finalizzati al controllo dei fattori di rischio. Rappresenta il punto più alto dell'impegno delle strategie di sanità pubblica, ma anche quello più complesso da raggiungere perché, da un lato, prevede di modificare stabilmente abitudini, stili di vita e comportamenti individuali e, dall'altro, presuppone l'attuazione di meccanismi di controllo dell'ambiente fisico, del territorio nel suo insieme. Per questi motivi gli obiettivi di prevenzione primaria possono risultare particolarmente complessi e difficili da raggiungere, se non con uno sforzo congiunto delle diverse componenti della società.

Dall'analisi dei dati relativi alla mortalità evitabile mediante interventi di prevenzione primaria può essere tratta una serie di considerazioni, proprio in merito alla complessità di attuare con successo interventi per il controllo dei fattori di rischio. In generale assistiamo ad una riduzione nel tempo di tutti gli indicatori, eccezion fatta per la farmacodipendenza nel sesso maschile e per i suicidi nel sesso femminile.

Il declino delle cosiddette morti violente, in particolare degli incidenti automobilistici, risulta molto lento: queste cause rappresentano tuttora il triste primato in anni di vita persi. Nel confronto tra i sessi le donne mostrano un andamento quasi in controtendenza nelle morti per tumore del fegato e tumore del polmone. La differente variazione nel tempo dell'andamento dei decessi nelle donne e negli uomini riflette l'evoluzione del consumo di tabacco.

L'aumento del numero di morti per cancro del polmone nelle donne, infatti, è conseguenza dell'incremento dell'abitudine al fumo di sigarette tra le donne, fenomeno che risale agli ultimi 30-40 anni e che fa sentire i suoi effetti a distanza di tempo.

Nei maschi

Dall'analisi dei tassi standardizzati di mortalità evitabile (figura 6), si evince che le morti violente, di cui circa la metà da incidenti con mezzo di trasporto, ed il tumore del polmone rappresentano le cause di decesso maggiormente diffuse nel gruppo delle morti evitabili attraverso interventi di prevenzione primaria, seguite da disturbi circolatori dell'encefalo e cirrosi epatica. Tra le morti violente spiccano, senza dubbio, gli incidenti automobilistici. Per quasi tutte le tipologie di cause appartenenti a questo gruppo si osserva, nell'arco degli anni considerati, una diminuzione dei tassi standardizzati di mortalità, tranne

che per le farmacodipendenze che passano da un tasso di 3,0 per 100.000 nel 1994-96 ad uno di 4,1 nell'ultimo biennio.

In termini di YPLL, espressi come tassi standardizzati, ai primi posti per ammontare di anni di vita potenziali persi figurano, di nuovo, le cause esterne violente nel loro insieme ed i tumori del polmone. La farmacodipendenza rappresenta l'unica causa del primo gruppo ("prevenzione primaria") per cui si registra un graduale incremento degli YPLL nel tempo, verosimilmente legato al corrispondente incremento del tasso di mortalità per questa causa (figura 7).

Nelle femmine

Rispetto ai maschi, i tassi di mortalità evitabile nella popolazione femminile sono di molto inferiori per tutte le cause (figura 8). In ordine di frequenza le cause più comuni di mortalità evitabile sono rappresentate dalle morti violente, soprattutto incidenti della strada, e dai disturbi circolatori dell'encefalo; seguono, nell'ordine, il tumore del polmone e la cirrosi epatica.

Per la maggior parte delle cause appartenenti al primo gruppo, si è avuta una riduzione del tasso standardizzato di mortalità, molto evidente per i disturbi circolatori dell'encefalo, mentre di particolare interesse è il lieve incremento del tasso per tumore del polmone, confermato anche dall'incremento degli anni persi nel periodo in esame (figura 9).

Risultati




FIGURA 6. Tassi standardizzati di mortalità evitabile. Gruppo I “Prevenzione primaria”- Maschi.




FIGURA 7. Tassi standardizzati di YPLL. Gruppo I “Prevenzione primaria”- Maschi.

Risultati




FIGURA 8. Tassi standardizzati di mortalità evitabile. Gruppo I “Prevenzione Primaria”- Femmine.




FIGURA 9. Tassi standardizzati di YPLL. Gruppo I "Prevenzione primaria"- Femmine.

Risultati

Alcune cause

Farmacodipendenza

Le morti per overdose o più genericamente per farmacodipendenza sono state analizzate nel dettaglio per varie fasce d'età e nei diversi periodi di tempo. Il fenomeno pur essendo costituito da "piccoli numeri" e quindi soggetto a notevoli variazioni casuali, presenta interessanti spunti di riflessione. In particolare, nella fascia di età 25-29 anni nei maschi, si osserva una brusca diminuzione del tasso di mortalità tra il primo ed il secondo triennio di osservazione, seguita però poi da un nuovo graduale incremento. Nelle fasce 30-34 anni e 35-39 anni, si osserva invece, un incremento

tra il primo ed il secondo triennio di osservazione, seguito da una flessione, peraltro più marcata nella fascia 35-39 anni, cui corrisponde un successivo nuovo incremento; nelle età 40-44 anni, dopo un iniziale incremento, si ha una diminuzione (figura 10). Nel sesso femminile si registrano tassi di mortalità per farmacodipendenza inferiori rispetto a quello maschile (figura 10). In tutte le fasce d'età, ad eccezione di quella 40-44 anni, si osserva una diminuzione nel tempo della mortalità per tale condizione.




FIGURA 10. Tasso specifico di mortalità (per 100.000) per farmacodipendenza (ICD IX 304-305, ICD X F11-F19).

La mortalità evitabile attraverso interventi di diagnosi precoce (Gruppo II).

Le cause incluse in questo gruppo sono quelle per cui c'è evidenza scientifica di efficacia di riduzione di mortalità attraverso programmi di screening attivi ben organizzati.

Per quanto riguarda i tumori dell'utero occorre distinguere i tumori della cervice da quelli del corpo; solo i primi possono essere considerati "evitabili". Purtroppo in Italia la certificazione di morte non riesce a distinguere in maniera chiara le due cause di morte: rispetto, infatti al totale dei tumori dell'utero la maggior parte viene classificata come tumori dell'utero non specificati. Per questo motivo ai tumori della cervice (ICD IX 180, ICD X C53) sono stati sommati i tumori dell'utero non specificati (ICD IX 179, ICD X C55).

Nei maschi

Le cause di decesso evitabili attraverso la diagnosi precoce mostrano, nei maschi, tassi standardizzati di mortalità decisamente bassi (in tutti i casi inferiori a 10 per 100000 abitanti), con un andamento non univoco nel tempo (figura 11).

La causa più comune è rappresentata dal carcinoma del colon-retto, seguito dai tumori maligni della pelle (tra i quali è compreso anche il melanoma maligno).

Il tasso standardizzato di mortalità evitabile per carcinoma del colon-retto ha subito una modesta riduzione nel tempo; nel caso del tumore maligno della pelle, si è avuta nel secondo triennio un aumento del tasso standardizzato di mortalità, seguito da una riduzione a valori sostanzialmente sovrappponibili a quelli del primo triennio. Per quanto concerne gli YPLL, sono il tumore del colon-retto ed i tumori maligni della pelle a determinare il maggior numero di anni di vita potenziali persi. In entrambi i casi nel corso dei primi nove anni di studio si osserva una riduzione cui fa seguito un certo incremento, riconducibile ad un corrispondente aumento del tasso di mortalità per queste due condizioni nel biennio 2003-2004. Il tasso di YPLL per tumore della mammella maschile risulta di molto inferiore rispetto alle altre cause appartenenti al secondo gruppo, questo in relazione alla quasi inesistenza di decessi per tale patologia nel sesso maschile (figura 12).

Nelle femmine

In termini di tasso di mortalità evitabile, al primo posto per frequenza si colloca il tumore della mammella (il cui tasso di mortalità è superiore a 15 per 100000 abitanti), seguito dal tumore del colon-retto (con un tasso di mortalità superiore a 5 per 100000). Seguono i tumori dell'utero non specificati, i tumori della pelle, il tumore del collo uterino ed il tumore del corpo dell'utero, i cui tassi di mortalità sono inferiori a 5 per 100000 (figura 13).

I tassi di mortalità per condizioni incluse nel gruppo "diagnosi precoce" mostrano un andamento nel tempo variabile da causa a causa. Nel caso del tumore della mammella si osserva una considerevole riduzione tra il primo ed il secondo triennio di studio, cui fa seguito un nuovo incremento ed infine una diminuzione, che porta a valori finali del tasso di molto inferiori rispetto al periodo iniziale. Questo aspetto sottolinea gli importanti successi ottenuti in termini di prevenzione secondaria e trattamento precoce di tale patologia, rappresentando uno stimolo per potenziare ulteriormente l'offerta di servizi.

Relativamente al tumore del colon-retto, c'è da sottolineare che, a fronte di un modesto incremento del tasso di mortalità tra il primo ed il secondo triennio, si registra poi una riduzione nel periodo 2000-2002 con tassi che restano invariati alla fine del periodo di studio.

Per quanto concerne i tumori uterini, nel corso dei primi nove anni di studio, si evidenzia una riduzione cospicua della mortalità per tumore dell'utero non specificato ed un graduale incremento dei decessi rispettivamente per tumore del corpo e del collo dell'utero. Questo fenomeno potrebbe essere verosimilmente legato ad una maggiore accuratezza nella classificazione di tale neoplasia, per cui si ridurrebbero i casi indicati come non specificati, mentre aumenterebbe il numero delle forme neoplastiche ben definite.

I tumori maligni della pelle rappresentano l'unica condizione appartenente al secondo gruppo di cause per la quale si riscontra prima una diminuzione e di nuovo un lieve aumento nell'ultimo periodo di osservazione.

In termini di anni di vita persi, al primo posto

Risultati

si colloca il tumore della mammella, seguito dal carcinoma del colon-retto, dal tumore dell'utero non specificato, dai tumori maligni della pelle e dai tumori del collo e del corpo uterino (figura 14). Nel complesso, tra l'inizio e la fine del periodo di osservazione si riscontra una diminuzione dei tassi di YPLL, ad eccezione del tumore del colon retto e del tumore del corpo dell'utero.

Nel caso del tumore del colon-retto, poiché il tasso di mortalità diminuisce tra il primo trienni e l'ultimo biennio, il dato indica un maggior numero di decessi per tali condizioni nella fascia d'età più giovane. Nel caso del tumore del corpo dell'utero, l'aumento degli YPLL corrisponde ad un incremento della mortalità per tale condizione.




FIGURA 11. Tassi standardizzati di mortalità evitabile. Gruppo II “Diagnosi precoce”- Maschi




FIGURA 12. Tassi standardizzati di YPLL. Gruppo II “Diagnosi precoce”- Maschi.




FIGURA 13. Tassi standardizzati di mortalità evitabile. Gruppo II “Diagnosi precoce”- Femmine.




FIGURA 14. Tassi standardizzati di YPLL. Gruppo II “Diagnosi precoce”- Femmine.

Risultati

La mortalità evitabile attraverso l'assistenza sanitaria e le misure di igiene (Gruppo III).

In un contesto socio-economico evoluto, il miglioramento delle prestazioni sanitarie di tipo terapeutico ed assistenziale è ampiamente atteso e confermato dal miglior andamento degli indicatori di mortalità evitabile rispetto agli altri due gruppi. L'aspetto più rilevante su cui focalizzare l'attenzione è la grandezza dei tassi, prima ancora che la loro variabilità. Per diverse cause si possono osservare tassi di mortalità evitabile standardizzati inferiori ad 1 decesso ogni 100000 residenti (in alcuni casi addirittura inferiore a 0,1): in questi casi è verosimile ritenere che siamo quasi all'abbattimento tenuto conto che il concetto di evitabile ("avoidable" dall'originale definizione anglosassone) può essere concretamente interpretato come la tendenza a raggiungere il punto più basso possibile. Solamente nei maschi la causa più rilevante (malattie ischemiche del cuore ed infarto acuto del miocardio) evidenzia tassi

a due cifre, che si sono comunque dimezzati nel corso degli anni. Controverso è il fatto di aver inserito in questo gruppo la mortalità evitabile per ipertensione, sia perché è di difficile definizione la causa stessa di morte, sia perché esistono interventi di prevenzione primaria di provata efficacia (dieta povera di sale ed attività fisica), tuttavia anche a livello internazionale ancora attribuiscono la morte precoce per ipertensione a interventi "medical care" piuttosto che "health policy" (16).

Nei maschi

In questo gruppo di cause evitabili le malattie ischemiche del cuore rappresentano le cause più diffuse di morte con un distacco netto dalle malattie infettive, dall'ipertensione e dalle broncopneumopatie croniche




FIGURA 15. Tassi standardizzati di mortalità evitabile. Gruppo III "Assistenza sanitaria e Igiene"- Maschi.

che sono, nell'ordine, le altre condizioni più comuni. Al quinto posto, figurano le leucemie, seguite dalle malattie respiratorie acute.

Nel caso delle malattie ischemiche del cuore, nel corso dello studio, si registra una riduzione dei tassi di mortalità, che potrebbe essere legata, da un lato, alla maggiore disponibilità e alla migliore accessibilità ai servizi sanitari qualificati nel trattamento della patologia cardiaca e dall'altro al miglioramento in termini di controllo dei fattori di rischio cardiovascolare reso possibile anche grazie all'educazione sanitaria. Per quanto concerne la mortalità per infezioni batteriche, virali e parassitarie, si osserva una diminuzione costante nei primi tre trienni, seguita da un successivo lieve aumento. La diminuzione del tasso è ascrivibile, molto verosimilmente, al miglioramento in termini di controllo delle malattie infettive, ottenuto grazie anche all'educazione sanitaria, al successo delle campagne

di vaccinazione e ai progressi delle conoscenze in campo farmacologico. Il successivo aumento potrebbe essere legato al fatto che la scarsa numerosità degli eventi che si verificano potrebbe determinare, a fronte di un modesto numero di casi, una certa oscillazione del tasso. Le broncopneumopatie croniche ostruttive subiscono un graduale incremento della mortalità fino al triennio 2000-2002, seguito da una considerevole riduzione del tasso, probabilmente attribuibile, come nel caso della cardiopatia ischemica, a più fattori tra i quali il miglioramento della terapia. Relativamente alle leucemie, si registra un cospicuo decremento del tasso di mortalità tra l'inizio e la fine del periodo di studio, anch'esso molto verosimilmente ascrivibile al progresso delle conoscenze mediche. Nel caso dell'ipertensione arteriosa si può ipotizzare che l'incremento dei tassi di mortalità sia direttamente legato ad un corrispondente aumento dei tassi di incidenza di tale patologia tra la




FIGURA 16.Tassi standardizzati di YPLL. Gruppo III "Assistenza sanitaria e Igiene"- Maschi.

Risultati

popolazione generale. L'appendicite, l'ernia addominale e la coleistite e colelitiasi sono caratterizzate da tassi molto bassi già dal primo triennio, tanto da essere praticamente nulli nell'ultimo. L'aumento della mortalità per malattie respiratorie acute potrebbe essere legato ad un corrispondente aumento dell'incidenza di tali malattie (figura 15). In termini di YPLL, figurano ai primi posti, in ordine di frequenza, le malattie ischemiche di cuore, le malattie infettive e le leucemie, seguite dall'ipertensione arteriosa, dalle malattie respiratorie acute e dalle broncopneumopatie croniche ostruttive. Le leucemie, nello specifico, contribuiscono in maniera considerevole perché colpiscono prevalentemente soggetti giovani. Nel caso delle malattie infettive, delle broncopneumopatie croniche ostruttive e delle leucemie si registra, nel tempo, una riduzione molto marcata degli YPLL. In particolare, per le malattie infettive il tasso diminuisce di circa quattro volte, così come per le leucemie, mentre per le broncopneumopatie croniche a fronte di un graduale incremento della mortalità nel corso dei primi tre trienni, si registra alla fine del periodo di studio, una diminuzione tale che il tasso raggiunge valori inferiori a 5 per 100000. Per quanto concerne, invece, le malattie respiratorie acute, si osserva una modesta variazione del tasso, mentre nel caso dell'ipertensione arteriosa si ha un incremento, indice che ancora tali condizioni hanno un alto costo in termini di anni di vita potenziali persi. Le altre cause appartenenti al terzo gruppo della classificazione contribuiscono in maniera pressoché irrilevante, proprio in ragione del fatto che i tassi di mortalità per tali condizioni sono prossimi allo zero (figura 16).

Nelle femmine

Anche in questo raggruppamento, come in quelli precedenti, tutte le cause mostrano valori di tassi standardizzati di mortalità e di YPLL decisamente inferiori rispetto alla popolazione maschile.

In ordine di frequenza, in maniera sovrapponibile ai maschi, figurano quali cause più comuni le malattie ischemiche di cuore, le malattie infettive, l'ipertensione arteriosa, seguite dalle broncopneumopatie croniche ostruttive, dalle leucemie e dalle malattie respiratorie acute. L'andamento nel tempo dei tassi di mortalità per condizioni appartenenti al terzo gruppo della classificazione, mostra variazioni importanti tra causa e causa (figura 17).

Nella popolazione femminile, i tassi di mortalità relativi alle malattie ischemiche cardiache ed alle malattie infettive subiscono una riduzione nel corso dei primi tre trienni considerati, cui fa seguito, per entrambe le condizioni un

certo incremento della mortalità, senza che tuttavia vengano raggiunti livelli superiori a quelli del primo triennio. Per quanto concerne l'ipertensione arteriosa si riscontra, nel corso dello studio, una riduzione del tasso di mortalità che testimonia l'efficacia delle misure terapeutiche per il trattamento di tale condizione nel contrastare gli eventi avversi. I tassi di mortalità per broncopneumopatie croniche, invece, restano sostanzialmente invariati.

Analogamente al sesso maschile, la cardiopatia reumatica cronica, appendicite, l'ernia addominale e la coleistite e colelitiasi sono caratterizzate da tassi molto bassi già all'inizio del periodo in studio, tanto da essere praticamente nulli nell'ultimo triennio considerato.

In termini di YPLL, risultano ai primi posti le malattie ischemiche, seguite dalle leucemie e dalle malattie infettive. Le malattie respiratorie acute, l'ipertensione arteriosa e le morti legate alla gravidanza, al parto ed al puerperio seguono in ordine di frequenza. Tra queste, le uniche cause di mortalità evitabile che non hanno subito una riduzione in termini di YPLL risultano essere l'ipertensione arteriosa, le malattie respiratorie acute e l'ulcera peptica. Per tutte le altre si è avuta una diminuzione e, nel caso specifico della cardiopatia reumatica cronica, si sono raggiunti valori prossimi allo zero (figura 18).

Da notare, tuttavia, l'andamento nel tempo del tasso di YPLL relativo alle malattie infettive, che, a seguito di un graduale e costante decremento nel corso dei primi tre trienni, mostra un successivo aumento, legato ad un corrispondente lieve incremento del tasso di mortalità per tali condizioni, molto legato alla bassa frequenza assoluta.

Come nel sesso maschile, anche in quello femminile, le leucemie figurano ai primi posti in termini di anni di vita potenziali persi, per l'elevato letalità di tali malattie ematologiche che colpiscono prevalentemente soggetti giovani e nei confronti delle quali si auspica che in futuro i progressi delle conoscenze mediche possano portare ad un miglioramento della prognosi.




FIGURA 17. Tassi standardizzati di mortalità evitabile. Gruppo III “Assistenza sanitaria e Igiene”- Femmine.

Risultati




FIGURA 18. Tassi standardizzati di YPLL. Gruppo III “Assistenza sanitaria e Igiene”- Femmine.

Alcune cause

AIDS


La sindrome da immunodeficienza acquisita ha suscitato un notevole interesse in relazione agli importanti cambiamenti verificatisi nel corso degli anni sia dal punto di vista epidemiologico, sia in termini di progressi in campo scientifico nel trattamento di tale patologia.

In particolare, in merito a tale condizione patologica, l'analisi dei tassi di mortalità specifici per età (figura 19) ha fatto emergere, in primo luogo, differenze tra i due sessi. I tassi di mortalità per AIDS, infatti, risultano più elevati nei maschi rispetto alle femmine. All'inizio del periodo di osservazione, nei maschi, appare evidente che le fasce d'età 30-34 anni e 35-39 anni sono quelle in cui si registrano i tassi più elevati di mortalità. Con il tempo, invece, si nota la progressiva riduzione del tasso, accompagnata da un cambiamento nella distribuzione dei decessi nelle varie fasce d'età. I tassi specifici di mortalità per

AIDS nella fascia 25-29 anni e 30-34 diminuiscono fino ad approssimarsi allo zero. Anche i tassi relativi alla fascia d'età 35-39 si riducono considerevolmente, mentre è nella fascia 40-44 anni, interessata in misura minore da tale diminuzione, che si registrano i più elevati tassi di mortalità alla fine del periodo di studio. La riduzione delle morti per AIDS, potrebbe essere legato, da un lato, al successo delle campagne di prevenzione, capaci di contrastare la diffusione della malattia tra la popolazione generale e, dall'altro, all'aumento della sopravvivenza dei malati resa possibile dal miglioramento delle strategie terapeutiche.

Nel sesso femminile, all'inizio del periodo di studio, si evidenziano valori più elevati dei tassi di mortalità nella fascia d'età 35-39 anni. Nella fascia 25-29 anni si osserva, nel tempo, una progressiva diminuzione del tasso, tale da raggiungere valori praticamente nulli. Nella fascia 30-34 anni, a differenza del sesso maschile, non si verifica un'analogia diminuzione della mortalità, che invece interessa in modo evidente le fasce 35-39 e 40-44 anni di età.

Maschi



Femmine




FIGURA 19. Tasso specifico di mortalità (per 100.000) per AIDS (ICD IX 279.1, ICD X B24).

Risultati

Mortalità evitabile e Anni di vita potenziali persi per Aziende Sanitarie Locali e Distretti sanitari di base

Le variazioni spaziali sono messe in evidenza dal confronto dei tassi di mortalità evitabile e di YPLL per singole Aziende sanitarie e rispettivi distretti dell'Umbria, nei vari periodi in studio. Occorre tenere in conto che la disaggregazione territoriale conduce a lavorare con "piccoli numeri", pertanto lievi oscillazioni dei dati nel tempo possono produrre

variazioni causali non facilmente spiegabili.

Il confronto della mortalità evitabile per cause appartenenti al primo gruppo, evidenzia in generale una riduzione dei tassi tra l'inizio e la fine del periodo di osservazione, dato che indica espressamente come la realizzazione a livello regionale di interventi di prevenzione primaria abbia ottenuto dei risultati nel contrastare il fenomeno della mortalità evitabile. Sono tuttavia documentabili alcune differenze tra i vari ambiti territoriali (figure 20-25). I residenti nell'ASL 1 sperimentano tassi di mortalità e di anni di vita potenziali persi superiori alla media regionale, mentre l'ASL 2 quasi sempre inferiore e le altre con




FIGURA 20. Tassi standardizzati di mortalità evitabile, per tipologia di intervento, nelle ASL dell'Umbria - MASCHI




FIGURA 21. Tassi standardizzati di mortalità evitabile, per tipologia di intervento, nelle ASL dell'Umbria - FEMMINE

valori alterni (nell'ultimo biennio sempre inferiori alla media regionale, tranne le femmine dell'ASL 3). Per quanto riguarda le cause inserite nel gruppo 2, la situazione è più altalenante nel senso che due ASL sono superiori alla media regionale (la 1 e la 2 per i maschi, la 2 e la 4 per le femmine) e due quasi sempre inferiore alla media, così come nel caso delle cause inserite nel gruppo 3 (nell'ASL 1 si ha quasi sempre il valore superiore alla media regionale, specie in riferimento

ai maschi, mentre nelle altre il valore è variabile: è favorevole per i maschi nell'ASL 4, tranne che nell'ultimo biennio ed è favorevole per le femmine dell'ASL 2, tranne che nell'ultimo biennio). La variabilità delle performance raggiunte a livello distrettuale è rappresentata nelle figure 26-33. Sono confermati valori leggermente peggiori per le aree territoriali dell'ASL 1 e migliori per quelle delle ASL 2 e 4.




FIGURA 22. Tassi standardizzati di YPLL, per tipologia di intervento, nelle ASL dell'Umbria - MASCHI




FIGURA 23. Tassi standardizzati di YPLL, per tipologia di intervento, nelle ASL dell'Umbria - FEMMINE

Risultati




FIGURA 24. Rapporto di mortalità evitabile standardizzato (SRR%) nelle ASL dell'Umbria. Anni 2000-04 - Maschi.




FIGURA 25. Rapporto di mortalità evitabile standardizzato (SRR%) nelle ASL dell’Umbria. Anni 2000-04 - Femmine.

Risultati





FIGURA 26 . Tassi standardizzati di mortalità evitabile. Gruppo I “Prevenzione Primaria”. Distretti Sanitari di Base (DSB) delle Aziende Sanitarie Locali dell’Umbria.

MASCHI



FEMMINE




FIGURA 27. Tassi standardizzati di YPLL. Gruppo I “Prevenzione Primaria”. Distretti Sanitari di Base (DSB) delle Aziende Sanitarie Locali dell’Umbria.

Risultati





FIGURA 28. Tassi standardizzati di mortalità evitabile. Gruppo II “Diagnosi precoce e Terapia”. Distretti Sanitari di Base (DSB) delle Aziende Sanitarie Locali dell’Umbria.

MASCHI



FEMMINE




FIGURA 29. Tassi standardizzati di YPLL. Gruppo II “Diagnosi precoce e Terapia”. Distretti Sanitari di Base (DSB) delle Aziende Sanitarie Locali dell’Umbria.

Risultati





FIGURA 30. Tassi standardizzati di mortalità evitabile. Gruppo III “Assistenza sanitaria e Igiene”. Distretti Sanitari di Base (DSB) delle Aziende Sanitarie Locali dell’Umbria.

MASCHI



FEMMINE




FIGURA 31. Tassi standardizzati di YPLL. Gruppo III “Assistenza sanitaria e Igiene”. Distretti Sanitari di Base (DSB) delle Aziende Sanitarie Locali dell’Umbria.

Risultati




FIGURA 32. Rapporto di mortalità evitabile standardizzato (SRR%) nei DSB dell’Umbria. Anni 2000-04 - Maschi.




FIGURA 33. Rapporto di mortalità evitabile standardizzato (SRR%) nei DSB dell'Umbria. Anni 2000-04 - Femmine.

Discussione

Discussione

Il presente rapporto si inserisce in un filone di ricerca e di analisi che si è sviluppato ed è cresciuto a livello europeo ed internazionale a seguito dei lavori di Rustein, Holland, Charlton, Hamblet e Simonato. Coerentemente con l'obiettivo che l'utilizzo degli indicatori di morte evitabile e di anni di vita potenziali persi permette di raggiungere, abbiamo cercato di quantizzare la mortalità evitabile nell'arco di dieci anni e di individuare le eventuali variazioni tra le Aziende sanitarie locali della nostra Regione nel tempo. Molti ricercatori, pur con alcune differenze riguardanti il range di età o la lista di cause selezionate, hanno prodotto lavori simili. Treurniet et al., nel 2004 hanno pubblicato uno studio sulla mortalità evitabile in 15 Paesi dell'Unione europea, in Ungheria e nella Repubblica Ceca allo scopo di individuare eventuali variazioni geografiche e temporali (27). Altri lavori focalizzano l'attenzione sulla relazione tra le variazioni della mortalità evitabile ed i profondi cambiamenti politico-sanitari avvenuti nel proprio paese (4,19), o altri ancora mettono in evidenza l'importanza della "lista" di cause legata all'evitabilità della morte precoce (3), infine, altri utilizzano il concetto di morte evitabile per misurare l'impatto dell'assistenza sanitaria sulla riduzione della mortalità nel proprio paese in una comparazione internazionale (16).

In Italia sono state prodotte molte analisi a livello nazionale, regionale e territoriale (5-6,18,21-23). L'esperienza più corposa è quella realizzata dal gruppo di lavoro dell'Università di Roma Tor Vergata, del Ministero della Sanità e dell'Istat, che ha prodotto l'Atlante della Sanità Italiana Prometeo (1), in cui si analizzano la mortalità evitabile e gli anni di vita potenziali persi, per le classi di età 5-64 anni, per gli anni 1995-1998, fino ad un livello di disaggregazione territoriale delle singole Aziende sanitarie locali italiane, facendone una vera e propria classificazione; tale sforzo scientifico si è ulteriormente arricchito con la recentissima pubblicazione del Rapporto ERA- Atlante 2006 di mortalità evitabile e contesto demografico (2) (www.e-r-a.it), in cui, pur cambiando il range di età considerato (5-69 anni) rispetto al precedente rapporto, viene messo in evidenza dettagliatamente il profilo della mortalità evitabile nelle singole ASL del territorio nazionale fino all'anno 2002, con il preciso obiettivo di segnalare alla politica sanitaria quanta conclusione di vita in età in cui non si dovrebbe morire esiste e per quali cause che possono essere attivamente contrastate dal sistema sanitario pubblico.

La nostra analisi, riguardante l'andamento dell'evento mortalità evitabile in Umbria per gli anni 1994-2004, ha utilizzato la classificazione di Simonato et al. con piccole

modifiche e il range di età 5-64 che è ancora il più usato, pertanto essa è verosimilmente confrontabile con molti degli studi citati. Ciò che emerge, in accordo con gli altri lavori, è che la mortalità evitabile e gli anni di vita potenziali persi sono più elevati nel sesso maschile rispetto a quelli nel sesso femminile e che tali indicatori diminuiscono nel tempo.

I guadagni in termini di morti evitate si sono avuti, in Umbria, principalmente a carico degli interventi di prevenzione primaria (circa una diminuzione del 25% tra il primo e l'ultimo periodo di osservazione) sia per i maschi che per le femmine, o a carico di interventi assistenziali e igiene nei maschi (diminuzione di circa il 30% di mortalità evitabile) e meno a carico di interventi di diagnosi precoce (solo nelle femmine, finora, si è riscontrato un guadagno di circa il 17%). Del resto, la composizione delle morti evitabili è principalmente a carico delle cause contrastabili con interventi di prevenzione primaria (circa il 65%). I maschi, inoltre, sperimentano tassi di mortalità evitabile, e di conseguenza anche di anni di vita potenziali perduti (YPLL), circa tre volte superiori rispetto alle femmine sia per quanto riguarda la tipologia di intervento "prevenzione primaria" che quella "assistenza e igiene", mentre viceversa accade per la tipologia "diagnosi precoce", dove pesa notevolmente la patologia "tumore maligno della mammella" che è frequente quasi esclusivamente nel sesso femminile. Il dettaglio del peso dei singoli gruppi di causa per le tre tipologie di intervento efficace, ci permette di rilevare che nel gruppo 1 (prevenzione primaria) per entrambi i sessi pesano di gran lunga le cause esterne, specie gli incidenti con mezzi di trasporto, sia in termini di tasso di mortalità evitabile che di anni di vita potenziali persi; a carico dei maschi ancora pesa la mortalità evitabile per tumore del polmone, anche se nel tempo e il tasso e gli YPLL sono diminuiti; nel sesso femminile al secondo posto figurano cause riconducibili a disturbi circolatori dell'encefalo; in entrambi i sessi è di particolare rilevanza il tasso di mortalità evitabile e quello di anni di vita potenziali persi per farmacodipendenza (overdose) che aumentano nel decennio e sono circa quattro volte superiore nei maschi rispetto alle femmine.

Tra le cause del secondo gruppo di tipologia di intervento (diagnosi precoce), oltre al notevole peso del tumore maligno della mammella nel sesso femminile, pesano i tumori maligni del colon e del retto sia nei maschi che nelle femmine.

Per quanto riguarda il gruppo terzo (assistenza e igiene), particolare attenzione meritano le malattie ischemiche del cuore e l'ipertensione per entrambi i sessi; l'AIDS risulta abbattuto nel periodo studiato, sia in termini di

tasso di mortalità evitabile che di anni persi, nei maschi e nelle femmine.

Le cause contrastabili con la corretta assistenza ospedaliera e territoriale e con azioni di igiene presentano la più alta percentuale di declino, come è stato riportato anche da altri Autori (26 - 27), quasi a dimostrare che ci sia stato maggior consenso nell'uso di procedure e protocolli efficaci e condivisi nell'assistenza clinica piuttosto che azioni di efficacia pratica preventiva; l'esempio delle cause "chirurgiche" (quali appendicite, colecistite e colelitosi) ridotte a quasi zero rispecchia l'introduzione di interventi efficaci nella pratica clinica fin dai primi anni ottanta, così come il declino marcato delle malattie infettive quale causa di morte precoce può essere attribuita all'applicazione vasta e consolidata delle vaccinazioni e della terapia antibiotica (7). La diminuzione, nel decennio considerato, della mortalità evitabile per tumore del polmone nei maschi riflette la riduzione del tasso di prevalenza dei fumatori maschili negli ultimi decenni, mentre la prevalenza di fumatrici donne non accenna a diminuire così come il tasso di mortalità evitabile e gli anni di vita potenziali persi. Di converso, la diminuzione della mortalità evitabile per accidenti da veicoli può essere attribuita ad interventi di politica inersetoriale, quali iniziative di sicurezza durante il trasporto, inclusa la normativa sul controllo del tasso alcolico per i guidatori, i limiti di velocità, leggi restrittive per bambini a bordo; inoltre, anche il miglioramento dell'assistenza ai traumi da incidente può aver contribuito a questo trend. C'è da tenere in conto, in sostanza, che l'evoluzione della mortalità specifica per causa dipende non solo dai cambiamenti della qualità nelle pratiche assistenziali o preventive, ma anche

dalla qualità stessa della diagnosi, classificazione e codifica dei dati (effetto periodo), dalla variazione dell'incidenza della patologia, dalla severità e varietà di fattori al di fuori del sistema medico-assistenziale (effetto coorte); da qui nasce la necessità di rivedere e migliorare periodicamente le classificazioni adottate per meglio evidenziare i trend temporali ed oggettivare al massimo la comparabilità dei dati stessi.

In merito alla variabilità geografica delle performance raggiunte dalle varie ASL dell'Umbria nel periodo in studio, possiamo dire che relativamente alle morti evitabili inserite nel gruppo 1, i residenti nell'ASL 1 sperimentano tassi di mortalità e di anni di vita potenziali persi superiori alla media regionale, mentre l'ASL 2 quasi sempre inferiore e le altre con valori alterni (nell'ultimo biennio sempre inferiori alla media regionale, tranne le femmine dell'ASL 3). Per quanto riguarda le cause inserite nel gruppo 2, la situazione è più altalenante nel senso che due ASL sono superiori alla media regionale (la 1 e la 2 per i maschi, la 2 e la 4 per le femmine) e due quasi sempre inferiore alla media, così come nel caso delle cause inserite nel gruppo 3 (nell'ASL 1 si ha quasi sempre il valore superiore alla media regionale, specie in riferimento ai maschi, mentre nelle altre il valore è variabile: è favorevole per i maschi nell'ASL 4, tranne che nell'ultimo biennio ed è favorevole per le femmine dell'ASL 2, tranne che nell'ultimo biennio). La variabilità dei successi raggiunti a livello distrettuale, misurata attraverso il rapporto del tasso di mortalità evitabile standardizzato dell'area territoriale con quello regionale, conferma valori leggermente peggiori per le aree territoriali dell'ASL 1 e migliori per quelle delle ASL 2 e 4.

Conclusioni

Conclusioni

Dalle analisi fin qui fatte possiamo trarre alcune osservazioni riassuntive. In primo luogo va segnalato che nel decennio osservato c'è stato nella nostra Regione un miglioramento costante e sensibile degli indicatori considerati (tassi di mortalità evitabile e di anni di vita potenziali persi), soprattutto a carico del sesso maschile; questo andamento è confermato dal Rapporto ERA – Atlante della mortalità evitabile 2006, che pone l'Umbria, per il triennio 2000-02, tra le migliori cinque regioni d'Italia a fronte del fatto che nella classifica relativa agli anni 1996-98 era tra la sesta e la decima regione.

In secondo luogo, dobbiamo evidenziare che la maggior parte della mortalità evitabile è ricollegabile tuttora a cause che possono essere prevenute con interventi di prevenzione primaria e di miglioramento degli stili di vita, anche se è proprio in questo gruppo di tipologia di noxe patogene che si sono avuti i migliori guadagni di anni di vita potenziali e quindi di abbassamento del tasso di mortalità evitabile. In questo gruppo vi sono le cause esterne di morte, principalmente gli incidenti da veicoli e nell'ambiente di lavoro, verso le quali ancora molto vi è da fare, così come cause di morte per droga o crimini o per tumore del polmone verso cui implementare azioni sempre più sensibili e mirate. Per quanto riguarda le cause di morte evitabile legate ad interventi di diagnosi tempestiva ed appropriata assistenza (malattie ischemiche del cuore, malattie respiratorie acute o croniche compresa l'asma), si è avuto un notevole miglioramento nel tempo a carico del sesso maschile, un po' meno per il sesso femminile.

Le donne, che comunque sperimentano un minor numero

di anni di vita potenziali persi rispetto agli uomini (la popolazione maschile tra 5 e 64 anni perde mediamente circa 3000 anni di vita potenziale/anno, mentre quella femminile circa 1350/anno) hanno i migliori risultati nel gruppo di cause evitabili con diagnosi precoce e screening attivi (nel decennio hanno avuto una diminuzione di circa il 17% del tasso di mortalità, a fronte di nessun cambiamento sostanziale per gli uomini). Nel gruppo classificato "diagnosi precoce" pesano inoltre, sia per i maschi che per le femmine, le morti evitabili a causa dei tumori maligni del colon, elemento che rafforza la scelta di politica sanitaria fatta dalla nostra Regione di avviare uno screening attivo per la prevenzione di questa patologia.

In terzo luogo, la presente analisi evidenzia un campo di variazione intraregionale non indifferente: appare una situazione leggermente peggiore rispetto alla media regionale nell'ASL 1, come confermato anche dalla graduatoria di ERA che pone "Città di Castello" al novantacinquesimo posto tra le 188 USL monitorate, mentre sembra migliore complessivamente la performance dell'ASL 2 (nella graduatoria di ERA "Perugia" è al sedicesimo posto). A livello distrettuale la variabilità può essere in parte spiegata dalla esigua numerosità degli eventi che può portare ad ampie oscillazioni casuali non facilmente riconducibili alle azioni sanitarie intraprese; tuttavia il significato della mortalità evitabile quale "valutatore" dell'efficacia pratica delle risposte sanitarie o di "indicatore sentinella" rimane anche a livello subregionale, se non altro perché può innescare indagini di caso più specifiche e mirate in territori evidenziati come svantaggiati ed anche concreti interventi di correzione.

BIBLIOGRAFIA

1. AA.VV.- Atlante della Sanità Italiana- Prometeo. Indagine sulle realtà territoriali delle Aziende USL: stato di salute della popolazione, servizi sanitari, contesto demografico ed economico. ESIS Edizioni Studi e Sevizi di Interesse Sanitario, Roma 1999, 2000, 2001.
2. Conti S.et al.(a cura di). – ERA-Atlante 2006 – Mortalità evitabile e contesto demografico (www.e-r-a.it).
3. Albert X., Bayo A., Alfonso J.L. Cortina P., Corella D. - The effectiveness of health systems in influencing avoidable mortality: a study in Valencia, Spain, 1975-90. *J. Epidemiol. Community Health* 1996; 50: 320-325.
4. Andreev E.M., Nolte E., Shkolnikov V.M., Varaikova E., McKee M.- The evolving pattern of avoidable mortality in Russia. *International Journal of Epidemiology* 2003; 32:437-446.
5. Associazione Italiana Medici per l'Ambiente, Istituto Superiore di Sanità, Regione Toscana Assessorato all'Ambiente. – “Mortalità Evitabile nelle Città Capoluogo di Provincia”.1999, Arezzo, ISDE Italia.
6. Barchielli A., Salomoni A. – Le “Morti Evitabili” nelle Regioni Italiane, 1980-90. *Epidemiologia e Prevenzione* 1996; 20: 318-327.
7. Bi P., Whitby M., Walker S., Parton KA. – Trends in mortality rates for infectious and parasitic diseases in Australia:1907-1997. *Intern Med J* 2003; 33: 152-162.
8. Charlton J.R., Harley R.M., Silver R., Holland W.W. Geographical variation in mortality from conditions amenable to medical intervention in England and Wales. *Lancet* 1983; 691-696.
9. Charlton J.R., Lakhani A., Aristidou M. – How have “avoidable death” indices for England and Wales changed? 1974-78 compared with 1979-1983. *Community Medicine* 1986; 8 (4): 304-314.
10. Charlton J.R., Velez R. – Some international comparisons of mortality amenable to medical intervention. *British Medical Journal* 1986; 292 (6516): 295-301.
11. French K.M., Jones K. – Impact of definition on the study of the avoidable mortality: Geographical trends in British deaths 1981-1998 using Charlton and Holland's definitions. *Social Science & Medicine* 2005.
12. Holland W.W. (Editor) – The European Community Atlas of “avoidable death”. Commission of the European Communities Health Service Research Series 3. Oxford: Oxford University Press, 1988.
13. Holland W.W. (Editor) – The European Community Atlas of “avoidable death”. Second edition, volume one. Oxford: Oxford University Press, 1991.
14. Holland W.W. (Editor) - The European Community Atlas of “avoidable death”. Second edition, volume two. Oxford: Oxford University Press, 1993.
15. Humblet P.C., Lagasse R., Leveque A. – Trends in Belgian premature avoidable deaths of a 20 year period. *J. Epidemiol. Community Health* 2000; 54: 687-691.
16. Korda R.J., Butler J.R.G.- Effect of healthcare on mortality: trends in avoidable mortality in Australia and comparisons with western Europe. *Publi Health* 2006; 120: 95-105.
17. Loprieno G., Tomasi A. – La Mortalità Evitabile nell'Azienda USL 2 di Lucca. Analisi e valutazione del fenomeno nel periodo 1987-1998. *Rivista Italiana d'Igiene* 2002; vol. 2, 62 (1-2): 1-24.
18. Nante N., Del Prato M., Muracchio D., et al. – Life expectancy at birth and avoidable mortality. Health performance of Liguria region. *Journal of Preventive Medicine and Hygiene* 2005; 46: 1-12.
19. Niti M., Ng T.P. - Temporal trends and ethnic variations in amenable mortality in Singapore 1965-1994: the impact of health care in transition. *International Journal of Epidemiology* 2001; 30: 966-973.
20. Nolte E., Scholtz R., Shkolnikov V., McKee M. – The contribution of medical care to changing life expectancy in Germany and Poland. *Social Science & Medicine* 2002; 55: 1905-1921.

-
21. Olivieri A., Benacchio L., Potì M.- La Mortalità evitabile nella Provincia di Padova, 1984-1998. Azienda U.L.S.S.15, Regione Veneto.
22. Pandolfi P., Collina N., Mazzetti F. et al. – La mortalità evitabile nella Provincia di Bologna. Edizione 2002.
23. Romagnoli C., Minelli L., Rossi E., Giangreco G., Panella V., Barro G. – Valutazione dell'efficacia pratica dei servizi sanitari dell'Umbria. Difesa Sociale 1998; 3: 7-17.
24. Rutstein D., Berenberg W., Chalmers C., et al. – Measuring the quality of medical care. New England J. Medicine 1976; 294: 582-588.
25. Rutstein D., Berenberg W., Chalmers C., et al. Measuring the quality of medical care, second revision of tables of indexes. New England J. Medicine 1980; 302: 1146-1150.
26. Simonato L., Ballard T., Bellini P., Winkelmann R. Avoidable Mortality in Europe 1955-1994: a plea for prevention. J. Epidemiol. Community Health 1998; 52: 624-630.
27. Treurniet H.F., Boshuizen H.C., Harteloh P.P. –Avoidable mortality in Europe (1980-1997): a comparison of trends. J. Epidemiol. Community Health 2004; 58: 290-295.
- 27bis. Westerling R., Rosen M.-Avoidable mortality among migrants in Sweden. Eur. J. Public Health 2002: 12(4): 279-286.
28. WHO – Manual of International statistical classification of diseases. Injuries and causes of death. Ninth Revision, vol. 1. WHO, Geneva 1975.
29. WHO – Manual of International statistical classification of diseases. Injuries and causes of death. Tenth Revision, vol. 1. WHO, Geneva 1992.

Si ringraziano per la collaborazione i componenti del Gruppo ReNCaM



F. La Rosa, A. M. Petrinelli, D. Costarelli, L. Minelli, V. Mastrandrea
*del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche e Sanità Pubblica,
Sezione di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Perugia*

A. Canosa, F. Stracci, T. Cassetti, V. Sorrentino
del Registro Tumori Umbro di Popolazione

C. Ciani (ASL 2), D. Felicioni (ASL 1), M. Mattorre (ASL 4), B. Minni (ASL 3)
V. Patavino (ASL 4), M. Petrella (ASL 2), G. Vinti (ASL 1)
delle Aziende Sanitarie Locali dell'Umbria

Appendice

Appendice

- TABELLA A1. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
UMBRIA. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A2. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
UMBRIA. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A3. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
UMBRIA. Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A4. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
UMBRIA. Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A5. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
UMBRIA. Tassi annui standardizzati (pop. 1991) di mortalita' per 100.000 residenti, per causa.
- TABELLA A6. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
UMBRIA. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A7. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.1. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A8. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.1. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A9. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A10. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 1 DSB 1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A11. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 1 DSB 2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A12. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.2. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A13. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.2. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A14. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A15. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 2 DSB 1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A16. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 2 DSB 2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A17. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 2 DSB 3. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A18. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 2 DSB 4. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

- TABELLA A19. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.3. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A20. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.3. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A21. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.3. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A22. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 3 DSB 1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A23. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 3 DSB 2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A24. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 3 DSB 3. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A25. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.4. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A26. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.4. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A27. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.4. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A28. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 4 DSB 1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A29. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 4 DSB 2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A30. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 4 DSB 3. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A31. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
UMBRIA. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A32. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
UMBRIA. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A33. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
UMBRIA. Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A34. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
UMBRIA.Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa.Femmme.
- TABELLA A35. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
UMBRIA. Tassi annui standardizzati (pop. 1991) di mortalita' per 100.000 residenti, per causa.
- TABELLA A36. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
UMBRIA. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A37. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.1. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A38. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.1. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A39. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.1.Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A40. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 1 DSB 1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

Appendice

- TABELLA A41. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 1 DSB 2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A42. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.2. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A43. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.2.Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A44. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.2.Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A45. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 2 DSB 1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A46. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 2 DSB 2.Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A47. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 2 DSB 3. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A48. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 2 DSB 4. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A49. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.3.Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A50. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.3.Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A51. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.3. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A52. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 3 DSB 1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A53. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 3 DSB 2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A54. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 3 DSB 3. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A55. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.4. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A56. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.4. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A57. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.4. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A58. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 4 DSB 1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A59. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 4 DSB 2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A60. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 4 DSB 3.Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

- TABELLA A61. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
UMBRIA. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A62. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
UMBRIA. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A63. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
UMBRIA. Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A64. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
UMBRIA. Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A65. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
UMBRIA. Tassi annui standardizzati (pop. 1991) di mortalita' per 100.000 residenti, per causa.
- TABELLA A66. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
UMBRIA. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A67. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.1. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A68. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.1. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A69. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A70. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 1 DSB 1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A71. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 1 DSB 2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A72. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.2. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A73. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.2. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A74. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.2.Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A75. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 2 DSB 1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A76. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 2 DSB 2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A77. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 2 DSB 3. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A78. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 2 DSB 4. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A79. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.3. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A80. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.3. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A81. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.3. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

Appendice

- TABELLA A82. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 3 DSB 1.Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) , stand.(SAMR) , tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A83. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 3 DSB 2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) , stand.(SAMR) , tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A84. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 3 DSB 3. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) , stand.(SAMR) , tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A85. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.4. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A86. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.4. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A87. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.4.Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) , stand.(SAMR) , tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A88. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 4 DSB 1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) , stand.(SAMR) , tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A89. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 4 DSB 2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) , stand.(SAMR) , tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A90. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 4 DSB 3. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) , stand.(SAMR) , tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A91. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
UMBRIA. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A92. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
UMBRIA. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A93. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
UMBRIA. Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A94. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
UMBRIA. Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A95. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
UMBRIA. Tassi annui standardizzati (pop. 1991) di mortalita' per 100.000 residenti, per causa.
- TABELLA A96. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
UMBRIA. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) , stand.(SAMR) , tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A97. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.1. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A98. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.1.Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A99. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) , stand.(SAMR) , tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A100. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 1 DSB 1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) , stand.(SAMR) , tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A101. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 1 DSB 2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) , stand.(SAMR) , tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A102. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.2. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

- TABELLA A103. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.2. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A104. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A105. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 2 DSB 1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A106. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 2 DSB 2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A107. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 2 DSB 3. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A108. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 2 DSB 4. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A109. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.3. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A110. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.3. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A111. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.3. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A112. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 3 DSB 1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A113. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 3 DSB 2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A114. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 3 DSB 3. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A115. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.4. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.
- TABELLA A116. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.4. Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.
- TABELLA A117. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.4. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A118. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 4 DSB 1. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A119. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 4 DSB 2. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.
- TABELLA A120. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 4 DSB 3. Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR), stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

Appendice

TABELLA A1. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
UMBRIA

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	8	3	5	33	57	61	38	54	57	81	149	224	427	570	800	619	853	880	4919
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	11	18	29	25	35	10	15	13	164
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	10	37	41	48	41	41	14	243
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	14	14	21	10	10	7	94
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	1	5	21	42	72	151	214	256	145	118	57	1082
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	9	14	25	31	40	41	29	195
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	2	4	2	2	0	14
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	4	13	5	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1	29
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	1	1	7	6	9	15	32	65	126	257	270	508	638	1935
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	1	0	6	7	14	18	24	56	42	62	34	47	28	339
V01-Y99 Cause esterne mortal	8	3	5	33	52	46	32	35	32	22	46	52	58	79	88	67	72	94	824
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	4	3	2	27	35	23	13	17	10	7	14	16	23	28	30	22	11	9	294
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	6	6	11	11	12	12	9	14	21	21	27	21	22	11	10	214
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	7
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	2	2	3	15	15	27	52	78	115	82	83	70	544
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	1	1	3	11	13	24	47	69	108	75	79	63	494
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	2	3	5	8	7	5	4	7	47
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3
III GRUPPO: assist.osp.territ	2	2	2	3	4	7	35	42	29	53	75	142	208	398	568	620	867	880	3937
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	1	4	28	25	14	6	4	4	10	2	9	11	13	7	138
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	1	4	28	25	14	5	3	1	3	0	0	0	0	84
C62 T.m.testicolo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	3	1	2	0
C91-C95 Leucemie	0	2	1	1	3	1	4	5	2	4	4	7	19	16	30	25	28	20	172
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	3	2	3	2	0	19
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	15	19	26	27	41	47	187
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	1	2	11	12	41	55	110	141	277	369	377	527	497	2420
J10-J22 Mal.respirat.acute	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	4	10	19	37	62	94	232	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	11	59	99	126	164	175	643
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	3	5	6	9	15	20	63
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2
K40-K46 Ernia addominale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	8	17
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	3	3	8	12	31

TABELLA A2. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
UMBRIA

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	2	1	2	9	11	27	16	27	33	32	45	69	103	217	371	404	812	1447	3628
B24 AIDS	0	0	0	0	0	3	4	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	1	4	2	4	1	5	9	11	43
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	8	10	20	31	29	22	29	156
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	4
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	7	11	14	16	32	39	23	34	208
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	2	10	14	15	59
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	1	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	1	0	3	0	4	8	8	12	24	28	93	212	260	607	1171	2431
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	9	26	41	48	28	36	43	246
V01-Y99 Cause esterne mortal	2	1	2	7	11	19	9	9	11	8	11	10	16	22	30	43	87	154	452
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	1	1	6	9	12	5	6	6	4	3	2	9	11	11	8	7	4	105
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	2	2	1	2	3	2	4	5	2	3	4	6	6	2	44
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	6
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter	0	0	0	1	1	2	5	10	20	43	68	86	99	134	159	138	177	154	1097
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	17	22	19	44	56	61	82	89	400
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	3	1	14	5	5	12	49
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	2	7	13	34	38	50	62	71	74	54	62	44	511
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	3	2	2	3	6	0	24
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	3	5	7	0	24
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	8	9	10	9	9	14	9	78
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	1	1	1	1	1	0	11
III GRUPPO: assist.osp.territ	1	1	1	3	1	4	8	18	11	14	15	42	80	158	315	414	808	1449	3343
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	3	4	9	4	0	1	0	1	4	3	8	15	16	68
C91-C95 Leucemie	0	1	1	3	1	0	2	4	2	2	2	7	5	8	23	18	22	21	122
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	6	3	9	3	27
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	9	18	38	44	62	135	312
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	1	5	4	7	7	29	51	101	204	281	555	930	2175
J10-J22 Mal.respirat.acute	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	10	18	60	171	269
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	17	26	27	68	118	266
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	4	11	23	44
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	4	4	11
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	8	20
000-099 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELLA A3. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
UMBRIA

Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-14	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75+	0-74	0-75+	
I GRUPPO: prevenzione primaria	9.9	48.0	68.4	67.1	39.7	62.9	70.6	93.2	203.4	278.8	568.5	775.7	1212.7	2919.3	229.0	409.4	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.7	5.8	15.0	22.4	38.6	34.0	53.0	47.1	11.2	13.6	
C22 T.m.fegato	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	1.2	1.2	10.9	12.4	49.2	55.8	72.7	119.1	13.1	20.2	
C32 T.m.laringe	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	3.5	9.6	8.7	18.6	19.0	31.8	33.5	6.0	7.8	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	6.2	24.2	57.3	89.6	201.0	291.2	388.0	397.1	68.0	90.1	
C67 T.m.vescica	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.6	2.7	11.2	18.6	34.0	46.9	136.5	7.6	16.2		
F10 Alcoolismo psic.alco	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	1.2	2.3	.0	.0	2.6	5.4	3.0	2.4	1.1	1.2	
F11-F19 Farmacodipendenza	.0	.0	4.8	14.3	5.2	4.7	1.2	.0	.0	.0	1.3	.0	.0	1.2	2.5	2.4	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	.0	.0	.0	1.1	1.0	8.2	7.4	10.4	20.5	39.8	86.5	171.4	389.5	1757.5	46.3	161.0	
K70-K76 Cirrosi epatica	.0	.0	.0	1.1	.0	7.0	8.7	16.1	24.6	29.8	74.5	57.1	93.9	135.2	20.5	28.2	
V01-Y99 Cause esterne mortal	9.9	48.0	62.4	50.6	33.5	40.8	39.7	25.3	62.8	64.7	77.2	107.5	133.4	289.2	52.7	68.6	
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	5.6	39.3	42.0	25.3	13.6	19.8	12.4	8.1	19.1	19.9	30.6	38.1	45.4	52.1	22.5	24.5	
-X60-X84 Suicidi	.0	8.7	7.2	12.1	11.5	14.0	14.9	10.4	19.1	26.1	27.9	36.7	31.8	53.3	15.3	17.8	
-X85-Y09 Omicidi	.0	.0	1.2	.0	1.0	.0	1.2	1.2	1.4	.0	.0	1.3	.0	1.2	.5	.6	
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	.0	.0	.0	.0	2.1	2.3	3.7	17.3	20.5	33.6	69.2	106.1	174.3	291.6	27.6	45.3	
C18-C21 T.m.colon-retto	.0	.0	.0	.0	1.0	1.2	3.7	12.7	17.7	29.8	62.5	93.9	163.7	269.3	24.7	41.1	
C43-C44 T.m.pelle	.0	.0	.0	.0	1.0	1.2	.0	4.6	2.7	3.7	6.6	10.8	10.6	19.8	2.8	3.9	
C50 T.m.mammella	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	.0	2.4	.1	.2	
III GRUPPO: assist.osp.territ	3.7	4.4	4.8	7.7	36.6	48.9	35.9	61.0	102.4	176.7	276.9	541.6	861.0	2938.0	140.1	327.7	
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	.0	.0	1.2	4.4	29.3	29.1	17.3	6.9	5.5	4.9	13.3	2.7	13.6	38.4	9.5	11.5	
-B24 AIDS	.0	.0	1.2	4.4	29.3	29.1	17.3	5.8	4.1	1.2	3.9	.0	.0	.0	7.5	7.0	
C62 T.m.testicolo	.0	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	.0	.0	.0	.2	.2	
C81 Malattia di Hodgkin	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	.0	.0	1.4	.0	.0	4.0	4.5	3.7	.7	.9	
C91-C95 Leucemie	1.9	1.5	3.6	1.1	4.2	5.8	2.5	4.6	5.5	8.7	25.2	21.7	45.4	90.6	8.8	14.3	
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	4.9	5.3	4.0	3.0	6.2	1.2	1.6
I10-I15 Ipertensione	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	8.2	6.2	19.9	25.8	39.4	142.7	6.4	15.6
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	.0	.0	.0	1.1	2.1	12.8	14.9	47.2	75.1	136.9	187.7	377.0	559.3	1738.9	90.9	201.4	
J10-J22 Mal.respirat.acute	1.2	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	2.4	5.3	13.6	28.8	239.5	3.5	19.3	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	2.7	7.4	14.6	80.3	150.0	577.1	15.9	53.5	
K25-K28 Ulcera peptica	.0	.0	.0	.0	1.0	1.2	.0	.0	2.7	1.2	3.9	6.8	9.0	54.6	1.7	5.2	
K35-K38 Appendicite	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	.0	1.2	.1	.2	
K40-K46 Ernia addominale	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	3.0	16.1	.4	1.4	
K80-K82 Colecist.acuta e cro	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.7	.0	2.7	4.5	28.5	.7	2.6	

TABELLA A4. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
UMBRIA

Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-14	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75+	0-74	0-75+
I GRUPPO: prevenzione primaria	3.3	14.0	13.5	27.2	12.9	21.4	36.1	36.6	59.8	80.9	124.8	253.8	441.0	1997.2	82.7	282.7
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	3.7	2.3	1.3	4.6	2.4	4.6	1.1	18.7	1.6	3.4
C22 T.m.fegato	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	1.2	1.1	5.3	9.3	12.1	23.3	36.8	60.0	6.6	12.2
C32 T.m.laringe	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	.0	2.2	.1	.3
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	.0	.0	.0	.0	2.2	.0	3.7	8.0	14.6	16.4	19.3	37.4	46.3	63.0	10.8	16.3
C67 T.m.vescica	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	.0	6.0	2.3	11.8	30.7	1.6	4.6
F10 Alcoolismo psic.alco	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	.0	.7	.2	.2
F11-F19 Farmacodipendenza	.0	1.6	.0	1.1	1.1	2.4	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.5
I60-I69 Dist.circol.encefalo	.0	1.6	.0	3.4	.0	4.8	10.0	9.1	15.9	28.1	33.9	108.7	252.0	1528.5	34.4	190.5
K70-K76 Cirrosi epatica	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	2.5	6.9	8.0	10.5	31.5	47.9	57.0	80.2	12.2	19.3
V01-Y99 Cause esterne mortal	3.3	10.9	13.5	21.6	9.7	10.7	13.7	9.1	14.6	11.7	19.3	25.7	35.6	213.0	14.7	35.4
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	1.3	9.3	11.0	13.6	5.4	7.1	7.5	4.6	4.0	2.3	10.9	12.8	13.0	14.2	7.5	8.2
-X60-X84 Suicidi	.0	.0	2.5	2.3	1.1	2.4	3.7	2.3	5.3	5.8	2.4	3.5	4.7	10.5	2.6	3.4
-X85-Y09 Omicidi	.0	.0	.0	1.1	1.1	.0	.0	1.1	1.3	.0	.0	.0	.0	1.5	.3	.5
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	.0	1.6	1.2	1.1	5.4	11.9	22.4	49.2	87.7	99.7	118.7	155.5	187.8	350.2	54.2	85.1
C18-C21 T.m.colon-retto	.0	.0	1.2	.0	1.1	1.2	3.7	4.6	22.6	25.8	23.0	51.4	66.5	174.0	14.7	31.3
C43-C44 T.m.pelle	.0	1.6	.0	1.1	1.1	1.2	.0	1.1	2.7	2.3	3.6	1.1	16.6	16.5	2.4	3.8
C50 T.m.mammella	.0	.0	.0	.0	2.2	8.3	16.2	38.9	50.5	58.6	75.1	83.0	87.9	120.0	30.7	40.0
C53 T.m.collo dell'utero	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	1.2	1.1	4.0	2.3	3.6	2.3	2.3	6.7	1.3	1.9
C54 T.m.corpo dell'utero	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	1.1	2.4	5.8	3.5	9.0	1.0	1.9	
C55 T.m.utero n.s.	.0	.0	.0	.0	1.1	.0	1.2	3.4	6.6	9.3	10.9	11.6	10.7	24.0	4.0	6.1
III GRUPPO: assist.osp.territ	2.0	4.7	1.2	5.7	8.6	21.4	16.2	16.0	22.6	50.4	98.1	185.9	375.6	2004.7	59.6	262.8
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	.0	.0	.0	3.4	4.3	10.7	5.0	.0	1.3	.0	1.2	4.6	3.5	29.2	2.5	5.3
-B24 AIDS	.0	.0	.0	3.4	4.3	10.7	5.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7	1.6
C81 Malattia di Hodgkin	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	2.5	.0	2.7	1.1	1.2	1.1	1.1	1.5	.8	.9
C91-C95 Leucemie	1.3	4.7	1.2	.0	2.2	4.8	2.5	2.3	2.7	8.2	6.0	9.3	27.3	45.7	5.3	9.6
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	.0	.0	1.2	7.0	3.5	11.2	1.0	2.1
I10-I15 Ipertensione	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	.0	1.1	2.7	2.3	10.9	21.0	45.1	180.7	6.2	24.4
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	.0	.0	.0	.0	1.1	6.0	5.0	8.0	9.3	34.0	61.8	118.1	242.5	1324.5	35.8	170.4
J10-J22 Mal.respirat.acute	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	1.3	1.1	3.6	3.5	11.8	186.7	1.7	21.1
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	1.3	1.1	8.4	19.8	30.9	159.7	4.6	20.8
K25-K28 Ulcera peptica	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	.0	.0	.0	5.9	28.5	.5	3.4
K35-K38 Appendicite	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.0	.1
K40-K46 Ernia addominale	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	2.4	1.1	1.1	14.2	.5	2.0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	2.3	21.7	.3	2.5	
000-O99 Gravid.parto puerper	.0	.0	.0	.0	1.1	.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2

Appendice

TABELLA A5. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
UMBRIA

Tassi annui standardizzati (pop. 1991) di mortalità per 100.000 residenti, per causa.

CAUSA	popolazione	MASCHI						FEMMINE					
		TUTTE LE ETA'			0-74			TUTTE LE ETA'			0-74		
		----tassi standardizzati----	Umbra (E.S.)	Italiana Mond.	tassi standardizzati	Umbra	Italiana Mond.	----tassi standardizzati----	Umbra (E.S.)	Italiana Mond.	tassi standardizzati	Umbra	Italiana Mond.
I GRUPPO: prevenzione primaria													
C00-C15	T.m.prime vie aer-di	13.5 (1.8)	11.8	6.8	11.0	9.3	6.0	2.6 (.7)	2.4	1.3	1.5	1.4	1.0
C22	T.m.fegato	20.9 (2.3)	17.9	8.7	12.8	10.6	6.5	9.6 (1.4)	8.3	4.0	5.5	4.6	2.8
C32	T.m.laringe	7.9 (1.4)	6.8	3.7	5.8	4.9	3.1	.3 (.2)	.2	.1	.1	.1	.0
C33-C34	T.m.trach.bronch.pol	91.1 (4.9)	77.7	40.8	65.8	54.7	33.6	13.2 (1.6)	11.5	6.3	9.4	8.0	5.2
C67	T.m.vescica	16.8 (2.1)	14.6	6.3	7.2	6.0	3.6	3.4 (.8)	3.0	1.2	1.2	1.0	.6
F10	Alcoolismo psic.alco	1.2 (.6)	1.0	.7	1.1	.9	.7	.2 (.2)	.2	.1	.2	.1	.1
F11-F19	Farmacodipendenza	2.3 (.7)	2.5	2.3	2.4	2.6	2.3	.5 (.4)	.5	.5	.5	.6	.5
I60-I69	Dist.circol.encefalo	162.7 (6.5)	146.1	56.4	43.0	35.0	21.1	120.9 (4.4)	110.1	42.3	27.2	22.3	13.7
K70-K76	Cirrosi epatica	28.4 (2.7)	24.9	13.6	20.0	17.1	11.2	15.2 (1.7)	13.1	6.9	10.4	8.7	5.4
V01-Y99	Cause esterne mortal	69.0 (4.2)	65.3	45.7	52.2	49.6	40.5	26.5 (2.3)	25.0	14.9	13.9	13.3	11.1
-V01-V99	Incidenti mezzi tras	24.8 (2.5)	24.2	20.1	22.4	22.2	19.4	7.9 (1.4)	7.7	6.3	7.3	7.2	6.2
-X60-X84	Suicidi	18.1 (2.2)	16.7	11.3	15.1	14.0	10.4	3.1 (.8)	2.9	2.0	2.5	2.3	1.8
-X85-Y09	Omicidi	.6 (.4)	.6	.4	.5	.5	.4	.4 (.3)	.4	.3	.3	.3	.3
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.													
C18-C21	T.m.colon-retto	41.5 (3.3)	36.0	17.2	23.5	19.5	12.0	23.9 (2.1)	21.1	10.1	12.7	10.8	6.8
C43-C44	T.m.pelle	3.9 (1.0)	3.5	1.9	2.7	2.3	1.5	2.9 (.7)	2.6	1.5	1.9	1.7	1.2
C50	T.m.mammella	.3 (.3)	.3	.1	.1	.1	.0	34.5 (2.7)	30.5	18.4	27.7	24.2	16.4
C53	T.m.collo dell'utero	- (-)	-	-	-	-	-	1.7 (.6)	1.5	.9	1.2	1.1	.8
C54	T.m.corpo dell'utero	- (-)	-	-	-	-	-	1.6 (.6)	1.3	.6	.9	.8	.5
C55	T.m.utero n.s.	- (-)	-	-	-	-	-	5.1 (1.0)	4.5	2.5	3.6	3.2	2.1
III GRUPPO: assist.osp.territ													
A00-B99	Mal.batt.vir.parassi	11.2 (1.7)	10.7	7.5	9.1	8.7	6.9	4.2 (.9)	4.0	2.3	2.4	2.3	1.8
-B24	AIDS	6.6 (1.3)	6.6	5.8	7.1	7.1	5.9	1.6 (.6)	1.6	1.5	1.8	1.8	1.5
C62	T.m.testicolo	.2 (.2)	.2	.2	.2	.2	.2	- (-)	-	-	-	-	-
C81	Malattia di Hodgkin	.9 (.5)	.8	.4	.7	.6	.4	.8 (.4)	.8	.6	.8	.7	.5
C91-C95	Leucemie	14.5 (1.9)	12.9	7.1	8.5	7.4	5.4	7.5 (1.2)	6.8	4.0	4.6	4.1	3.2
I00-I09	Cardiopat.reumat.cro	1.7 (.7)	1.4	.8	1.2	1.1	.7	1.8 (.6)	1.5	.7	.9	.8	.5
I10-I15	Ipertensione	15.9 (2.0)	14.1	6.0	6.2	5.2	3.2	16.3 (1.7)	14.6	5.9	4.9	4.0	2.4
I20-I25	Mal.ischemiche cuore	205.3 (7.3)	181.1	78.7	86.8	72.4	44.8	111.8 (4.3)	100.8	39.0	28.7	23.5	14.2
J10-J22	Mal.respirat.acute	19.7 (2.3)	18.0	6.8	3.3	2.7	1.9	12.4 (1.3)	11.6	4.5	1.4	1.2	.9
J40-J47	Broncopn.cron.ostrut	54.9 (3.8)	48.5	18.2	14.6	11.6	6.6	13.5 (1.5)	12.2	4.7	3.7	3.0	1.8
K25-K28	Ulceria peptica	5.4 (1.2)	4.8	2.0	1.6	1.4	.9	2.1 (.6)	1.9	.7	.4	.3	.2
K35-K38	Appendicite	.2 (.2)	.1	.1	.1	.1	.0	0 (.1)	.0	.0	.0	.0	.0
K40-K46	Ernia addominale	1.4 (.6)	1.3	.7	.3	.3	.3	1.4 (.5)	1.2	.5	.5	.4	.3
K80-K82	Coledist.acuta e cro	2.6 (.8)	2.3	.9	.7	.6	.3	1.4 (.5)	1.4	.5	.2	.2	.1
000-O99	Gravid.parto puerper	.0 (.0)	.0	.0	.0	.0	.0	.2 (.2)	.2	.1	.2	.2	.1

Appendice

TABELLA A6. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
UMBRIA

Tasso di mortalità evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di età'	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE			
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	# <75 anni	standard. YPLL--	# <65 anni	# <75 anni	standard. YPLL--	#		
I GRUPPO: prevenzione primaria														
C00-C15	5-64	127.6	119.7 (6.0)	38.3	34.6 (3.2)	1761.1	5748	3069.0	11829	563.2	1839	957.0	3881	
T.m.prime vie aer-di	5-64	7.1	6.4 (1.3)	1.4	1.2 (.6)	46.6	167	116.5	478	18.0	63	29.0	117	
C22	T.m.fegato	5-64	6.2	5.7 (1.2)	2.7	2.3 (.7)	31.6	112	107.4	448	18.4	68	49.6	227
C32	T.m.laringe	5-64	3.4	3.1 (.9)	.0	.0 (.0)	23.4	83	59.0	243	.0	0	.5	3
C33-C34	T.m.trach.bronch.pol	5-64	31.3	28.3 (2.8)	5.7	4.9 (1.1)	180.0	650	564.4	2372	48.7	179	106.4	468
C67	T.m.vescica	5-64	3.1	2.8 (.8)	.6	.5 (.3)	17.4	66	58.0	251	3.6	13	10.0	47
F10	Alcoolismo psic.alco	5-64	.6	.6 (.4)	.0	.0 (.0)	10.4	35	17.1	67	.0	0	1.0	5
F11-F19	Farmacodipendenza	5-64	3.0	3.0 (.9)	.6	.7 (.4)	98.1	318	114.7	412	21.2	65	25.0	85
I60-I69	Dist.circol.encefalo	5-64	14.6	13.2 (1.9)	9.5	8.3 (1.5)	106.4	382	317.4	1364	94.8	330	225.9	1033
K70-K76	Cirrosi epatica	5-64	13.5	12.3 (1.8)	5.4	4.5 (1.1)	107.0	383	234.8	960	34.2	128	95.5	438
V01-Y99	Cause esterne mortal	0-75+	68.6	65.3 (3.9)	35.4	25.0 (2.1)	1140.1	3552	1479.2	5236	324.3	993	414.2	1460
-V01-V99	Incidenti mezzi tras	0-75+	24.5	24.2 (2.4)	8.2	7.7 (1.3)	636.6	1917	781.4	2658	203.8	612	251.6	862
-X60-X84	Suicidi	0-75+	17.8	16.7 (2.0)	3.4	2.9 (.7)	249.2	818	352.2	1313	44.4	148	62.0	235
-X85-Y09	Omicidi	0-75+	.6	.6 (.3)	.5	.4 (.2)	12.7	43	16.5	62	9.8	33	12.4	47
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.														
C18-C21	T.m.colon-retto	5-64	12.5	11.2 (1.8)	35.4	30.6 (2.9)	88.2	323	236.5	1001	315.1	1143	630.9	2701
T.m.colon-retto	5-64	10.7	9.7 (1.6)	7.3	6.4 (1.3)	71.3	260	202.0	856	62.0	222	138.8	605	
C43-C44	T.m.pelle	5-64	1.7	1.5 (.6)	1.3	1.2 (.6)	16.9	63	33.9	143	22.2	70	32.4	124
C50	T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	22.2	19.1 (2.3)	.0	0	.5	3	194.0	717	382.8	1643
C53	T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	1.2	1.1 (.5)	-	-	-	-	11.9	43	21.1	86
C54	T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.4	.4 (.3)	-	-	-	-	2.3	8	8.1	37
C55	T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	2.9	2.5 (.8)	-	-	-	-	22.7	84	47.8	207
III GRUPPO: assist.osp.territ														
A00-B99	Mal.batt.vir.parassi	5-64	64.6	58.8 (4.1)	22.1	19.3 (2.3)	693.3	2438	1441.8	5920	251.6	858	507.3	2206
Mal.batt.vir.parassi	5-64	10.3	9.5 (1.6)	2.4	2.3 (.8)	215.7	772	278.9	1104	58.2	198	74.4	284	
-B24	AIDS	5-64	9.0	8.3 (1.5)	2.2	2.1 (.8)	209.4	748	261.0	1028	56.7	193	69.1	260
C62	T.m.testicolo	5-64	.2	.2 (.2)	-	- (-)	6.5	17	7.8	23	-	-	-	-
C81	Malattia di Hodgkin	5-64	.2	.2 (.2)	.8	.7 (.4)	5.3	17	8.8	33	12.0	39	17.7	66
C91-C95	Leucemie	0-14	1.9	1.9 (1.8)	1.3	1.3 (1.6)	92.7	304	143.0	546	70.2	213	96.4	353
I00-I09	Cardiopat.reumat.cro	5-64	1.0	.9 (.4)	.3	.3 (.2)	5.8	21	14.6	60	3.1	13	8.3	40
I10-I15	Ipertensione	5-64	2.9	2.7 (.8)	1.6	1.4 (.6)	15.9	56	51.7	215	11.2	39	35.0	166
I20-I25	Mal.ischemiche cuore	5-64	40.0	36.1 (3.2)	11.2	9.4 (1.5)	299.2	1086	790.8	3329	72.4	272	218.1	1041
J10-J22	Mal.respirat.acute	5-64	1.0	.9 (.5)	.6	.5 (.3)	23.2	67	38.6	141	11.6	36	18.8	75
J40-J47	Broncopn.cron.ostrut	5-64	2.1	1.9 (.7)	1.1	.9 (.4)	10.5	38	73.6	335	4.8	18	23.2	116
K25-K28	Ulcera peptica	5-64	.9	.8 (.4)	.1	.1 (.1)	9.4	33	18.9	78	1.3	4	2.6	12
K35-K38	Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.5	3	.0	0	.0	0
K40-K46	Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.4	.4 (.3)	7.2	21	8.4	28	1.6	7	5.1	23
K80-K82	Colenist.acuta e cro	5-64	.3	.3 (.2)	.1	.1 (.1)	2.0	8	5.7	25	.2	1	1.2	6
OO0-O99	Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.3	.3 (.3)	.0	0	.0	0	5.3	18	6.5	25
Screening di popolazione														
C18-C21	T.m.colon-retto	50-74	70.9	63.5 (3.9)	38.3	34.6 (3.0)								
T.m.mammella	50-69	-	- (-)	67.3	66.0 (4.6)									
T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	1.6	1.6 (.4)									

Appendice

TABELLA A7. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.1 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per età e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	2	0	0	6	7	8	9	13	9	16	30	44	65	85	115	77	136	152	774
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	7	8	10	2	4	4	44
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	7	2	6	6	31	
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	5	4	3	1	1	21
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	16	20	28	38	12	14	11	148
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4	1	6	8	6	32
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	9	17	43	41	88	101	312
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	6	7	14	4	5	4	4	7
V01-Y99 Cause esterne mortal	2	0	0	6	6	6	8	10	5	2	7	8	4	16	7	7	11	16	121
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	1	0	0	5	5	3	4	5	1	1	3	1	1	5	4	2	3	1	45
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	1	0	2	3	1	2	0	3	3	1	3	2	4	4	2	31
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	10	9	18	10	12	11	78
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	9	7	18	10	12	10	73
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	5
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III GRUPPO: assist.osp.territori	1	0	1	0	1	0	3	10	5	8	17	23	39	65	83	91	124	126	597
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0	2	0	2	4	2	2	22
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	5	1	6	2	9	5	31
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	7	7	5	9	6	39
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	6	3	6	11	21	26	40	54	46	59	66	338
J10-J22 Mal.respirat.acute	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	5	11	16	41
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	11	11	26	33	29	113
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	8
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

TABELLA A8. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.1 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per età e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	0	0	1	2	4	5	0	4	5	3	4	8	15	32	59	61	127	261	591
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	4
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	2	2	5	15
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	5	6	4	7	6	34
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	5	1	1	13
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	5	3	15	30	44	98	214	413
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	5	8	11	0	9	6	44
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	0	1	2	4	3	0	1	3	1	0	0	2	1	6	5	9	28	66
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	0	2	4	2	0	1	1	0	0	0	0	1	2	2	1	0	16
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	4
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	10	15	16	18	30	24	24	19	162
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	7	12	10	13	12	63	
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	7
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	6	11	8	13	11	7	4	71
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	4
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	2	0	2	3	15
III GRUPPO: assist.osp.territori	0	0	0	1	1	1	1	1	4	4	4	6	15	32	53	66	136	238	563
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	4	1	11
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
C91-C95 Leucemie	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	3	3	18
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	11	15	31
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	6	9	21	35	44	89	160
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	8	21	32
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	4	14	44
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELLA A9. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.1 -

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI			FEMMINE			
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	----tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni	#	----tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni	#	
I GRUPPO:prevenzione primaria	5-64	145.1	135.9 (16.4)	36.5	34.4 (8.4)	1982.8	1003	3409.9	2008	657.4	309 1038.9	608
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	11.2	10.5 (4.5)	.0	.0 (.0)	72.0	37	195.7	118	.0	0 3.3	3
C22 T.m.fegato	5-64	4.9	4.3 (2.8)	1.4	1.2 (1.4)	13.1	8	66.9	44	8.4	5 23.3	17
C32 T.m.laringe	5-64	4.9	4.3 (2.8)	.0	.0 (.0)	43.8	26	99.4	65	.0	0 3.3	3
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	31.6	28.3 (7.3)	4.3	3.7 (2.6)	187.8	104	556.4	356	32.9	18 82.3	56
C67 T.m.vescica	5-64	4.9	4.5 (2.9)	2.1	1.8 (1.8)	38.6	21	90.2	55	19.5	11 35.2	23
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.7	.6 (.9)	.0	.0 (.0)	9.2	6	13.1	9	.0	0 0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	2.8	2.8 (2.4)	.7	.7 (1.2)	79.6	38	96.2	52	15.5	8 20.3	11
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	15.4	14.1 (5.2)	8.6	7.7 (3.8)	119.9	65	334.9	217	106.0	53 233.0	156
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	25.2	23.2 (6.7)	7.2	6.4 (3.5)	228.1	122	425.1	256	61.4	32 144.9	94
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	66.1	64.3 (10.2)	34.3	24.1 (5.5)	1190.7	577	1531.7	836	413.8	183 493.3	247
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	24.6	24.5 (6.4)	8.3	8.6 (3.8)	695.6	327	840.8	443	302.2	130 348.0	168
-X60-X84 Suicidi	0-75+	16.9	16.6 (5.2)	2.1	1.8 (1.5)	238.5	118	324.3	181	18.2	9 33.3	20
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 0	0
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.	5-64	12.6	11.2 (4.5)	33.7	29.8 (7.5)	74.7	42	215.1	139	258.3	136 570.3	363
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	11.2	10.0 (4.3)	6.4	5.5 (3.1)	68.9	38	191.5	124	31.4	18 107.0	75
C43-C44 T.m.pelle	5-64	1.4	1.2 (1.5)	2.9	2.7 (2.3)	5.8	3	23.6	15	50.7	25 70.1	39
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	20.1	17.9 (5.8)	.0	0	.0	0	149.0	78 323.7	203
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0 0	1
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.7	.6 (1.0)	-	-	-	-	4.2	3 9.6	7
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	3.6	3.1 (2.4)	-	-	-	-	23.1	13 59.1	38
III GRUPPO:assist.osp.territ	5-64	75.0	68.8 (11.5)	27.2	24.5 (6.9)	793.7	422	1643.9	1013	321.7	160 644.9	411
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	8.4	7.6 (3.8)	3.6	3.5 (2.6)	147.8	82	201.3	123	76.5	38 99.0	54
-B24 AIDS	5-64	6.3	5.9 (3.3)	2.9	2.9 (2.4)	135.6	74	173.1	104	75.1	37 92.8	50
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	.0	0	-	- -	-
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	1.4	1.4 (1.6)	.0	0	3.8	3	10.5	5 21.1	12
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	47.5	23	96.1	58	84.8	35 107.0	53
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.7	.6 (1.0)	.0	.0 (.0)	1.5	1	10.4	7	.0	0 4.0	3
I10-I15 Ipertensione	5-64	3.5	3.5 (2.7)	.7	.6 (1.0)	29.4	14	90.1	54	1.4	1 24.4	20
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	51.2	46.5 (9.4)	16.5	14.2 (5.1)	425.5	233	989.1	621	136.0	74 339.5	233
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	2.1	2.2 (2.1)	.7	.6 (1.0)	94.3	43	123.9	66	9.8	6 14.8	10
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	2.1	2.0 (1.9)	.7	.6 (1.0)	11.7	6	80.4	53	1.4	1 28.2	22
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	1.4	1.3 (1.5)	.0	.0 (.0)	36.1	20	48.4	30	.0	0 0	0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.7	.6 (1.0)	.0	0	.0	0	1.4	1 6.9	5
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 0	0
OO0-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 0	0
Screening di popolazione												
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	70.7	61.6 (10.0)	46.0	39.1 (8.1)							
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	66.2	66.3 (12.1)							
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)							

Appendice

TABELLA A10. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 1 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE			
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	# <65 anni	tassi standard. YPLL--	
I GRUPPO:prevenzione primaria											
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	137.6	129.4 (21.1)	35.8	33.8 (11.0)	1947.0	574 3355.4	1147	659.9	181 1024.8	347
C22 T.m.fegato	5-64	10.9	10.1 (5.9)	.0	.0 (0.0)	59.3	18 184.2	65	.0	0 0 .0	0
C32 T.m.laringe	5-64	3.6	3.1 (3.2)	1.2	1.0 (1.8)	7.5	3 62.5	24	7.2	3 18.9	8
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	6.0	5.3 (4.2)	.0	.0 (0.0)	56.8	19 136.0	51	.0	0 0 .0	0
C67 T.m.vescica	5-64	35.0	31.5 (10.2)	3.7	3.4 (3.4)	224.2	73 642.8	237	21.1	6 67.9	25
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	6.0	5.7 (4.5)	1.2	1.1 (1.9)	62.2	19 121.0	42	27.9	9 38.3	15
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	3.6	3.7 (3.8)	.0	.0 (0.0)	135.4	38 155.2	48	.0	0 0 .0	0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	7.2	7.2 (5.2)	9.9	9.2 (5.7)	81.4	23 227.8	83	164.5	47 284.4	102
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	25.3	22.9 (8.7)	8.7	7.5 (4.9)	195.4	63 386.5	138	60.9	19 162.5	63
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	67.3	66.4 (13.8)	29.0	21.7 (7.1)	1125.0	320 1439.0	460	378.3	98 452.9	133
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	23.7	23.7 (8.4)	8.1	7.9 (4.8)	631.9	178 760.1	238	240.2	61 282.7	81
-X60-X84 Suicidi	0-75+	16.1	15.7 (6.7)	1.8	1.3 (1.6)	212.7	63 281.3	93	2.4	1 12.0	5
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0 .0	0	.0	0 0 .0	0
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.											
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	13.3	11.8 (6.2)	29.7	26.3 (9.4)	70.2	23 215.5	80	239.7	72 501.2	182
C43-C44 T.m.pelle	5-64	12.1	10.7 (5.9)	7.4	6.4 (4.6)	62.4	20 192.3	72	37.8	12 113.9	44
C50 T.m.mammella	5-64	1.2	1.0 (1.9)	2.5	2.4 (2.9)	7.7	3 23.1	8	55.3	15 70.5	22
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (0.0)	16.1	14.5 (7.0)	.0	0 0 .0	0	129.8	39 266.2	95
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (0.0)	-	- - -	-	.0	0 0 .0	0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	1.2	1.0 (1.8)	-	- - -	-	7.2	3 16.4	7
		-	- (-)	2.5	2.0 (2.5)	-	- - -	-	9.5	3 34.1	14
III GRUPPO:assist.osp.territori											
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	74.8	68.1 (15.1)	27.2	25.0 (9.3)	794.7	249 1656.8	596	315.1	87 666.1	243
-B24 AIDS	5-64	10.9	9.6 (5.6)	4.9	4.7 (4.1)	174.8	58 243.0	88	104.3	30 134.6	43
C62 T.m.testicolo	5-64	7.2	6.6 (4.7)	3.7	3.7 (3.7)	154.3	50 196.6	70	102.0	29 123.8	39
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (0.0)	-	- (-)	.0	0 0 .0	0	-	- - -	-
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	20.5	7 60.3	23	74.3	17 95.9	28
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0 .0	3	.0	0 1.2	1
I10-I15 Ipertensione	5-64	3.6	3.7 (3.7)	1.2	1.0 (1.7)	33.8	9 111.2	38	2.4	1 30.4	13
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	53.1	48.3 (12.7)	14.8	13.3 (6.7)	449.4	143 1009.1	366	113.0	33 324.7	128
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	81.0	21 107.1	33	.0	0 0 .0	0
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	1.2	1.0 (1.8)	.0	.0 (0.0)	2.5	1 65.0	26	.0	0 29.9	13
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	1.2	1.0 (1.9)	.0	.0 (0.0)	32.8	11 47.3	18	.0	0 0 .0	0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0 .0	0	.0	0 0 .0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (0.0)	1.2	1.0 (1.7)	.0	0 0 .0	0	2.4	1 12.0	5
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0 .0	0	.0	0 0 .0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0 .0	0	.0	0 0 .0	0
Screening di popolazione											
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	73.1	64.1 (13.5)	42.8	37.5 (10.6)						
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	50.4	50.8 (14.0)						
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (0.0)						

TABELLA A11. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 1 DSB 2

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE			
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	---tassi standard. YPLL---	# <75 anni	# <65 anni	---tassi standard. YPLL---	
I GRUPPO:prevenzione primaria	5-64	155.7	144.6 (26.1)	37.5	35.4 (13.2)	2033.6	428 3487.3	861	657.0	128 1062.8	262
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	11.7	10.9 (7.2)	.0	.0 (.0)	88.3	19 209.9	53	.0	0 7.8	3
C22 T.m.fegato	5-64	6.7	5.8 (5.1)	1.7	1.4 (2.5)	20.5	5 72.8	20	10.2	3 29.3	8
C32 T.m.laringe	5-64	3.3	2.8 (3.5)	.0	.0 (.0)	26.4	7 50.5	14	.0	0 7.8	3
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	26.8	23.7 (10.3)	5.1	4.3 (4.3)	136.1	32 435.8	119	50.9	13 105.1	31
C67 T.m.vescica	5-64	3.3	2.9 (3.6)	3.4	2.7 (3.3)	6.9	2 49.4	13	6.4	2 29.1	8
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	1.7	1.3 (2.4)	.0	.0 (.0)	22.9	6 32.6	9	.0	0 0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	1.7	1.4 (2.5)	1.7	1.8 (3.1)	3.5	1 15.6	4	38.4	8 50.3	11
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	26.8	23.5 (10.2)	6.8	5.6 (4.8)	173.8	42 483.0	134	26.7	7 163.9	54
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	25.1	23.3 (10.5)	5.1	4.9 (5.0)	271.1	59 475.0	118	62.2	13 121.0	31
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	64.4	62.4 (15.5)	41.5	26.9 (8.9)	1284.0	257 1662.2	376	462.2	85 548.5	113
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	25.8	25.6 (10.1)	8.6	9.4 (6.4)	774.7	149 941.5	204	382.2	69 431.5	87
-X60-X84 Suicidi	0-75+	18.0	17.9 (8.4)	2.4	2.5 (3.1)	275.9	56 385.7	88	41.6	8 64.9	15
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0 0	0
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.	5-64	11.7	10.3 (6.8)	39.2	34.3 (12.5)	82.1	19 216.0	59	281.6	64 660.8	181
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	10.0	8.8 (6.3)	5.1	4.2 (4.2)	78.6	18 191.2	53	23.5	6 99.1	31
C43-C44 T.m.pelle	5-64	1.7	1.4 (2.5)	3.4	3.2 (3.9)	3.5	1 24.7	7	44.4	10 69.3	18
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	25.5	22.3 (10.0)	.0	0 0	0	172.8	39 398.4	108
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	- -	-	.0	0 1.7	1
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	- -	-	.0	0 0	0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	5.1	4.6 (4.6)	-	- -	-	40.9	9 92.2	24
III GRUPPO:assist.osp.territorio	5-64	75.3	69.5 (18.0)	27.2	24.0 (10.5)	793.3	173 1627.3	418	333.0	73 620.1	168
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	5.0	4.8 (4.9)	1.7	1.8 (3.1)	110.0	24 143.4	35	38.4	8 50.3	11
-B24 AIDS	5-64	5.0	4.8 (4.9)	1.7	1.8 (3.1)	110.0	24 141.2	34	38.4	8 50.3	11
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0 0	0	- -	- -	-
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0 0	0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	83.4	17 144.4	35	99.4	18 122.0	25
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	1.7	1.4 (2.5)	.0	.0 (.0)	3.5	1 15.6	4	.0	0 7.8	3
I10-I15 Ipertensione	5-64	3.3	3.1 (3.9)	.0	.0 (.0)	23.8	5 62.2	16	.0	0 16.4	7
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	48.5	44.0 (14.2)	18.7	15.7 (8.2)	391.1	89 959.2	255	168.1	41 362.0	105
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	5.0	5.1 (5.1)	1.7	1.4 (2.5)	118.4	23 153.2	33	23.9	6 35.7	10
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	3.3	3.1 (3.9)	1.7	1.4 (2.4)	23.8	5 100.6	27	3.2	1 25.8	8
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	1.7	1.5 (2.6)	.0	.0 (.0)	39.2	9 48.5	13	.0	0 0	0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0 0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0 0	0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0 0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0 0	0
Screening di popolazione											
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	67.6	58.1 (14.7)	50.4	41.5 (12.5)						
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	87.5	86.7 (21.2)						
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)						

Appendice

TABELLA A12. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.2 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per età e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE	
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	0	2	9	20	21	14	19	23	35	60	83	161	211	318	224	311	333	1845	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	15	5	10	6	5	5	64	
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	6	13	23	22	16	17	4	107	
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	7	5	6	4	3	6	38	
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	15	25	48	78	103	49	39	20	390	
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7	9	12	14	12	9	67	
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	0	0	0	6	
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	1	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	9	27	45	103	99	190	248	
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	6	9	17	19	27	13	22	11	
V01-Y99 Cause esterne mortal	1	0	2	9	19	16	11	11	13	10	25	21	26	25	33	23	23	30	298	
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	1	0	1	6	11	7	3	5	4	3	8	7	11	10	8	8	3	4	100	
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	3	3	5	5	5	3	5	6	9	10	9	9	8	3	2	85	
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	8	22	31	44	28	23	32	201	
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	22	28	42	25	21	27	182	
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	3	2	3	2	5	19	
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III GRUPPO: assist.osp.territori	1	2	1	1	2	1	17	17	9	27	31	64	77	157	213	228	324	345	1517	
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	1	1	14	12	5	4	1	2	6	0	4	3	2	1	56	
-B24 AIDS	0	0	0	0	1	1	14	12	5	4	1	0	3	0	0	0	0	0	41	
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
C91-C95 Leucemie	0	2	1	0	1	0	1	3	0	2	1	3	8	7	7	5	9	9	59	
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	0	0	6	
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	5	9	9	13	17	63	
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	20	26	47	49	113	137	138	208	202	948
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	14	25	36	87	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	24	42	52	64	66	256	
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	3	1	9	23	
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	
K40-K46 Ernia addominale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	2	10	

TABELLA A13. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.2 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per età e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	0	1	2	4	10	7	6	14	12	20	34	43	98	135	172	345	576	1480
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	2	2	2	0	4	3	3	21
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	5	9	15	18	11	13	79
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	4	9	4	11	12	5	13	69
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	3	5	22
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7	10	12	46	72	109	269	467	1000
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	12	16	20	10	16	17	98
V01-Y99 Cause esterne mortal	1	0	1	2	4	8	5	5	6	4	5	4	6	12	12	21	34	56	186
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	1	1	3	5	3	2	4	2	2	0	2	6	3	3	4	2	43
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	2	0	1	2	3	2	1	1	18
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	1	0	0	4	7	7	17	26	34	44	35	50	35	68	69	397
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	8	9	7	11	16	14	29	37	135
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	6	1	0	5	16
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	13	13	21	32	20	26	12	27	199
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	2	0	7
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	2	0
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	0	2	7	8	5	33
III GRUPPO: assist.osp.territori	0	1	0	1	0	1	2	9	2	3	7	21	28	64	113	158	298	568	1276
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	2	1	3	5	3	20
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C91-C95 Leucemie	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	5	1	3	9	6	5	36
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	1
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	8	7	11	16	48
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	4	12	21	42	75	114	213	350	836
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	9	28	81	127
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	11	8	24	59	112
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	4	10	19
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	10
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

TABELLA A14. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.2 -

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI			FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	----tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni	#	<65 anni	# <75 anni	#
I GRUPPO: prevenzione primaria											
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	119.4	112.7 (9.2)	41.0	37.1 (5.2)	1537.2	2038	2801.1	4324	567.0	762 1004.5
C22 T.m.fegato	5-64	6.7	6.1 (2.1)	2.4	2.1 (1.2)	55.4	81	130.0	212	30.2	43 48.4
C32 T.m.laringe	5-64	3.7	3.6 (1.6)	3.5	3.0 (1.4)	42.8	61	134.6	220	27.1	39 67.0
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	27.0	24.9 (4.2)	5.9	5.2 (1.9)	176.9	249	530.6	867	57.9	85 114.8
C67 T.m.vescica	5-64	2.9	2.6 (1.3)	.5	.4 (.5)	14.7	23	53.9	92	1.1	2 7.3
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.5	.5 (.6)	.0	.0 (.0)	6.3	8	13.8	22	.0	0 1.3
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	3.2	3.0 (1.5)	.3	.3 (.4)	99.2	137	116.0	177	10.1	13 11.6
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	12.6	11.4 (2.8)	9.9	8.7 (2.4)	78.6	114	275.6	469	81.0	118 230.5
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	10.4	9.5 (2.6)	5.1	4.3 (1.7)	75.2	109	188.7	309	20.9	33 82.7
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	62.5	60.8 (6.1)	36.8	27.3 (3.6)	961.8	1222	1293.2	1858	338.9	431 440.9
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	21.0	20.9 (3.6)	8.5	7.9 (2.1)	457.8	563	588.5	818	192.0	241 240.6
-X60-X84 Suicidi	0-75+	17.8	17.0 (3.2)	3.6	3.0 (1.2)	273.0	360	382.6	570	50.4	68 67.0
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.8	.8 (.7)	.4	.3 (.3)	28.4	38	34.5	52	3.6	6 5.1
											9
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.											
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	11.5	10.6 (2.8)	37.5	32.9 (4.8)	73.4	104	221.0	362	348.3	505 658.8
C43-C44 T.m.pelle	5-64	10.4	9.6 (2.6)	7.5	6.6 (2.1)	57.0	81	192.0	316	63.7	93 133.8
C50 T.m.mammella	5-64	1.1	1.0 (.8)	.8	.8 (.8)	16.4	23	29.0	46	24.4	28 32.4
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	24.6	21.4 (3.8)	.0	0	.0	0	216.7	322 413.9
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	1.3	1.2 (.9)	-	-	-	-	14.7	21 23.8
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.3	.2 (.3)	-	-	-	-	.5	1 6.4
				2.9	2.6 (1.3)	-	-	-	-	28.1	41 48.5
											79
III GRUPPO: assist.osp.territ											
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	66.5	60.9 (6.7)	20.1	17.6 (3.5)	740.5	1052	1513.7	2455	205.7	289 455.3
-B24 AIDS	5-64	12.3	11.0 (2.8)	1.6	1.5 (1.0)	244.8	363	317.6	520	34.4	50 46.7
C62 T.m.testicolo	5-64	11.0	9.8 (2.6)	1.3	1.2 (.9)	239.8	356	301.4	493	31.1	46 38.5
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	.0	0	-	-
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	1.9	3	.0	0 1.3
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	4.6	4.6 (4.6)	1.6	1.6 (2.7)	105.6	138	156.3	235	62.4	79 86.4
I10-I15 Ipertensione	5-64	1.3	1.2 (.9)	.0	.0 (.0)	5.0	8	14.7	24	.0	0 3.0
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	2.7	2.4 (1.3)	1.3	1.2 (.9)	15.9	23	46.0	77	16.3	23 37.5
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	40.1	36.7 (5.2)	11.2	9.6 (2.5)	315.3	453	823.6	1350	70.3	105 224.1
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	.5	.6 (.7)	.8	.7 (.7)	16.4	17	25.9	35	5.3	8 13.7
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	2.1	1.9 (1.1)	1.3	1.1 (.8)	8.9	13	76.5	135	6.7	11 25.5
K35-K38 Appendicite	5-64	1.3	1.3 (.9)	.3	.3 (.4)	9.5	13	23.7	37	3.2	4 6.1
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	1.5	3	.0	0 .0
K80-K82 Colenist.acuta e cro	5-64	.3	.2 (.4)	.0	.0 (.0)	1.6	3	7.2	13	.0	0 .3
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.3	.4 (.7)	.0	0	.0	0	5.6	8 7.3
											11
Screening di popolazione											
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	74.4	67.9 (6.6)	32.1	30.3 (4.5)						
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	67.3	66.3 (7.4)						
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	1.8	1.8 (.8)						

Appendice

TABELLA A15. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 2 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	---tassi standard. YPLL---	<65 anni	# <75 anni	#	<65 anni	# <75 anni	#	
I GRUPPO: prevenzione primaria	5-64	111.0	106.2 (12.5)	37.3	34.5 (7.0)	1433.0	1013	2640.1	2105	588.9	422	980.1	822
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	9.2	8.5 (3.5)	2.5	2.3 (1.8)	52.9	40	123.0	103	36.7	28	58.1	49
C22 T.m.fegato	5-64	7.1	6.7 (3.2)	4.0	3.6 (2.2)	59.5	43	167.3	135	28.4	22	66.1	59
C32 T.m.laringe	5-64	4.1	3.9 (2.4)	.0	.0 (.0)	23.4	17	64.2	52	.0	0	.0	0
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	27.5	26.1 (6.2)	3.5	3.1 (2.1)	185.1	135	535.9	438	36.5	29	81.7	73
C67 T.m.vescica	5-64	2.0	1.7 (1.6)	.0	.0 (.0)	18.4	15	48.8	43	.0	0	3.9	4
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	1.0	1.0 (1.2)	.0	.0 (.0)	12.2	8	26.2	20	.0	0	2.8	3
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	4.6	4.1 (2.4)	.0	.0 (.0)	130.2	99	153.4	129	.0	0	.0	0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	13.2	12.5 (4.3)	7.6	6.7 (3.0)	99.2	73	281.4	235	57.3	46	191.4	180
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	8.7	8.2 (3.5)	3.5	3.1 (2.0)	62.7	46	180.4	147	19.6	16	56.3	52
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	49.3	48.8 (7.8)	33.7	27.1 (5.2)	789.3	536	1059.0	805	410.3	282	519.8	402
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	17.1	17.5 (4.7)	11.0	10.1 (3.3)	366.9	241	480.9	353	227.4	154	285.5	218
-X60-X84 Suicidi	0-75+	15.9	15.2 (4.3)	3.4	3.1 (1.8)	246.3	175	337.6	268	77.9	55	96.0	76
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.4	.3 (.6)	.8	.5 (.7)	7.0	6	10.0	9	6.6	6	9.4	9
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	5-64	13.8	13.0 (4.3)	41.4	37.0 (7.1)	89.4	66	261.0	214	398.7	305	746.5	648
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	12.2	11.5 (4.1)	10.6	9.6 (3.6)	69.9	52	227.5	188	88.0	68	184.3	159
C43-C44 T.m.pelle	5-64	1.5	1.4 (1.5)	1.5	1.6 (1.7)	19.5	14	33.5	27	46.5	28	58.8	42
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	25.2	22.1 (5.4)	.0	0	.0	0	218.7	175	422.6	378
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	1.5	1.3 (1.3)	-	-	-	-	15.6	13	25.4	23
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0	8.3	8
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	2.5	2.3 (1.8)	-	-	-	-	29.8	23	47.1	39
III GRUPPO: assist.osp.territorio	5-64	71.8	66.7 (9.8)	15.1	13.5 (4.3)	930.7	692	1758.8	1451	148.9	108	379.5	340
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	16.8	14.7 (4.5)	1.5	1.3 (1.3)	354.4	281	448.9	392	34.8	28	43.6	38
-B24 AIDS	5-64	15.3	13.4 (4.3)	1.5	1.3 (1.3)	346.9	275	429.4	375	34.8	28	43.1	38
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	.0	0	-	-	-	-
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	3.9	3	.0	0	2.8	3
C91-C95 Leucemie	0-14	6.0	5.9 (7.3)	.0	.0 (.0)	138.5	94	192.2	148	41.1	23	63.7	46
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	1.5	1.4 (1.4)	.0	.0 (.0)	5.5	4	17.2	14	.0	0	2.8	3
I10-I15 Ipertensione	5-64	3.6	3.3 (2.2)	1.0	.9 (1.1)	17.2	13	53.3	43	2.1	2	31.3	29
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	37.7	35.3 (7.1)	9.1	8.0 (3.3)	317.6	238	829.2	685	54.5	43	189.5	178
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.0	1.1 (1.5)	.5	.4 (.7)	31.9	17	46.1	30	3.0	3	9.6	9
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	3.1	2.8 (2.0)	.0	.0 (.0)	13.0	10	90.1	77	.0	0	14.0	14
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	2.0	1.9 (1.7)	.0	.0 (.0)	16.7	12	32.2	25	.0	0	1.8	3
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.5	.4 (.7)	32.9	21	34.6	24	3.0	3	6.3	6
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.5	.4 (.8)	.0	.0 (.0)	3.2	3	10.6	9	.0	0	.6	1
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.6	.8 (1.3)	.0	0	.0	0	10.5	8	13.7	11
Screening di popolazione													
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	84.1	79.5 (10.3)	38.4	39.1 (7.4)								
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	67.2	66.7 (10.5)								
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	2.1	2.0 (1.1)								

Appendice

TABELLA A16. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 2 DSB 2

Tasso di mortalità evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	# <65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	#	
I GRUPPO: prevenzione primaria													
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	131.2	126.0 (24.5)	45.8	42.0 (13.9)	1688.3	357	3046.9	755	770.2	161	1303.6	334
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	6.6	6.0 (5.2)	4.9	4.4 (4.4)	21.3	5	98.5	27	41.6	9	75.1	19
C22 T.m.fegato	5-64	13.1	11.9 (7.4)	1.6	1.4 (2.3)	54.6	13	179.3	49	3.2	1	52.6	17
C32 T.m.laringe	5-64	4.9	4.7 (4.8)	.0	.0 (.0)	27.7	6	84.5	21	.0	0	.0	0
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	23.0	21.3 (9.9)	8.2	7.3 (5.7)	151.5	35	461.9	124	83.3	19	168.4	46
C67 T.m.vescica	5-64	4.9	4.5 (4.6)	.0	.0 (.0)	10.8	3	69.6	18	.0	0	.0	0
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	2.2	1	.0	0	.0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	3.3	3.4 (4.3)	.0	.0 (.0)	123.6	25	142.0	32	.0	0	.0	0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	6.6	5.9 (5.1)	13.1	11.7 (7.2)	40.2	10	240.4	69	118.6	27	293.3	83
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	13.1	11.7 (7.2)	4.9	4.0 (4.0)	108.9	27	222.5	60	22.2	6	74.6	23
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	65.5	64.9 (16.0)	36.5	29.5 (9.7)	1149.7	233	1545.4	354	501.4	99	639.6	148
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	25.7	26.5 (10.4)	10.9	11.4 (6.7)	753.8	147	922.9	202	385.5	77	463.6	104
-X60-X84 Suicidi	0-75+	18.0	17.1 (8.0)	3.6	2.8 (2.9)	215.1	48	338.9	85	.0	0	10.0	3
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	1.3	1.3 (2.3)	.0	.0 (.0)	35.0	8	45.9	11	.0	0	.0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.													
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	6.6	6.2 (5.4)	36.0	32.1 (11.9)	64.8	15	176.1	48	325.7	77	620.8	168
C21 T.m.colon-retto	5-64	4.9	4.7 (4.8)	3.3	3.0 (3.7)	27.7	6	120.9	33	42.2	10	73.3	21
C43-C44 T.m.pelle	5-64	1.6	1.4 (2.5)	.0	.0 (.0)	37.1	9	55.1	15	.0	0	1.8	1
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	26.1	22.7 (9.9)	.0	0	.0	0	221.4	53	431.3	118
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	3.3	3.3 (4.1)	-	-	-	-	39.3	8	64.2	15
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0	.0	0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	3.3	3.0 (3.7)	-	-	-	-	22.8	5	50.2	13
III GRUPPO: assist.osp.territ													
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	68.9	64.0 (17.2)	22.9	20.8 (9.7)	599.3	140	1497.9	398	263.3	60	536.4	149
-B24 AIDS	5-64	3.3	3.0 (3.8)	3.3	3.2 (3.9)	78.4	18	99.6	26	58.1	13	87.9	23
C62 T.m.testicolo	5-64	3.3	3.0 (3.8)	1.6	1.5 (2.6)	78.4	18	97.4	25	38.5	9	47.6	13
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	-	-	-	-
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	58.4	14	126.2	33	44.3	11	54.4	15
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	10.0	3
I10-I15 Ipertensione	5-64	.0	.0 (.0)	1.6	1.7 (3.0)	.0	0	25.2	8	60.7	13	79.7	19
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	57.4	53.4 (15.7)	9.8	8.7 (6.2)	462.5	108	1171.2	309	71.0	17	215.2	64
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (.0)	1.6	1.4 (2.3)	.0	0	11.4	3	3.2	1	16.3	5
J40-J47 Broncopn.cron.ostrutt	5-64	.0	.0 (.0)	3.3	2.7 (3.3)	.0	0	64.1	19	6.4	2	40.8	13
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	1.6	1.7 (2.9)	.0	0	.0	0	19.6	4	32.1	8
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K80-K82 Colenist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
Screening di popolazione													
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	65.2	56.4 (14.8)	23.2	17.6 (8.0)								
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	76.5	74.6 (19.6)								
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	4.5	5.0 (3.5)								

Appendice

TABELLA A17. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 2 DSB 3

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	# <65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	#	
I GRUPPO:prevenzione primaria	5-64	114.8	106.2 (22.4)	55.4	48.4 (15.0)	1739.0	359 2984.4	753	533.9	115 1045.7	278		
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	6.7	6.1 (5.4)	1.7	1.5 (2.6)	74.4	17 130.7	33	24.8	6 35.3	9		
C22 T.m.fegato	5-64	3.3	2.7 (3.4)	1.7	1.9 (3.3)	13.2	3 69.6	20	22.2	4 62.1	17		
C32 T.m.laringe	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 1.9	1	.0	0 0.0	0		
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	30.0	25.7 (10.5)	10.4	8.7 (6.2)	157.6	37 581.1	167	122.5	28 190.4	51		
C67 T.m.vescica	5-64	1.7	1.3 (2.3)	1.7	1.3 (2.3)	3.2	1 18.2	6	3.1	1 15.8	5		
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0.0	0	.0	0 0.0	0		
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0.0	0	.0	0 0.0	0		
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	13.3	10.9 (6.7)	19.0	16.9 (8.9)	67.0	17 276.5	86	189.3	41 388.6	105		
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	10.0	8.8 (6.3)	10.4	8.0 (5.6)	72.7	17 185.2	51	25.1	7 123.4	39		
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	76.2	71.2 (16.3)	28.5	19.7 (7.6)	1350.8	268 1721.0	389	147.0	28 230.0	52		
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	26.7	24.6 (9.6)	1.2	1.5 (2.6)	610.7	118 749.7	165	22.2	4 36.2	8		
-X60-X84 Suicidi	0-75+	17.8	16.8 (7.9)	2.5	2.2 (2.8)	352.8	74 460.7	110	22.2	4 36.2	8		
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	2.5	2.7 (3.4)	.0	.0 (.0)	125.4	25 143.4	32	.0	0 0.0	0		
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.	5-64	10.0	8.2 (5.8)	38.1	32.3 (12.0)	40.9	10 142.5	42	335.4	77 614.8	163		
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	10.0	8.2 (5.8)	5.2	4.2 (4.2)	40.9	10 142.5	42	43.8	11 88.0	26		
C43-C44 T.m.pelle	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0.0	0	.0	0 7.5	3		
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	29.4	25.3 (10.7)	.0	0 0.0	0	257.3	58 463.7	120		
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	- -	-	.0	0 0.0	0		
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	- -	-	.0	0 0.0	0		
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	3.5	2.8 (3.5)	-	- -	-	34.3	8 55.4	15		
III GRUPPO:assist.osp.territ	5-64	51.6	44.5 (13.9)	24.2	21.1 (9.8)	327.9	78 998.7	288	365.2	78 600.1	159		
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	3.3	2.9 (3.7)	1.7	1.6 (2.7)	37.8	8 61.6	16	40.8	9 58.0	15		
-B24 AIDS	5-64	1.7	1.6 (2.8)	1.7	1.6 (2.7)	34.6	8 45.3	11	40.8	9 50.5	13		
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0 0.0	0	-	- -	-		
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0.0	0	.0	0 0.0	0		
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	10.0	9.4 (16.3)	9.5	3 51.6	15	188.9	39 217.2	51		
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	1.7	1.4 (2.5)	.0	.0 (.0)	10.1	3 21.3	6	.0	0 0.0	0		
I10-I15 Ipertensione	5-64	1.7	1.4 (2.5)	.0	.0 (.0)	10.1	3 31.6	9	.0	0 1.7	1		
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	38.3	33.2 (12.0)	13.8	11.9 (7.4)	250.4	59 710.9	203	122.9	27 284.1	80		
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 1.9	1	.0	0 0.0	0		
J40-J47 Broncopn.cron.ostrutt	5-64	1.7	1.4 (2.5)	3.5	2.7 (3.3)	10.1	3 86.5	28	12.6	3 39.2	13		
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 14.1	5	.0	0 0.0	0		
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 8.4	3	.0	0 0.0	0		
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0.0	0	.0	0 0.0	0		
K80-K82 Colenist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 10.3	3	.0	0 0.0	0		
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0.0	0	.0	0 0.0	0		
Screening di popolazione													
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	52.4	45.1 (12.7)	22.7	18.4 (8.1)								
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	66.9	68.5 (18.6)								
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)								

Appendice

TABELLA A18. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 2 DSB 4

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI		FEMMINE		#	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)			standard. YPLL---	standard. YPLL---	# <65 anni	# <75 anni		
I GRUPPO: prevenzione primaria													
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	140.7	128.1 (25.1)	33.8	28.0 (11.2)	1527.5	310	2902.8	712	296.1	64	702.7	199
C22 T.m.fegato	5-64	12.3	10.6 (7.0)	.0	.0 (.0)	83.9	19	188.7	49	.0	0	.0	0
C32 T.m.laringe	5-64	1.8	1.4 (2.5)	5.3	4.4 (4.4)	3.4	1	52.0	16	55.1	13	92.5	25
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	5.3	5.1 (5.2)	.0	.0 (.0)	62.2	13	111.0	26	.0	0	.0	0
C67 T.m.vescica	5-64	25.0 (11.4)	7.1	6.0 (5.2)	212.9	43	551.6	138	38.3	8	97.0	26	
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	2.0	1	.0	0	.0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	1.8	1.8 (3.3)	1.8	2.0 (3.5)	67.0	13	77.0	16	72.4	13	83.2	16
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	15.8	13.0 (7.5)	5.3	4.1 (4.1)	57.7	14	271.2	79	16.3	4	141.1	48
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	14.1	11.7 (7.2)	5.3	4.1 (4.1)	84.4	20	189.1	52	16.3	4	122.3	39
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	88.7	81.5 (17.6)	55.9	31.5 (8.6)	938.6	184	1372.2	310	94.6	22	150.5	40
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	22.9	20.6 (8.8)	5.1	3.4 (3.0)	272.1	58	403.7	98	24.4	6	44.3	13
-X60-X84 Suicidi	0-75+	24.2	23.3 (9.7)	5.1	3.9 (3.5)	343.1	63	504.5	108	34.4	8	55.9	15
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.													121
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	10.6	9.2 (6.6)	24.9	20.9 (9.8)	60.6	13	213.6	58	208.4	47	448.3	22
C43-C44 T.m.pelle	5-64	10.6	9.2 (6.6)	3.6	2.8 (3.4)	60.6	13	200.7	54	19.8	5	70.4	0
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	12.8	4	.0	0	.0	0
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	16.0	14.0 (8.1)	.0	0	.0	0	165.6	36	321.4	83
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0	.0	0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	1.8	1.4 (2.3)	-	-	-	-	3.2	1	14.5	4
III GRUPPO: assist.osp.territ													145
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	15.8	14.2 (8.2)	.0	.0 (.0)	252.0	56	352.1	87	.0	0	.0	0
-B24 AIDS	5-64	14.1	12.7 (7.8)	.0	.0 (.0)	248.5	55	334.5	82	.0	0	.0	0
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	.0	0	-	-	-	-
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
C91-C95 Leucemie	0-14	10.3	10.6 (18.5)	.0	.0 (.0)	149.0	28	181.2	38	23.0	6	63.3	19
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	1.8	1.4 (2.5)	.0	.0 (.0)	3.4	1	15.5	4	.0	0	.0	0
I10-I15 Ipertensione	5-64	3.5	2.8 (3.5)	3.6	2.9 (3.5)	33.7	8	59.4	17	34.4	8	57.6	16
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	31.7	27.4 (11.3)	17.8	13.8 (7.6)	215.3	48	569.8	153	73.4	18	289.7	90
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (.0)	1.8	1.9 (3.2)	.0	0	2.0	1	22.0	4	41.0	10
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	1.8	1.4 (2.5)	1.8	1.5 (2.6)	3.4	1	37.1	11	24.4	6	36.6	10
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	1.8	1.4 (2.5)	.0	.0 (.0)	3.4	1	24.2	7	.0	0	.0	0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
Screening di popolazione													
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	77.3	67.8 (16.3)	31.1	26.3 (10.0)								
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	58.7	56.0 (17.1)								
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)								

Appendice

TABELLA A19. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.3 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	2	3	13	12	14	8	11	9	8	21	43	82	118	139	119	148	169	920
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	5	6	5	2	4	3	32
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	9	6	9	8	1	42
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	6	1	3	0	15
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	17	33	47	50	35	23	7	223
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	6	6	5	4	29
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	4
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	2	7	13	24	45	46	83	121
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	10	6	7	4	8	7	51
V01-Y99 Cause esterne mortal	1	2	3	13	12	11	7	9	5	4	5	8	12	16	14	14	13	26	175
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	1	2	1	11	8	5	5	6	3	2	2	1	5	7	9	5	2	1	76
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	2	2	2	1	3	2	2	0	5	3	5	1	4	1	3	36
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	3	11	17	22	14	19	9	104
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2	9	14	20	12	19	9	92
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	2	0	0	0	11
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	0	0	0	2	5	5	7	6	14	24	26	70	122	126	183	181
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	0	5	4	4	0	1	1	0	0	0	3	0	18
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	14
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	5
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	2	1	11	10	4	38
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	4	5	6	33
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	7	19	20	51	76	81	114	475
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	6	10	21	43
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	23	20	35	130
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	14
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	5
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	7

TABELLA A20. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.3 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	0	0	0	1	2	5	2	3	4	7	6	6	17	33	63	57	139	251	596
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	4	10
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	4	3	6	8	27
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3	3	4	2	10	3	31
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	6
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	7	15	42	40	94	195
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	3	7	5	3	6	5	36
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	0	0	1	2	4	2	1	1	0	1	2	2	4	7	6	18	35	86
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	0	1	2	2	2	1	0	0	1	0	2	2	5	1	1	1	21
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	5
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	1	0	1	1	4	10	10	18	16	24	32	35	29	31	212
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	4	4	7	14	17	15	17	85
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	1	2	1	10	10
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	4	12	8	15	13	14	7	13	95
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	5
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	4	1	1	1	2	0	0	13
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	0	0	1	2	5	6	2	2	7	14	23	58	84	170	314	688
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1	2	11
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	4
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	2	3	2	4	6	29
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10	9	19	30
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	9	14	34	58	117	217
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	6	41
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	9	6	13	22
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
000-099 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

TABELLA A21. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.3 -

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	tassi standard.	YPLL--# <75 anni	#	<65 anni	tassi standard.	YPLL--# <75 anni	#
I GRUPPO:prevenzione primaria	5-64	133.7	130.6 (15.1)	31.8	28.7 (6.8)	2153.9	1228	3526.0	2395	472.6	281	794.0	593
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	7.1	6.7 (3.3)	1.2	1.1 (1.3)	53.6	33	127.5	93	16.5	10	25.0	18
C22 T.m.fegato	5-64	5.3	5.1 (2.9)	1.8	1.4 (1.4)	20.1	13	92.5	70	10.2	8	31.6	28
C32 T.m.laringe	5-64	1.2	1.1 (1.3)	.0	.0 (.0)	10.8	7	32.6	26	.0	0	.0	0
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	36.1	33.9 (7.5)	5.4	4.7 (2.7)	187.3	119	635.3	482	49.8	33	95.3	73
C67 T.m.vescica	5-64	1.2	1.0 (1.2)	.0	.0 (.0)	9.2	7	39.3	33	.0	0	2.6	3
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.6	.6 (.9)	.0	.0 (.0)	1.3	1	8.9	7	.0	0	.0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	1.2	1.3 (1.5)	.6	.6 (.9)	45.0	25	51.6	32	14.7	9	18.2	13
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	16.0	15.1 (5.0)	7.2	6.2 (3.1)	136.9	86	355.4	273	70.0	43	177.9	156
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	11.2	10.5 (4.1)	6.0	5.2 (2.8)	66.6	43	173.3	127	51.6	35	111.8	90
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	79.0	76.1 (10.1)	36.7	23.5 (4.7)	1623.1	895	2009.1	1253	259.8	143	331.7	213
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	34.3	34.2 (6.9)	9.0	7.7 (3.1)	1078.6	585	1283.4	783	194.2	106	241.3	152
-X60-X84 Suicidi	0-75+	16.2	15.7 (4.5)	2.1	2.0 (1.6)	287.0	165	385.0	252	39.4	23	53.3	35
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.	5-64	13.6	12.4 (4.4)	36.6	31.5 (7.0)	99.7	68	262.6	205	340.3	223	657.5	513
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	10.6	9.8 (4.0)	9.0	8.0 (3.6)	77.5	52	209.7	163	100.3	61	185.5	140
C43-C44 T.m.pelle	5-64	3.0	2.6 (2.0)	1.8	1.6 (1.6)	22.2	16	49.8	39	25.1	16	38.5	28
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	19.8	16.5 (5.0)	.0	0	3.0	3	154.9	108	327.9	266
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	1.2	1.2 (1.4)	-	-	-	-	20.1	12	28.5	18
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0	3.1	3
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	4.8	4.0 (2.4)	-	-	-	-	39.9	27	73.9	57
III GRUPPO:assist.osp.territ	5-64	52.6	49.4 (9.0)	23.4	20.6 (5.7)	553.8	353	1217.5	926	278.8	174	520.1	410
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	8.9	8.3 (3.7)	3.0	2.9 (2.2)	197.1	128	249.5	178	72.6	44	94.0	64
-B24 AIDS	5-64	8.3	7.7 (3.5)	3.0	2.9 (2.2)	190.0	123	238.0	170	72.6	44	90.9	61
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	.0	0	-	-	-	-
C81 Malattie di Hodgkin	5-64	1.2	1.2 (1.5)	2.4	2.4 (2.0)	29.5	17	41.0	27	52.5	30	67.8	43
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	66.4	41	114.7	83	56.2	36	91.4	68
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.6	.5 (.9)	.0	.0 (.0)	3.8	3	8.7	7	.0	0	2.6	3
I10-I15 Ipertensione	5-64	2.4	2.3 (2.0)	.6	.6 (1.0)	16.7	10	40.6	29	7.0	4	19.3	18
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	31.9	29.7 (7.0)	9.6	8.0 (3.4)	230.1	148	667.1	519	59.8	40	176.9	157
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.2	1.1 (1.3)	.6	.5 (.8)	5.1	3	19.0	15	1.1	1	6.2	6
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	.6	.5 (.9)	1.8	1.6 (1.5)	3.8	3	62.6	58	9.2	6	34.3	31
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.6	.6 (.9)	.0	.0 (.0)	1.3	1	9.6	8	.0	0	.0	0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.6	.5 (.8)	.0	0	3.6	3	3.4	3	7.3	6
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.6	1	.0	0	.0	0
000-099 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.7	.9 (1.5)	.0	0	.0	0	17.0	11	20.1	14
Screening di popolazione													
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	69.3	60.0 (9.0)	41.5	35.7 (7.0)								
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	64.7	61.8 (10.5)								
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	1.7	1.8 (1.2)								

Appendice

TABELLA A22. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 3 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	tassi standard. YPLL--
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	72.7	69.3 (38.6)	39.2	37.2 (29.3)	893.2	50 1821.3	118	741.4
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 16.0	2	.0
C22 T.m.fegato	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 51.2	4	.0
C32 T.m.laringe	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 .0	0	.0
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	21.8	23.0 (23.1)	7.8	9.4 (16.3)	129.8	6 389.9	23	110.9
C67 T.m.vescica	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 .0	0	.0
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 .0	0	.0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 .0	0	.0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	14.5	12.6 (15.6)	15.7	11.9 (14.5)	163.5	10 453.4	33	27.9
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 43.2	3	.0
V01-V99 Cause esterne mortal	0-75+	48.4	42.0 (25.1)	46.7	29.8 (19.5)	599.9	34 867.4	53	602.6
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	10.8	8.9 (10.9)	10.4	10.5 (13.5)	147.0	9 217.0	15	345.0
-X60-X84 Suicidi	0-75+	5.4	4.5 (7.8)	5.2	5.8 (10.1)	147.0	9 181.8	13	257.6
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 .0	0	.0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	7.3	6.9 (12.1)	39.2	36.7 (28.7)	16.5	1 145.0	9	500.0
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	7.3	6.9 (12.1)	.0	.0 (. .)	16.5	1 109.8	7	.0
C43-C44 T.m.pelle	5-64	.0	.0 (. .)	7.8	6.9 (11.9)	.0	0 35.1	3	48.6
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (. .)	23.5	20.8 (20.9)	.0	0 .0	0	259.5
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (- -)	7.8	9.0 (15.7)	-	- -	-	191.9
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (- -)	.0	.0 (. .)	-	- -	-	.0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (- -)	.0	.0 (. .)	-	- -	-	.0
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 .0	0	.0
-B24 AIDS	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 .0	0	.0
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (. .)	-	- (- -)	.0	0 .0	0	-
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	7.3	7.1 (12.3)	.0	.0 (. .)	251.7	13 289.2	16	.0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	142.3	8 186.5	11	.0
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 .0	0	.0
I10-I15 Ipertensione	5-64	7.3	9.5 (16.6)	7.8	9.4 (16.3)	112.9	4 184.3	8	110.9
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	29.1	35.1 (30.6)	15.7	14.3 (17.5)	339.2	13 938.3	52	171.4
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 .0	0	.0
J40-J47 Broncopn.cron.estrut	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 24.0	3	.0
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 8.0	1	.0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 .0	0	.0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 8.0	1	.0
K80-K82 Colenist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 .0	0	.0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0 .0	0	.0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	38.9	37.2 (26.4)	32.6	27.4 (21.1)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (- -)	87.0	67.2 (36.8)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (- -)	11.0	13.6 (13.5)				

Appendice

**TABELLA A23. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 3 DSB 2**

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid..per causa.

Screening di popolazione

C18-C21	T.m. colon-rettio	50-74	57.3	44.9 (13.3)	33.6	27.8 (10.9)
C50	T.m. mammella	50-69	-	(-)	53.3	52.9 (17.9)
C53	T.m. collo dell'utero	25-64	-	(-)	.0	.0 (.0)

Appendice

TABELLA A24. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 3 DSB 3

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI	FEMMINE		# <75 anni	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)				standard. YPLL---	standard. YPLL---		
I GRUPPO: prevenzione primaria												
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	129.5	126.3 (18.9)	32.9	29.5 (8.9)	2158.5	757	3559.8	1491	428.5	158	746.2
C22 T.m.fegato	5-64	6.7	6.4 (4.2)	1.9	1.8 (2.2)	68.3	26	135.2	59	26.9	10	40.7
C32 T.m.laringe	5-64	5.8	5.4 (3.8)	1.0	.8 (1.4)	16.8	7	96.1	45	1.9	1	15.4
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	1.0	.8 (1.5)	.0	.0 (.0)	6.1	3	34.5	18	.0	0	0
C67 T.m.vescica	5-64	43.2	40.5 (10.5)	5.8	4.9 (3.5)	222.7	88	765.8	355	56.1	23	98.2
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	5.0	3	.0	0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	1.0	1.0 (1.8)	.0	.0 (.0)	37.7	13	43.3	16	.0	0	0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	13.4	12.5 (5.8)	7.7	7.0 (4.3)	113.0	45	313.3	151	91.3	33	193.1
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	9.6	8.8 (4.9)	7.7	6.6 (4.1)	75.3	30	173.6	79	69.8	30	143.8
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	73.5	70.7 (12.5)	31.2	20.6 (5.7)	1616.4	546	1972.5	754	182.5	61	255.0
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	37.5	36.9 (9.2)	9.0	7.9 (4.0)	1171.6	393	1381.5	521	171.3	56	221.0
-X60-X84 Suicidi	0-75+	14.7	14.0 (5.5)	1.4	1.2 (1.4)	260.4	90	340.0	134	5.6	3	16.1
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.												
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	18.2	16.4 (6.6)	28.1	24.6 (8.0)	144.2	61	352.2	168	250.1	101	524.9
C43-C44 T.m.pelle	5-64	14.4	13.1 (5.9)	9.7	8.6 (4.7)	110.3	46	280.7	133	80.8	32	172.9
C50 T.m.mammella	5-64	3.8	3.3 (2.9)	1.0	.9 (1.6)	34.0	15	66.5	33	23.5	9	30.8
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-.-	(-)	1.0	1.0 (1.6)	-.-	-.-	-.-	-.-	11.2	4	18.3
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-.-	(-)	.0	.0 (.0)	-.-	-.-	-.-	-.-	.0	0	.9
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-.-	(-)	1.0	.8 (1.3)	-.-	-.-	-.-	-.-	12.7	6	22.3
III GRUPPO: assist.osp.territ												
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	53.7	50.2 (11.6)	25.2	22.3 (7.6)	521.1	205	1195.3	559	295.6	115	553.1
-B24 AIDS	5-64	9.6	9.1 (5.0)	3.9	3.8 (3.3)	193.2	75	253.4	108	89.7	33	115.0
C62 T.m.testicolo	5-64	8.6	8.1 (4.7)	3.9	3.8 (3.3)	181.9	71	234.9	101	89.7	33	114.1
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	0.0	.0 (.0)	15.5	13.4 (5.8)	-.0	0	5.0	3	121.9	50	279.6
C91-C95 Leucemie	0-14	1.0	.9 (1.7)	1.9	1.8 (2.2)	11.3	4	18.4	8	26.9	10	39.8
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	0.0	.0 (.0)	0.0	.0 (.0)	62.5	24	105.1	47	90.4	36	147.7
I10-I15 Ipertensione	5-64	2.9	2.7 (2.8)	0.0	.0 (.0)	15.6	6	46.2	21	.0	0	9.5
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	33.6	31.0 (9.1)	8.7	7.3 (4.2)	230.4	93	676.8	325	42.3	18	151.6
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	0.0	.0 (.0)	0.0	.0 (.0)	0.0	0	7.2	4	.0	0	.9
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	1.0	.8 (1.5)	1.9	1.8 (2.2)	6.1	3	66.1	36	13.1	5	44.1
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	1.0	.9 (1.6)	.0	.0 (.0)	2.2	1	14.7	7	.0	0	0
K35-K38 Appendicite	5-64	0.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	0.0	0	0.0	0	.0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	0.0	.0 (.0)	1.0	.8 (1.4)	0.0	0	5.0	3	5.6	3	11.9
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	0.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	0.0	0	1.0	1	.0	0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	1.2	1.4 (2.5)	0.0	0	0.0	0	27.6	11	32.7
Screening di popolazione												
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	79.1	70.9 (12.6)	46.7	40.6 (9.6)	75	253.4	108	89.7	33	115.0	48
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	67.8	64.3 (13.6)	151	91.3	33	114.1	-	-	-
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	1.3	1.4 (1.4)	1.3	1	1.3	1	1	1	1

TABELLA A25. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.4 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	4	1	0	5	18	18	7	11	16	22	38	54	119	156	228	199	258	226	1380
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	6	10	0	2	1	24
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	11	6	13	14	10	3	63
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	1	5	2	3	0	20
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13	14	50	61	65	49	42	19	321
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	6	12	14	16	10	67
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	2	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	11	16	40	66	84	147	168	545
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4	3	15	13	23	13	13	3	97
V01-Y99 Cause esterne mortal	4	1	0	5	15	13	6	5	9	6	9	15	16	22	34	23	25	22	230
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	1	1	0	5	11	8	1	1	2	1	1	7	6	6	9	7	3	3	73
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	1	2	2	3	5	2	5	4	7	10	9	6	3	3	62
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	5	10	9	21	31	30	29	18	161
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	9	7	20	28	28	27	17	147
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	3	0	2	1	12
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	2	1	4	10	10	8	12	13	31	66	106	150	175	236	228	1052
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	3	7	6	3	0	1	1	2	2	3	4	6	4	42
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	3	7	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20
C62 T.m.testicolo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
C91-C95 Leucemie	0	0	0	1	1	1	3	1	0	2	0	1	4	7	6	8	6	3	44
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	2	0	8
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	6	6	8	13	11	52
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	3	4	9	11	23	46	73	102	112	146	130	659
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	12	16	21	61
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	11	23	28	32	42	144
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	6	18
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	7
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	6	13

TABELLA A26. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.4 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	1	0	4	1	4	3	5	6	10	15	21	28	54	114	114	201	359	941
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	3	8	8	8
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	9	6	3	3	35	
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	6	13	17	12	11	5	74
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	8	3	18
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	1	0	0	0	2	3	3	4	8	6	17	68	67	146	295	620
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	6	10	12	15	5	15	68
V01-Y99 Cause esterne mortal	1	1	0	2	1	4	2	2	1	3	5	4	6	5	5	11	26	35	114
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	1	0	2	0	3	0	2	1	2	0	2	5	2	1	2	1	1	25
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	2	0	1	1	2	4	1	17
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	4
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	0	2	6	12	20	18	22	56	46	43	55	35	315
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	4	19	14	20	25	23	117
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	2	6	16
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10	14	11	11	28	22	17	21	5	146
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	2	1	0	10
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	4	0	9
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	4	1	2	1	17
III GRUPPO: assist.osp.territ	1	0	1	1	0	2	3	3	1	5	4	9	24	40	92	107	205	329	827
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	1	1	3	5	10	26
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	4
C91-C95 Leucemie	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	7	5	8	9	39
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	3	2	1	12
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	14	13	12	78
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	7	12	24	60	65	136	203	511
J10-J22 Mal.respirat.acute	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	18	41	69
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	9	17	21	54
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	6	13
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	5	8
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	7
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Appendice

TABELLA A27. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL n.4 -

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	# <75 anni	<65 anni	# <75 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	125.7	114.2 (11.3)	39.7	34.9 (6.1)	1711.1	1479	2980.2	3103
C22 T.m.fegato	5-64	2.0	1.8 (1.4)	.8	.7 (.8)	17.4	16	48.8	56
C32 T.m.laringe	5-64	6.9	6.1 (2.5)	2.8	2.3 (1.5)	32.2	31	100.1	113
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	3.7	3.1 (1.8)	.0	.0 (.0)	15.7	16	45.6	53
C67 T.m.vescica	5-64	34.6	29.9 (5.6)	6.5	5.3 (2.3)	175.9	178	572.9	668
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.8	.8 (.9)	.0	.0 (.0)	23.5	20	30.0	29
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	4.1	4.2 (2.3)	1.2	1.4 (1.3)	142.3	118	165.2	152
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	16.3	14.2 (3.8)	10.9	9.5 (3.1)	120.3	117	345.3	405
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	13.0	11.5 (3.5)	4.5	3.6 (1.8)	116.1	110	242.2	268
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	71.8	64.7 (7.5)	33.2	23.3 (4.0)	1052.7	858	1371.8	1288
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	22.8	22.0 (4.5)	7.3	6.9 (2.5)	566.4	443	691.3	615
-X60-X84 Suicidi	0-75+	19.4	17.0 (3.8)	4.9	3.9 (1.7)	194.6	174	301.5	310
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.9	.8 (.8)	1.2	1.1 (.9)	4.6	4	9.5	10
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	13.0	11.2 (3.4)	32.4	27.2 (5.2)	110.4	110	254.4	295
C43-C44 T.m.pelle	5-64	11.0	9.5 (3.1)	6.5	5.4 (2.3)	89.8	89	217.4	253
C50 T.m.mammella	5-64	2.0	1.7 (1.3)	.8	.6 (.7)	20.6	21	36.9	43
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	21.5	18.1 (4.3)	.0	0	.0	0
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	1.6	1.3 (1.1)	-	-	-	8.9
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.8	.7 (.8)	-	-	-	5.1
				1.2	1.0 (.9)	-	-	-	3.8
						-	-	-	4
									23.5
									33
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	63.9	56.6 (7.8)	21.5	18.3 (4.4)	662.0	613	1376.9	1526
-B24 AIDS	5-64	9.4	8.9 (3.2)	2.4	2.4 (1.7)	221.1	199	282.4	283
C62 T.m.testicolo	5-64	8.1	7.9 (3.0)	2.4	2.4 (1.7)	217.1	195	264.3	262
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.8	.9 (1.1)	-	- (-)	24.5	17	29.7	23
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.4	.4 (.6)	.0	0	.4	1
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	2.6	2.7 (4.6)	117.4	102	169.2	171
I10-I15 Ipertensione	5-64	.8	.7 (.9)	1.2	.9 (.9)	11.2	10	21.1	23
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	3.3	2.8 (1.7)	3.2	2.6 (1.5)	8.1	8	46.6	55
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	39.1	33.8 (5.9)	9.3	7.5 (2.6)	255.6	252	721.7	839
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	.8	.7 (.8)	.4	.3 (.5)	3.2	3	19.8	25
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.8	.7 (.8)	.4	.3 (.5)	16.3	17	72.7	90
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	2.5	3
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.4	.3 (.5)	.0	0	.4	1
K80-K82 Coleist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.4	.3 (.5)	4.6	5	9.8	12
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
									0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	67.2	60.3 (7.3)	40.5	36.8 (5.8)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	69.5	67.5 (8.9)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	2.2	1.9 (.9)				

TABELLA A28. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 4 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)			standard. YPLL---	----tassi standard. YPLL---	# <65 anni	# <75 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria											
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	128.6	116.8 (15.0)	33.1	29.3 (7.5)	1881.7	957	3126.6	1869	460.0	232
C22 T.m.fegato	5-64	2.1	1.8 (1.8)	.7	.5 (.9)	13.0	8	43.4	29	3.8	3
C32 T.m.laringe	5-64	5.6	5.0 (3.1)	2.1	1.7 (1.7)	20.5	12	83.9	55	14.6	9
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	2.1	1.7 (1.7)	.0	.0 (.0)	9.3	6	24.2	17	.0	0
C67 T.m.vescica	5-64	31.6	27.4 (7.1)	5.5	4.5 (2.7)	163.6	98	538.8	359	18.1	12
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.7	.5 (1.0)	.0	.0 (.0)	9.1	6	16.7	12	.0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	6.3	6.4 (3.7)	2.1	2.3 (2.4)	216.4	106	251.7	136	82.5	36
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	17.6	15.3 (5.3)	10.3	9.3 (4.2)	141.4	79	358.4	238	160.1	83
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	11.9	10.6 (4.5)	4.1	3.3 (2.4)	110.3	61	219.3	138	17.7	12
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	75.8	68.9 (10.3)	27.5	18.4 (4.5)	1172.6	567	1508.2	830	161.8	78
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	20.7	20.0 (5.7)	4.5	4.3 (2.6)	508.1	238	615.8	325	102.3	45
-X60-X84 Suicidi	0-75+	19.6	17.9 (5.2)	5.0	3.8 (2.2)	292.7	150	424.0	246	52.5	28
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	1.6	1.4 (1.5)	.5	.5 (.8)	7.6	4	16.2	10	7.0	4
										11.4	8
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.											
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	18.3	15.6 (5.3)	29.0	24.1 (6.5)	163.2	95	329.5	217	261.9	158
C43-C44 T.m.pelle	5-64	14.8	12.6 (4.8)	4.1	3.6 (2.5)	127.9	74	270.9	178	40.7	23
C50 T.m.mammella	5-64	3.5	3.0 (2.3)	.0	.0 (.0)	35.3	21	58.6	38	.0	0
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-.-	(-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	6.8
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-.-	(-)	.7	.6 (1.0)	-	-	-	-	7.0	4
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-.-	(-)	1.4	1.1 (1.4)	-	-	-	-	2.7	2
										28.0	22
III GRUPPO: assist.osp.territ.											
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	51.3	45.7 (9.3)	18.6	15.8 (5.3)	507.6	273	1115.1	706	232.6	120
-B24 AIDS	5-64	8.4	8.1 (4.1)	2.1	2.1 (2.1)	195.6	100	251.7	143	72.1	36
C62 T.m.testicolo	5-64	7.0	6.9 (3.8)	2.1	2.1 (2.1)	190.2	97	231.9	130	72.1	36
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.7	.6 (1.1)	-	- (-)	1.5	1	6.7	4	-	-
C91-C95 Leucemie	0-14	3.5	3.0 (2.4)	.0	.0 (.0)	.6 (1.0)	.0	0	0	7.0	4
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	92.7	46	133.9	77	37.5	20
I10-I15 Ipertensione	5-64	30.2	26.3 (7.0)	3.4	2.8 (2.2)	9.9	6	55.2	37	14.8	9
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	3.5	3.0 (2.4)	6.9	5.6 (3.1)	185.6	106	559.8	368	8.5	6
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.4	1.1 (1.3)	.7	.6 (1.0)	13.0	8	60.4	44	1.3	1
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	.7	.6 (1.1)	.0	.0 (.0)	1.5	1	20.9	14	54.9	21
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.8	1	0	.7
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.7	.6 (1.0)	.0	0	.8	1	1.3	1
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	1.4	1.1 (1.4)	.7	.6 (1.0)	7.8	5	16.5	12	1.3	1
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	6.1	4
										0	0
Screening di popolazione											
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	64.9	60.1 (9.8)	34.1	31.7 (7.3)						
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	81.4	78.6 (12.7)						
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)						

Appendice

TABELLA A29. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 4 DSB 2

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	tassi standard. YPLL--
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	105.4	96.2 (21.6)	47.5	41.1 (13.8)	1383.5	268 2531.3	614 436.4	98 895.9
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	3.5	3.1 (3.9)	.0	.0 (0.0)	40.1	8 73.9	18 .0	0 .0
C22 T.m.fegato	5-64	5.2	4.3 (4.3)	3.5	2.8 (3.4)	10.2	3 71.3	21 6.5	2 54.5
C32 T.m.laringe	5-64	6.9	5.7 (5.0)	.0	.0 (0.0)	13.6	3 65.8	18 .0	0 .0
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	32.8	28.3 (11.3)	10.6	9.6 (6.9)	177.9	41 575.3	157 114.4	25 213.4
C67 T.m.vescica	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 27.3	9 .0	0 1.6
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 .0	0 .0	0 .0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	1.7	1.8 (3.2)	.0	.0 (0.0)	66.0	13 75.8	16 .0	0 .0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	8.6	7.5 (5.9)	12.3	10.6 (7.0)	48.3	11 217.5	63 101.1	23 244.5
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	10.4	9.1 (6.5)	3.5	2.8 (3.4)	75.9	17 197.4	53 6.5	2 46.8
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	60.8	57.5 (15.0)	32.9	25.0 (8.8)	951.5	173 1226.7	259 207.8	47 335.0
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	29.1	28.5 (10.8)	10.1	8.5 (5.3)	688.9	122 867.5	178 97.2	23 158.7
-X60-X84 Suicidi	0-75+	13.2	11.4 (6.4)	8.9	7.3 (4.9)	6.8	2 37.1	11 89.5	20 134.2
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 .0	0 .0	0 .0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	3.5	3.2 (4.0)	33.4	28.1 (11.2)	24.4	5 114.6	33 239.4	54 523.8
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	3.5	3.2 (4.0)	10.6	8.5 (6.0)	24.4	5 112.5	32 67.5	17 162.3
C43-C44 T.m.pelle	5-64	.0	.0 (0.0)	3.5	2.8 (3.4)	.0	0 2.1	1 6.5	2 29.6
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (0.0)	17.6	15.4 (8.5)	.0	0 .0	0 155.4	33 299.6
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (0.0)	-	- -	- .0	0 .0
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (0.0)	-	- -	- .0	0 .0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	1.8	1.4 (2.5)	-	- -	- 10.0	3 32.3
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	79.5	70.4 (18.1)	26.4	22.8 (10.3)	922.2	200 1751.1	453 355.0	74 630.6
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	12.1	11.1 (7.3)	5.3	4.8 (4.8)	309.7	69 386.6	96 139.5	31 167.7
-B24 AIDS	5-64	12.1	11.1 (7.3)	5.3	4.8 (4.8)	309.7	69 376.1	93 139.5	31 167.7
C62 T.m.testicolo	5-64	1.7	2.2 (3.9)	-	- (-)	100.3	16 110.1	19 -	- -
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 2.1	1 .0	0 .0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (0.0)	10.5	10.8 (18.8)	127.2	27 213.2	53 127.7	22 149.6
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	1.7	1.7 (3.0)	3.5	2.8 (3.5)	36.7	8 50.2	12 27.4	7 49.2
I10-I15 Ipertensione	5-64	3.5	2.8 (3.5)	3.5	2.8 (3.4)	6.8	2 47.4	13 6.5	2 53.4
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	48.4	41.4 (13.6)	10.6	8.4 (6.0)	313.8	73 830.3	228 53.9	13 188.7
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 8.3	3 .0	0 11.1
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	5.2	4.6 (4.7)	.0	.0 (0.0)	27.8	6 102.7	28 .0	0 9.4
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 .0	0 .0	1 1.6
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 .0	0 .0	0 .0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 .0	0 .0	0 .0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 .0	0 .0	0 .0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 .0	0 .0	0 .0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	58.3	50.6 (13.7)	42.4	38.7 (12.3)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	53.7	53.1 (16.4)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (0.0)				

TABELLA A30. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1994-1996.
ASL 4 DSB 3

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	# <75 anni	# <65 anni	# <75 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15	T.m.prime vie aer-di	5-64 .0	126.6 (.27.4) .0 (. .)	51.1 2.2	46.6 (17.2) 2.2 (. 3.7)	1561.2 .0	254 0	3020.3 28.2	619 8
C22	T.m.fegato	5-64	13.2 11.9 (8.5)	4.4	3.8 (4.7)	98.7	17	193.9 38	45.8 30.0
C32	T.m.laringe	5-64	4.4 4.0 (4.9)	.0	.0 (.0)	38.7	7	83.5 18	60.0 5
C33-C34	T.m.trach bronch.pol	5-64	46.1 38.9 (14.8)	4.4	4.0 (4.9)	214.9	39	674.2 152	1545.1 38.6
C67	T.m.vescica	5-64	.0 .0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	21.4 6	106.5 .0
F10	Alcoolismo psic.alco	5-64	2.2 2.5 (4.4)	.0	.0 (.0)	102.9	14	115.3 18	8.5 .0
F11-F19	Farmacodipendenza	5-64	.0 .0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	0 .0	0 .0
I60-I69	Dist.circol.encefalo	5-64	22.0 18.3 (10.1)	11.1	8.8 (6.9)	143.8	27	448.8 105	58.1 11
K70-K76	Cirrosi epatica	5-64	19.8 16.9 (9.8)	6.7	5.6 (5.7)	180.8	33	358.6 77	86.9 16
V01-Y99	Cause esterne mortal	0-75+ 73.8	60.4 (16.1)	50.8	36.1 (12.3)	781.4	118	1096.0 199	825.7 113
-V01-V99	Incidenti mezzi tras	0-75+ 21.3	19.5 (9.8)	12.3	13.5 (8.7)	581.9	83	689.9 498.7	979.8 68
-X60-X84	Suicidi	0-75+ 26.2	21.0 (9.3)	.0	.0 (.0)	133.6	23	259.9 53	591.6 .0
-X85-Y09	Omicidi	0-75+ .0	.0 (.0)	4.6	4.4 (4.8)	.0	0	.0 0	0 .0
									155.8 23
									181.4 30
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21	T.m.colon-retto	5-64 8.8	7.6 (6.6)	42.2	34.5 (13.9)	55.7	10	193.5 46	713.3 371.3
C43-C44	T.m.pelle	5-64 .0	7.6 (6.6)	8.9	7.6 (6.7)	55.7	10	181.7 43	155.6 60.0
C50	T.m.mammella	5-64 .0	.0 (.0)	22.2	18.8 (10.4)	.0	0	0 11.8	0 .0
C53	T.m.collo dell'utero	5-64 -	- (-)	8.9	6.6 (5.7)	-	-	- -	437.3 48.4
C54	T.m.corpo dell'utero	5-64 -	- (-)	2.2	1.5 (2.7)	-	-	- -	100.2 3.6
C55	T.m.utero n.s.	5-64 -	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	- -	18.4 1 .0
									1.8 0
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99	Mal.batt.vir.parassi	5-64 8.8	7.9 (6.9)	.0	.0 (.0)	174.6	30	228.8 44	0 .0
-B24	AIDS	5-64 6.6	6.1 (6.2)	.0	.0 (.0)	170.4	29	207.5 39	0 .0
C62	T.m.testicolo	5-64 .0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	0 0	- -
C81	Malattia di Hodgkin	5-64 .0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	0 0	0 .0
C91-C95	Leucemie	0-14 .0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	183.0	29	224.1 41	201.9 170.2
I10-I19	Cardiopat.reumat.cro	5-64 2.2	1.8 (3.1)	.0	.0 (.0)	12.9	3	27.2 6	0 .0
I10-I15	Ipertensione	5-64 2.2	1.7 (3.1)	2.2	1.5 (2.7)	4.2	1	21.2 5	18.4 3.6
I20-I25	Mal.ischemiche cuore	5-64 54.9	46.9 (16.3)	15.5	11.7 (7.7)	402.9	73	1067.4 243	272.4 93.4
J10-J22	Mal.respirat.acute	5-64 2.2	1.8 (3.1)	2.2	1.5 (2.7)	12.9	3	34.0 8	16.5 3.6
J40-J47	Broncopn.cron.ostrut	5-64 6.6	5.3 (5.3)	.0	.0 (.0)	12.6	3	73.0 18	0 .0
K25-K28	Ulcera peptica	5-64 .0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	9.5 3	0 .0
K35-K38	Appendicite	5-64 .0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	0 0	0 .0
K40-K46	Ernia addominale	5-64 .0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	0 0	0 .0
K80-K82	Colenist.acuta e cro	5-64 .0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	0 0	1.8 0
O00-O99	Gravid.parto puerper	15-49 .0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	0 0	0 .0
									0 0
Screening di popolazione									
C18-C21	T.m.colon-retto	50-74 84.1	70.4 (17.5)	57.6	49.6 (15.3)				
C50	T.m.mammella	50-69 -	- (-)	51.1	49.7 (17.4)				
C53	T.m.collo dell'utero	25-64 -	- (-)	12.0	9.9 (4.9)				

Appendice

TABELLA A31. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
UMBRIA

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	4	1	6	22	53	48	61	46	62	78	126	234	364	524	764	845	690	941	4869
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	12	16	22	19	35	24	14	17	164
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	14	24	40	49	46	31	22	240
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	18	10	19	13	7	3	80
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	1	0	0	0	0	0	12	16	36	83	137	232	230	238	87	62	1134
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	19	32	57	55	39	45	266
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	6
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	2	2	10	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	26
I60-I69 Dist.circol.encefalo	1	0	0	0	1	0	1	3	7	12	11	37	52	99	220	362	417	679	1902
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	2	7	14	18	26	39	42	56	55	31	27	317
V01-Y99 Cause esterne mortal	3	1	5	22	50	46	49	28	30	32	32	37	53	49	97	52	63	85	734
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	1	0	5	19	34	23	24	7	12	8	12	11	13	15	34	14	8	14	254
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	2	6	7	6	9	7	10	4	8	18	16	21	8	18	6	146
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	8
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	2	4	2	4	9	22	37	39	73	120	115	95	77	599
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	2	2	2	2	7	16	31	32	68	113	106	90	67	538
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	5	6	7	5	6	8	5	10	58
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3
III GRUPPO: assist.osp.territ	1	2	0	3	2	7	15	22	35	48	88	142	200	347	646	752	747	1098	4155
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	1	0	0	0	0	0	9	7	5	4	3	2	4	9	9	17	12	14	96
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	7	7	5	2	2	1	0	2	0	0	0	26
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	5
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	1	7
C91-C95 Leucemie	0	2	0	2	0	1	1	2	5	4	7	3	10	23	35	45	29	32	201
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	3	7	1	5	0	20
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	8	14	17	18	58	49	46	75	292
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	1	5	3	10	22	33	62	110	153	234	403	437	428	647	2548
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	2	3	15	21	47	44	112
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	7	10	35	100	141	165	194	658
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	8	10	6	12	43
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	10
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	3	10
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	4	8

TABELLA A32. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
UMBRIA

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	3	1	13	14	13	18	25	21	39	42	56	72	160	305	499	720	1665	3667
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	2	5	9	14	9	8	52
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	1	4	20	23	24	29	31	141
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	9	10	14	15	31	53	43	32	247
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	5	5	14	8	21	59
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
I60-I69 Dist.circol.encefalo	1	1	0	2	0	0	1	2	4	7	9	13	23	62	156	320	539	1390	2530
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	1	0	4	7	8	2	12	13	23	33	48	46	36	233
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	2	1	9	14	11	14	14	8	11	13	11	14	14	25	35	57	143	396
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	1	1	6	11	10	8	8	4	3	6	4	6	7	8	7	2	6	98
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	2	1	1	2	2	3	5	1	2	2	2	1	5	4	3	36
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	6
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	2	3	13	23	31	44	71	89	133	170	187	158	238	1162
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	1	1	4	3	8	6	29	22	50	80	85	79	109	477
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	5	7	6	8	32
C50 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	1	2	7	16	19	33	35	57	68	63	73	48	510
C53 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	4	2	6	9	5	8	42
C54 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	4	7	5	5	4	29
III GRUPPO: assist.osp.territ	1	0	1	1	5	2	7	10	6	12	24	40	77	164	333	536	791	1956	3966
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	3	4	1	0	0	3	5	11	6	7	18	26	84
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	6
C91-C95 Leucemie	0	0	1	0	4	1	2	1	1	2	6	7	6	13	26	26	25	29	150
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	7	5	4	10	14	5	48
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	22	38	75	85	213	444
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	2	2	2	4	8	15	19	45	92	214	318	493	1271	2483
J10-J22 Mal.respirat.acute	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	4	18	29	71	214	343
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	5	14	22	58	63	151	318
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	7	9	24	44
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	4	2	3	14
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	18	31
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELLA A33. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
UMBRIA

Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-14	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75+	0-74	0-75+	
I GRUPPO: prevenzione primaria	7.0	34.9	67.9	53.2	62.4	50.0	73.9	94.9	155.9	300.3	476.3	730.4	1152.2	2671.2	214.1	402.2	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	.0	.0	.0	.0	.0	2.2	2.4	1.2	14.9	20.5	28.7	26.4	52.7	59.3	9.8	13.5	
C22 T.m.fegato	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	2.4	2.4	11.1	17.9	31.4	55.7	73.8	106.8	12.6	19.8	
C32 T.m.laringe	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	2.5	8.9	23.5	13.9	28.6	24.8	5.1	6.6	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	.6	.0	.0	.0	.0	.0	14.3	19.5	44.6	106.5	179.2	323.3	346.8	417.5	66.8	93.7	
C67 T.m.vescica	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.2	17.9	24.8	44.6	85.9	149.9	11.4	22.0	
F10 Alcoolismo psic.alco	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	1.3	1.5	2.1	.4	.5	
F11-F19 Farmacodipendenza	.0	.0	2.6	2.2	10.2	10.9	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	2.1	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	.6	.0	1.3	.0	1.0	3.3	8.3	14.6	13.6	47.4	68.0	138.0	331.7	1572.9	39.7	157.1	
K70-K76 Cirrosi epatica	.0	.0	.0	.0	.0	2.2	8.3	17.0	22.3	33.3	51.0	58.5	84.4	121.9	18.2	26.2	
V01-Y99 Cause esterne mortal	5.7	34.9	64.1	51.0	50.1	30.4	35.8	38.9	39.6	47.4	69.3	68.3	146.2	215.7	47.8	60.6	
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	3.8	30.1	43.6	25.5	24.6	7.6	14.3	9.7	14.9	14.1	17.0	20.9	51.2	38.8	19.5	21.0	
-X60-X84 Suicidi	.0	3.2	7.7	7.8	6.1	9.8	8.3	12.2	5.0	10.2	23.5	22.3	31.6	34.5	10.2	12.1	
-X85-Y09 Omicidi	.0	.0	.0	2.2	.0	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.0	2.1	.5	.7	
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	.0	.0	.0	2.2	4.1	2.2	4.8	10.9	27.2	47.4	51.0	101.7	180.9	309.6	27.9	49.5	
C18-C21 T.m.colon-retto	.0	.0	.0	2.2	2.0	2.2	2.4	8.5	19.8	39.7	41.8	94.7	170.4	283.7	24.6	44.4	
C43-C44 T.m.pelle	.0	.0	.0	.0	2.0	.0	2.4	2.4	6.2	7.7	9.1	6.9	9.0	24.8	3.1	4.8	
C50 T.m.mammella	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	1.5	1.0	.2	.2		
III GRUPPO: assist.osp.territ	1.9	4.8	2.6	7.8	15.3	23.9	41.7	58.4	108.9	182.2	261.7	483.6	974.2	2801.7	139.4	343.2	
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	.6	.0	.0	.0	.0	9.2	7.6	6.0	4.9	3.7	2.5	5.2	12.5	13.5	46.3	4.7	7.9
-B24 AIDS	.0	.0	.0	.0	0	7.2	7.6	6.0	2.4	2.5	1.2	.0	2.7	.0	.0	2.3	2.1
C62 T.m.testicolo	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	1.3	.0	1.5	2.1	.3	.4	
C81 Malattia di Hodgkin	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.0	1.2	1.2	.0	.0	2.7	.0	2.1	.4	.6	
C91-C95 Leucemie	1.3	3.2	.0	1.1	1.0	2.2	6.0	4.9	8.7	3.8	13.0	32.0	52.7	114.3	8.5	16.6	
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	3.8	.0	4.1	10.5	6.4	1.3	1.7	
I10-I15 Ipertensione	.0	.0	.0	.0	.0	3.3	2.4	2.4	9.9	17.9	22.2	25.0	87.4	183.4	10.9	24.1	
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	.0	.0	1.3	5.5	3.1	10.9	26.2	40.1	76.7	141.1	200.2	326.1	607.7	1631.2	92.7	210.5	
J10-J22 Mal.respirat.acute	.0	.0	.0	1.1	1.0	.0	.0	3.6	3.7	2.5	3.9	20.9	31.6	219.0	4.4	20.8	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	.0	1.6	1.3	.0	.0	.0	.0	1.2	3.7	8.9	13.0	48.7	150.8	539.4	14.1	54.4	
K25-K28 Ulcera peptica	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	1.3	6.9	12.0	30.2	1.3	3.6	
K35-K38 Appendicite	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.2	.0	.2	
K40-K46 Ernia addominale	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.0	8.6	.2	.8	
K80-K82 Colecist.acuta e cro	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	4.1	3.0	15.1	.5	1.7	

TABELLA A34. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
UMBRIA

Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-14	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75+	0-74	0-75+	
I GRUPPO: prevenzione primaria	3.4	22.3	18.5	14.7	18.9	27.6	25.5	47.3	50.5	69.0	86.1	193.1	372.2	1884.2	69.0	284.8	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	.0	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	3.6	.0	1.2	2.3	6.0	10.9	20.3	1.9	4.0	
C22 T.m.fegato	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	9.6	1.2	4.7	24.1	28.0	54.9	5.0	11.0	
C32 T.m.laringe	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	1.3	.1	.2	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	.0	.0	.0	.0	1.1	4.4	1.2	10.9	12.0	17.2	17.9	37.4	64.6	71.2	12.2	19.2	
C67 T.m.vescica	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	4.9	1.1	6.0	6.1	28.1	1.4	4.6		
F10 Alcoolismo psic.alco	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.0	.1	
F11-F19 Farmacodipendenza	.0	1.7	.0	1.1	2.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.4	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	1.3	3.4	.0	1.1	2.2	4.9	8.5	10.8	16.0	27.5	74.8	190.3	1469.4	24.8	196.5		
K70-K76 Cirrosi epatica	.0	.0	.0	1.1	.0	4.4	8.5	9.7	2.4	14.7	15.5	27.7	40.2	84.9	9.1	18.1	
V01-Y99 Cause esterne mortal	2.0	15.4	18.5	12.4	14.7	15.4	9.7	13.3	15.6	13.5	16.7	16.9	30.5	153.5	14.2	30.8	
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	1.3	10.3	14.5	11.3	8.4	8.8	4.9	3.6	7.2	4.9	7.1	8.4	9.7	9.8	7.3	7.6	
-X60-X84 Suicidi	.0	3.4	1.3	1.1	2.1	2.2	3.6	6.1	1.2	2.4	2.3	2.4	1.2	7.8	2.1	2.8	
-X85-Y09 Omicidi	.0	.0	.0	.0	1.1	1.1	.0	.0	.0	2.3	1.2	1.2	.0	.5	.5		
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	.0	.0	.0	2.3	3.2	14.3	27.9	37.6	52.9	87.4	106.5	160.5	207.4	380.9	51.0	90.3	
C18-C21 T.m.colon-retto	.0	.0	.0	1.1	1.1	4.4	3.6	9.7	7.2	35.7	26.3	60.3	97.6	178.4	18.0	37.0	
C43-C44 T.m.pelle	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	1.2	1.1	3.6	6.1	13.7	1.0	2.5	
C50 T.m.mammella	.0	.0	.0	1.1	2.1	7.7	19.4	23.0	39.7	43.1	68.2	82.0	76.8	136.5	26.5	39.6	
C53 T.m.collo dell'utero	.0	.0	.0	.0	.0	2.2	2.4	2.4	1.2	1.2	4.7	2.4	7.3	14.4	1.8	3.3	
C54 T.m.corpo dell'utero	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	1.2	.0	.0	2.3	4.8	8.5	9.1	1.3	2.3	
C55 T.m.utero n.s.	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	4.8	6.1	3.5	7.2	10.9	28.7	2.5	5.6	
III GRUPPO: assist.osp.territ	1.3	1.7	6.6	2.3	7.4	11.0	7.3	14.6	28.8	49.2	92.1	197.9	406.3	2144.9	60.2	308.0	
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	.0	.0	.0	.0	3.2	4.4	1.2	.0	.0	3.6	5.9	13.2	7.3	33.3	2.9	6.5	
-B24 AIDS	.0	.0	.0	.0	3.2	3.3	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.5	
C81 Malattia di Hodgkin	.0	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	2.6	.2	.5	
C91-C95 Leucemie	.7	.0	5.3	1.1	2.1	1.1	1.2	2.4	7.2	8.6	7.1	15.6	31.7	52.3	6.2	11.7	
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	.0	.0	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	1.2	8.3	6.0	4.8	18.9	1.7	3.7
I10-I15 Ipertensione	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	1.2	3.6	7.1	26.5	46.3	243.7	6.3	34.5		
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	.0	.0	.0	2.1	2.2	4.9	9.7	18.0	23.4	53.8	111.0	261.1	1360.3	35.3	192.9		
J10-J22 Mal.respirat.acute	.7	.0	.0	.0	.0	1.1	0	1.2	.0	3.6	1.1	4.8	21.9	205.1	2.6	26.6	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	.0	.0	.0	1.1	.0	1.1	.0	.0	.0	3.6	5.9	16.9	26.8	177.7	4.1	24.7	
K25-K28 Ulcera peptica	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	3.6	26.1	.4	3.4	
K35-K38 Appendicite	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	.0	.1	.1	
K40-K46 Ernia addominale	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	.0	1.2	1.1	1.2	1.2	5.9	.4	1.1	
K80-K82 Colecist.acuta e cro	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	1.2	1.2	18.9	.2	2.4	
000-099 Gravid.parto puerper	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

Appendice

TABELLA A35. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
UMBRIA

Tassi annui standardizzati (pop. 1991) di mortalità per 100.000 residenti, per causa.

CAUSA	popolazione	MASCHI						FEMMINE					
		TUTTE LE ETA'			0-74			TUTTE LE ETA'			0-74		
		----tassi standardizzati----	Umbra (E.S.)	Italiana Mond.	tassi standardizzati	Umbra	Italiana Mond.	----tassi standardizzati----	Umbra (E.S.)	Italiana Mond.	tassi standardizzati	Umbra	Italiana Mond.
I GRUPPO: prevenzione primaria		389.7 (9.8)	346.8	171.6	205.2	176.9	118.0	177.5 (5.4)	161.6	70.6	58.9	51.2	35.5
C00-C15 T.m.prime vie aer-di		13.1 (1.8)	11.4	6.1	9.3	7.9	5.0	3.0 (.7)	2.6	1.3	1.6	1.3	.9
C22 T.m.fegato		19.4 (2.2)	16.7	8.2	12.1	10.1	6.2	8.0 (1.2)	6.9	3.2	4.2	3.5	2.1
C32 T.m.laringe		6.5 (1.3)	5.5	3.0	4.9	4.1	2.5	.1 (.1)	.1	.0	.1	.0	.0
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol		91.7 (4.8)	78.2	40.7	65.1	54.2	33.2	14.8 (1.7)	12.9	6.9	10.3	8.7	5.6
C67 T.m.vescica		21.2 (2.3)	18.3	8.2	10.7	8.7	5.2	3.0 (.7)	2.7	1.2	1.2	1.0	.6
F10 Alcoolismo psic.alco		.5 (.3)	.4	.2	.3	.3	.2	.1 (.1)	.0	.0	.0	.0	.0
F11-F19 Farmacodipendenza		1.9 (.7)	2.0	1.8	2.1	2.2	1.8	.4 (.3)	.4	.4	.4	.5	.4
I60-I69 Dist.circol.encefalo		150.8 (6.1)	135.7	51.7	36.7	30.0	18.4	112.0 (4.1)	102.4	37.8	19.8	16.2	10.3
K70-K76 Cirrosi epatica		25.6 (2.5)	22.3	12.0	17.6	15.1	9.8	13.8 (1.6)	12.1	6.1	7.9	6.8	4.5
V01-Y99 Cause esterne mortal		59.1 (3.8)	56.1	39.6	46.3	44.2	35.7	22.3 (2.1)	21.4	13.6	13.5	13.1	11.0
-V01-V99 Incidenti mezzi tras		20.7 (2.3)	20.6	17.1	19.3	19.2	16.6	7.4 (1.3)	7.4	6.4	7.2	7.3	6.3
-X60-X84 Suicidi		12.0 (1.7)	11.0	7.3	9.9	9.0	6.7	2.5 (.8)	2.4	1.9	2.1	2.0	1.7
-X85-Y09 Omicidi		.6 (.4)	.6	.4	.5	.5	.4	.4 (.3)	.4	.3	.5	.4	.3
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.		48.2 (3.5)	41.9	19.8	26.4	22.1	13.7	68.6 (3.6)	60.3	32.0	44.7	38.4	25.0
C18-C21 T.m.colon-retto		43.4 (3.3)	37.6	17.4	23.2	19.2	11.8	26.9 (2.2)	23.5	11.3	15.2	12.7	8.0
C43-C44 T.m.pelle		4.6 (1.1)	4.2	2.3	3.1	2.7	1.8	1.7 (.6)	1.5	.7	.8	.7	.4
C50 T.m.mammella		.2 (.2)	.2	.1	.2	.1	.1	31.8 (2.5)	28.1	16.3	24.0	20.9	13.9
C53 T.m.collo dell'utero		- (-)	-	-	-	-	-	2.5 (.7)	2.2	1.2	1.5	1.4	1.0
C54 T.m.corpo dell'utero		- (-)	-	-	-	-	-	1.7 (.6)	1.5	.7	1.1	.9	.6
C55 T.m.utero n.s.		- (-)	-	-	-	-	-	4.0 (.9)	3.5	1.7	2.1	1.8	1.2
III GRUPPO: assist.osp.territ		330.3 (9.0)	293.5	126.8	130.8	109.2	68.8	183.9 (5.4)	166.4	65.5	49.2	40.7	25.4
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi		7.6 (1.4)	6.9	4.0	4.5	4.1	3.1	4.7 (.9)	4.2	2.1	2.6	2.3	1.5
-B24 AIDS		2.0 (.7)	2.0	1.6	2.2	2.1	1.7	.5 (.3)	.5	.5	.6	.6	.5
C62 T.m.testicolo		.4 (.3)	.4	.2	.3	.2	.1	- (-)	-	-	-	-	-
C81 Malattia di Hodgkin		.6 (.4)	.5	.3	.4	.4	.3	.4 (.3)	.4	.2	.2	.2	.2
C91-C95 Leucemie		16.1 (2.0)	14.2	7.1	8.1	6.9	4.8	8.8 (1.3)	7.8	4.2	5.3	4.7	3.3
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro		1.7 (.6)	1.4	.7	1.2	1.0	.6	3.0 (.8)	2.6	1.2	1.5	1.3	.8
I10-I15 Ipertensione		22.9 (2.4)	20.3	9.0	10.0	8.3	5.2	20.5 (1.8)	18.4	6.9	5.0	4.0	2.3
I20-I25 Mal.ischemiche cuore		202.6 (7.0)	179.7	79.4	87.6	73.2	45.7	113.2 (4.2)	102.5	39.4	28.3	23.1	14.0
J10-J22 Mal.respirat.acute		19.6 (2.2)	17.9	6.9	4.1	3.4	2.1	14.4 (1.4)	13.4	5.0	2.0	1.6	1.2
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut		52.7 (3.6)	46.8	17.2	12.7	10.2	6.0	14.8 (1.5)	13.3	5.0	3.3	2.7	1.6
K25-K28 Ulcera peptica		3.4 (.9)	2.9	1.2	1.2	1.0	.6	1.9 (.5)	1.8	.6	.3	.2	.1
K35-K38 Appendicite		.3 (.3)	.2	.1	.0	.0	.0	.1 (.1)	.1	.0	.1	.1	.0
K40-K46 Ernia addominale		.8 (.5)	.7	.2	.1	.1	.1	.8 (.4)	.7	.3	.4	.3	.2
K80-K82 Colegist.acuta e cro		1.6 (.6)	1.4	.6	.5	.4	.2	1.4 (.4)	1.2	.4	.1	.1	.1
000-O99 Gravid.parto puerper		.0 (.0)	.0	.0	.0	.0	.0	.0 (.0)	.0	.0	.0	.0	.0

TABELLA A36. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
UMBRIA

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	# <75 anni	YPLL--	<65 anni	# <75 anni	YPLL--	<65 anni	# <75 anni
I GRUPPO:prevenzione primaria	5-64	118.4	109.3 (5.7)	34.3	31.3 (3.0)	1612.8	5323	2817.2	10953	575.4	1847	906.3	3561
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	5.9	5.3 (1.2)	.8	.7 (.4)	40.4	148	97.9	408	13.0	38	21.3	81
C22 T.m.fegato	5-64	5.6	5.0 (1.1)	1.5	1.3 (.6)	35.2	128	104.9	443	12.8	47	35.7	163
C32 T.m.laringe	5-64	3.0	2.7 (.8)	.0	.0 (.0)	12.6	47	42.7	181	.0	0	.1	1
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	30.6	27.4 (2.8)	5.8	4.9 (1.1)	186.2	673	571.7	2394	51.9	197	111.2	498
C67 T.m.vescica	5-64	4.1	3.6 (1.0)	.6	.5 (.3)	19.6	72	75.5	326	4.3	17	11.7	53
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.2	.2 (.2)	.0	.0 (.0)	4.0	15	6.0	25	.0	0	.0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	2.8	2.5 (.8)	.5	.6 (.4)	74.6	268	89.3	355	19.6	59	22.6	76
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	13.3	11.9 (1.8)	6.7	5.9 (1.3)	105.4	378	286.8	1225	80.0	261	172.8	756
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	11.4	10.2 (1.7)	5.1	4.4 (1.1)	88.8	325	200.0	830	54.1	198	102.0	439
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	60.6	56.1 (3.6)	30.8	21.4 (2.0)	1046.1	3270	1342.0	4767	339.6	1032	428.9	1494
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	21.0	20.6 (2.2)	7.6	7.4 (1.3)	584.0	1728	705.5	2357	223.7	660	271.8	911
-X60-X84 Suicidi	0-75+	12.1	11.0 (1.6)	2.8	2.4 (.7)	155.4	514	219.6	828	51.8	161	66.8	237
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.7	.6 (.3)	.5	.4 (.2)	12.7	43	15.3	58	5.7	22	8.9	38
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.	5-64	12.8	11.4 (1.8)	29.9	25.5 (2.6)	106.0	386	253.6	1065	260.7	965	541.4	2359
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	10.1	9.0 (1.6)	8.0	6.8 (1.3)	80.3	292	205.7	869	65.5	245	151.9	683
C43-C44 T.m.pelle	5-64	2.6	2.3 (.8)	.3	.3 (.2)	24.6	90	45.8	188	3.1	11	7.3	33
C50 T.m.mammella	5-64	.1	.1 (.1)	18.4	15.7 (2.0)	1.2	4	2.0	8	163.1	602	324.4	1391
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	1.3	1.1 (.5)	-	-	-	-	14.9	55	24.7	105
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.4	.4 (.3)	-	-	-	-	4.2	15	9.8	44
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	1.4	1.2 (.5)	-	-	-	-	9.9	38	23.3	103
III GRUPPO:assist.osp.territ	5-64	60.6	54.5 (3.9)	20.0	17.2 (2.2)	566.9	2018	1274.7	5307	201.7	697	451.9	2004
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	3.7	3.2 (.9)	1.7	1.5 (.6)	72.1	264	100.5	411	23.5	88	40.2	174
-B24 AIDS	5-64	2.6	2.3 (.8)	.8	.7 (.4)	53.4	200	69.1	285	18.2	68	22.2	91
C62 T.m.testicolo	5-64	.2	.2 (.2)	-	- (-)	1.4	5	3.0	13	-	-	-	-
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.3	.3 (.2)	.1	.2 (.2)	5.5	21	8.6	36	7.3	16	8.6	22
C91-C95 Leucemie	0-14	1.3	1.2 (1.4)	.7	.7 (1.2)	67.7	218	111.8	428	58.4	184	89.0	342
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.4	.4 (.3)	1.1	.9 (.5)	4.2	15	9.8	42	8.5	27	18.7	76
I10-I15 Ipertensione	5-64	4.9	4.4 (1.1)	1.2	1.0 (.5)	37.2	137	89.9	383	5.8	23	29.2	146
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	42.9	38.4 (3.3)	10.3	8.6 (1.5)	336.9	1219	827.4	3470	70.3	264	208.3	989
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.4	1.3 (.6)	.6	.5 (.3)	17.0	61	37.8	159	13.8	44	22.3	93
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	2.5	2.3 (.8)	1.1	.9 (.5)	23.9	74	75.6	322	9.5	33	26.0	120
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.2	.2 (.2)	.1	.1 (.1)	.9	3	6.4	29	1.1	4	2.2	10
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.1	.1 (.1)	.0	0	.0	0	.2	1	.9	4
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.3	.3 (.2)	.0	0	.2	2	3.3	13	5.9	26
K80-K82 Colenist.acuta e cro	5-64	.1	.1 (.1)	.0	.0 (.0)	.2	1	3.0	13	.0	0	.6	3
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
Screening di popolazione													
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	69.7	62.7 (3.9)	45.3	39.5 (3.1)								
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	58.4	57.2 (4.3)								
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	1.7	1.7 (.4)								

Appendice

TABELLA A37. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.1 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	0	0	2	4	9	6	11	11	10	12	22	39	56	89	117	147	93	139	767
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	5	6	2	5	6	2	4	35
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	10	7	6	5	3	41
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	6	2	1	1	20
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	17	14	34	32	45	10	9	173
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	9	8	1	8	33
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	7	14	30	59	59	94	272
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	13	15	11	12	6	5	70
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	0	2	4	9	5	10	5	7	5	5	3	9	5	17	9	8	15	118
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	2	3	7	3	5	1	2	2	3	0	1	2	7	2	1	5	46
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	1	0	3	2	5	1	1	1	20
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	6	4	18	24	13	13	95
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	4	3	18	22	12	11	10
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	1	2	1	10
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	0	0	0	0	4	3	8	6	13	20	32	59	110	95	122	177
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	2	2	0	0	0	2	11
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	9	5	10	7	7	43
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	6
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	4	0	4	12	10	5	21
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	10	11	28	37	70	40	63	359
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	3	2	6	22	38
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	17	29	37	124
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	5
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2

TABELLA A38. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.1 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	1	1	4	2	4	5	2	3	8	10	9	17	19	43	68	79	245	521
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	2	2	0	10
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	1	2	0	1
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	2	5	3	5	3	6	37
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	10
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I60-I69 Dist.circol.encefalo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	6	24	44	58	204	347
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	3	2	7	4	7	6	34
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	1	1	3	2	4	5	1	2	1	2	1	2	2	5	9	6	23	70
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	1	2	1	4	0	1	1	0	0	1	0	0	2	2	0	3	18
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	8
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	4	5	9	9	23	21	23	24	34
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5	3	8	11	8	13	17	69
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	6
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	3	3	4	11	6	8	6	58
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	6
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	2	0	8
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	1	4	13
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	7	4	13	32	48	79	122	302	614
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	3	10
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	7	3	10
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	10
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	5	10	17	39
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	9	17	30	43	74	183
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	4	6	34	50
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	9	16	26	58
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Appendice

TABELLA A39. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.1 -

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	# <75 anni	<65 anni	# <75 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	127.5	119.1 (15.3)	47.5	44.4 (9.5)	1779.9	902	3085.3	1828
C22 T.m.fegato	5-64	11.2	10.2 (4.4)	2.2	1.8 (1.7)	78.8	43	171.2	106
C32 T.m.laringe	5-64	7.0	6.3 (3.4)	2.9	2.6 (2.2)	52.8	30	146.7	94
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	3.5	3.1 (2.3)	.0	.0 (.0)	18.5	11	67.9	45
C67 T.m.vescica	5-64	30.1	27.7 (7.3)	10.1	8.7 (4.0)	209.6	114	587.7	369
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	2.1	2.0 (2.0)	.7	.6 (1.1)	14.3	8	53.9	35
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	2.8	2.6 (2.2)	.7	1.0 (1.7)	77.7	42	92.6	55
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	11.2	10.1 (4.3)	7.2	6.1 (3.3)	83.7	47	244.1	160
V01-Y99 Cause esterne mortal	5-64	14.7	13.0 (4.9)	5.8	4.9 (3.0)	82.8	48	254.4	164
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	63.8	59.5 (9.6)	36.0	26.4 (6.0)	1161.8	560	1466.4	800
-X60-X84 Suicidi	0-75+	24.9	24.1 (6.3)	9.3	8.7 (3.8)	702.3	323	833.2	430
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	10.8	9.4 (3.6)	4.1	4.0 (2.5)	119.1	63	175.2	106
		.0	.0 (.0)	.5	.5 (.8)	.0	0	.0	0
							0	19.8	11
								23.5	14
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	11.2	10.4 (4.4)	25.2	22.3 (6.5)	103.8	55	274.5	173
C43-C44 T.m.pelle	5-64	7.7	7.1 (3.7)	8.6	7.7 (3.8)	77.5	41	220.9	141
C50 T.m.mammella	5-64	3.5	3.3 (2.5)	.0	.0 (.0)	26.3	14	52.6	32
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	11.5	10.2 (4.4)	.0	0	.9	1
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	2.2	1.9 (1.9)	-	-	-	23.8
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	2.2	1.9 (1.8)	-	-	-	13
		-	- (-)	.7	.6 (1.1)	-	-	-	38.2
						-	-	4.5	26.1
								3	14
								21.4	15
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	60.3	54.5 (10.1)	22.3	19.2 (5.9)	533.1	297	1279.1	823
-B24 AIDS	5-64	4.9	4.4 (2.8)	1.4	1.3 (1.5)	71.9	41	110.4	69
C62 T.m.testicolo	5-64	1.4	1.3 (1.5)	.7	.6 (1.1)	26.5	15	38.7	24
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	-.0	-.0 (-)	.0	0	.0	0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	43.9	24	106.5	68
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	1.4	1.3 (1.6)	1.4	1.3 (1.5)	9.5	5	21.9	13
I10-I15 Ipertensione	5-64	5.6	5.3 (3.2)	.7	.7 (1.1)	70.6	38	135.6	85
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	41.3	37.1 (8.3)	13.7	11.7 (4.6)	295.0	164	793.0	512
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	2.1	1.8 (1.7)	1.4	1.3 (1.5)	29.7	18	52.8	35
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	1.4	1.3 (1.6)	.0	.0 (.0)	12.4	7	57.6	40
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.9	1
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.7	.6 (.9)	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
							0	0	0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	85.6	76.0 (11.1)	46.1	40.7 (8.3)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	43.3	41.3 (9.3)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	2.9	2.9 (1.6)				

Appendice

TABELLA A40. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 1 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI	FEMMINE		# <75 anni	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)				standard. YPLL---	standard. YPLL---		
I GRUPPO: prevenzione primaria												
C00-C15	T.m.prime vie aer-di	5-64	127.9	120.8 (20.5)	49.7	44.7 (12.4)	1925.6	555	3291.0	1115	694.0	198 1118.3
C22	T.m.fegato	5-64	15.7	14.5 (7.0)	3.7	3.1 (3.1)	123.5	39	252.9	89	12.7	4 56.1
C32	T.m.laringe	5-64	4.8	4.4 (3.9)	3.7	3.4 (3.4)	46.0	15	134.8	50	30.7	9 70.0
C33-C34	T.m.trach bronch.pol	5-64	3.6	3.2 (3.2)	.0	.0 (.0)	26.7	9	91.4	35	.0	0 .0
C67	T.m.vescica	5-64	30.2	27.7 (9.6)	13.7	11.6 (6.1)	223.2	71	606.2	220	104.1	34 209.3
F10	Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
F11-F19	Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
I60-I69	Dist.circol.encefalo	5-64	14.5	12.8 (6.4)	6.2	5.4 (4.2)	106.0	35	305.5	117	44.4	14 122.1
K70-K76	Cirrosi epatica	5-64	13.3	11.8 (6.2)	6.2	5.3 (4.1)	68.3	23	236.0	88	53.9	18 100.6
V01-Y99	Cause esterne mortal	0-75+	61.0	58.2 (12.8)	30.5	22.3 (7.3)	1323.5	361	1616.2	498	440.2	117 535.9
-V01-V99	Incidenti mezzi tras	0-75+	25.3	24.8 (8.5)	7.2	7.2 (4.8)	789.4	200	909.0	258	279.8	66 317.3
-X60-X84	Suicidi	0-75+	13.1	11.1 (5.2)	5.4	4.6 (3.3)	175.2	54	245.5	86	56.7	18 93.0
-X85-Y09	Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.												
C18-C21	T.m.colon-retto	5-64	9.7	9.1 (5.7)	22.4	19.7 (8.1)	118.1	35	303.8	108	225.3	72 456.5
C43-C44	T.m.pelle	5-64	7.2	6.8 (4.9)	8.7	7.7 (5.1)	96.4	28	264.3	95	66.8	21 156.0
C50	T.m.mammella	5-64	2.4	2.3 (2.8)	.0	.0 (.0)	21.7	7	39.5	13	.0	0 1.3
C53	T.m.collo dell'utero	5-64	-. -	-. - (-)	9.9	8.6 (5.3)	.0	0	.0	0	103.2	33 199.6
C54	T.m.corpo dell'utero	5-64	-. -	-. - (-)	2.5	2.3 (2.8)	-	-	-	-	37.9	12 54.2
C55	T.m.utero n.s.	5-64	-. -	-. - (-)	1.2	1.1 (1.8)	-	-	-	-	17.5	6 24.9
III GRUPPO: assist.osp.territ												
A00-B99	Mal.batt.vir.parassi	5-64	54.3	49.6 (12.8)	23.6	20.7 (8.3)	532.7	173	1215.9	452	214.2	68 486.1
-B24	AIDS	5-64	6.0	5.4 (4.3)	2.5	2.3 (2.8)	88.9	29	134.2	48	42.6	13 59.4
C62	T.m.testicolo	5-64	2.4	2.1 (2.7)	1.2	1.1 (2.0)	45.7	15	66.7	24	34.6	11 41.0
C81	Malattia di Hodgkin	5-64	0.0	0.0 (.0)	-. -	-. - (-)	.0	0	.0	0	-. -	-. -
C91-C95	Leucemie	0-14	1.2	1.1 (2.1)	.0	.0 (.0)	26.7	9	104.8	40	16.5	5 36.3
I10-I19	Cardiopat.reumat.cro	5-64	1.2	1.0 (1.8)	.0	.0 (.0)	8.4	3	19.4	7	.0	0 1.3
I10-I15	Ipertensione	5-64	4.8	4.5 (4.0)	.0	.0 (.0)	67.9	22	121.9	45	.0	0 21.7
I20-I25	Mal.ischemiche cuore	5-64	35.0	31.8 (10.3)	17.4	15.2 (7.1)	286.8	93	723.0	268	128.0	40 313.0
J10-J22	Mal.respirat.acute	5-64	1.2	1.0 (1.8)	1.2	1.0 (1.8)	32.3	11	49.9	19	27.2	9 38.7
J40-J47	Broncopn.cron.ostrut	5-64	2.4	2.3 (2.8)	.0	.0 (.0)	21.7	7	60.9	23	.0	0 15.8
K25-K28	Ulcera peptica	5-64	0.0	0.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	1.6	1	.0	0 .0
K35-K38	Appendicite	5-64	0.0	0.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
K40-K46	Ernia addominale	5-64	0.0	0.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
K80-K82	Colecist.acuta e cro	5-64	0.0	0.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
O00-O99	Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
Screening di popolazione												
C18-C21	T.m.colon-retto	50-74	93.4	85.1 (15.7)	51.9	44.0 (11.3)						
C50	T.m.mammella	50-69	-	- (-)	32.5	30.3 (10.5)						
C53	T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	3.4	3.5 (2.4)						

Appendice

TABELLA A41. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 1 DSB 2

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	# <75 anni	# <65 anni	# <75 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	127.0	116.1 (23.1)	44.4	44.0 (15.1)	1571.7	347	2792.4	713
C22 T.m.fegato	5-64	5.0	4.4 (4.4)	.0	.0 (.0)	17.7	4	60.2	17
C32 T.m.laringe	5-64	10.0	8.8 (6.3)	1.7	1.6 (2.7)	63.0	15	164.5	44
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	3.3	2.8 (3.5)	.0	.0 (.0)	6.8	2	34.9	10
C67 T.m.vescica	5-64	30.1	27.2 (11.1)	5.1	4.7 (4.7)	188.2	43	557.5	149
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	3.3	3.0 (3.8)	.0	.0 (.0)	21.9	5	61.8	17
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	6.7	6.2 (5.4)	1.7	2.3 (4.0)	185.2	42	221.1	55
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	6.7	6.1 (5.4)	8.5	7.2 (5.6)	51.0	12	157.1	43
V01-Y99 Cause esterne mortal	5-64	16.7	14.6 (8.0)	5.1	4.4 (4.4)	103.4	25	280.2	76
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	67.6	60.8 (14.7)	43.5	32.1 (10.5)	934.6	199	1254.6	303
-X60-X84 Suicidi	0-75+	24.3	23.2 (9.3)	12.1	10.9 (6.5)	580.5	123	727.1	172
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	7.7	6.7 (4.8)	2.4	3.2 (4.0)	40.4	9	76.9	20
		.0	.0 (.0)	1.2	1.2 (2.1)	.0	0	.0	0
							0	46.5	11
								55.2	14
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	13.4	11.9 (7.3)	29.0	25.7 (10.9)	84.8	20	234.1	65
C43-C44 T.m.pelle	5-64	8.4	7.4 (5.7)	8.5	7.6 (5.9)	52.3	13	161.6	46
C50 T.m.mammella	5-64	5.0	4.5 (4.5)	.0	.0 (.0)	32.5	8	70.3	18
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	13.7	12.2 (7.5)	.0	0	2.1	1
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	1.7	1.3 (2.3)	-	-	-	3.2
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	3.4	3.1 (3.8)	-	-	-	1.1
		-	- (-)	1.7	1.5 (2.6)	-	-	-	10.4
						-	-	-	3
							-	22.0	6
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	68.5	61.1 (16.6)	20.5	17.2 (8.6)	534.0	124	1367.0	371
-B24 AIDS	5-64	3.3	2.9 (3.6)	.0	.0 (.0)	48.6	12	78.1	21
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	67.3	15	108.6	28
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	1.7	1.5 (2.7)	3.4	2.9 (3.6)	10.9	3	25.2	7
I10-I15 Ipertensione	5-64	6.7	6.2 (5.4)	1.7	1.6 (2.7)	73.7	17	154.0	40
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	50.1	44.4 (14.1)	8.5	7.0 (5.4)	306.4	72	888.8	243
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	3.3	2.8 (3.5)	1.7	1.5 (2.6)	27.0	7	58.2	16
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	53.7	17
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	1.7	1.3 (2.3)	.0	0	.0	3.2
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
							0	.0	0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	75.2	63.1 (15.1)	38.5	36.4 (12.3)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	57.7	56.1 (16.7)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	2.3	2.0 (2.0)				

Appendice

TABELLA A42. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.2 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE	
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	0	2	11	16	24	19	13	23	32	40	88	148	193	273	310	257	362	1812	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	8	8	14	11	7	5	63	
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	11	19	18	13	8	5	87	
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	2	3	4	4	1	25	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	5	9	33	58	80	88	73	37	19	
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	13	19	17	14	18	94	
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	1	0	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	10	15	40	80	141	161	269	729	
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	4	8	13	9	19	26	9	13	113	
V01-Y99 Cause esterne mortal	1	0	1	11	15	24	14	7	10	15	13	14	29	21	32	25	17	31	280	
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	1	9	8	11	5	3	4	3	3	3	10	3	13	4	2	2	84	
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	2	3	4	3	3	1	5	3	5	7	7	6	4	3	4	60	
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	12	11	19	20	40	42	30	21	204
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	10	11	13	19	38	38	29	16	179	
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	6	1	2	3	1	5	23	
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	
III GRUPPO: assist.osp.territ	1	2	0	2	0	4	5	7	14	14	41	50	79	134	241	278	279	401	1552	
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	1	4	4	7	5	5	35	
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	8	
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3	
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	4	
C91-C95 Leucemie	0	2	0	1	0	1	0	0	1	1	4	0	4	7	11	17	9	5	63	
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	0	6	
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	5	7	13	14	12	74	
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	2	2	5	11	9	28	43	62	94	153	178	172	253	1012	
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	3	5	16	13	38	80	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	14	45	43	66	79	255	
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	2	3	13	
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	6	

TABELLA A43. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.2 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	0	2	0	3	3	6	7	12	8	15	12	20	32	72	123	205	287	699	1506
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	6	2	2	18	18
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	14	10	15	11	9	63	
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	4	5	10	21	25	11	90
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	4	2	5	18
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	1	0	1	0	0	0	1	2	4	5	6	13	25	64	118	227	608	1075
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	2	5	6	14	14	24	18	22
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	1	0	1	3	5	5	7	2	5	4	4	4	5	8	13	16	43	126
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	1	0	0	2	4	5	4	2	2	4	1	2	2	4	2	1	1	37
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4	2	0	10
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	1	1	8	9	11	18	28	40	49	72	67	56	78	438
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	15	8	19	26	32	26	38	171
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	3	9
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	1	0	6	9	7	15	10	28	25	31	29	16	203
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	1	8
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	1	11
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	5	2	10	9	36
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	1	0	0	0	3	2	2	6	8	15	26	72	131	237	311	734	1548
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	4	6	3	0	4	9	30
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
C91-C95 Leucemie	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	3	7	8	12	7	57
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	6	19
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	11	24	19	117
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	4	7	16	45	92	155	213	506
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	10	32	80	130
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	7	25	23	59	124
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	6
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Appendice

TABELLA A44. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.2 -

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	# <65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	#	
I GRUPPO:prevenzione primaria	5-64	110.2	103.8 (8.8)	31.8	28.7 (4.5)	1475.4	1951	2619.7	4051	486.2	663	819.2	1346
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	4.8	4.4 (1.7)	.8	.9 (.9)	29.5	43	81.1	135	26.0	28	33.5	43
C22 T.m.fegato	5-64	6.4	5.8 (2.0)	1.1	.9 (.7)	33.7	48	115.8	191	4.4	7	33.4	63
C32 T.m.laringe	5-64	2.9	2.7 (1.3)	.0	.0 (.0)	12.1	18	37.8	62	.0	0	.3	1
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	29.7	27.2 (4.4)	3.4	2.9 (1.3)	184.6	260	553.2	907	31.1	49	72.7	135
C67 T.m.vescica	5-64	3.4	3.1 (1.5)	.8	.7 (.6)	15.5	23	67.5	114	5.9	9	15.4	28
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	1.5	3	.0	0	.0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	2.6	2.3 (1.2)	.5	.4 (.5)	67.6	102	81.1	135	12.6	20	15.3	27
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	10.1	9.2 (2.5)	8.7	7.8 (2.3)	77.7	115	238.1	408	97.5	129	207.5	355
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	9.8	9.0 (2.5)	5.6	4.9 (1.8)	86.9	126	176.0	288	61.6	89	120.9	206
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	57.7	54.8 (5.7)	24.4	17.3 (2.8)	967.8	1217	1267.0	1809	247.1	333	320.1	488
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	17.3	17.1 (3.3)	7.2	6.6 (1.9)	480.5	568	587.5	787	171.7	236	216.8	334
-X60-X84 Suicidi	0-75+	12.4	11.6 (2.6)	1.9	1.5 (.8)	194.0	252	267.3	394	22.9	33	28.9	47
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.4	.4 (.4)	.4	.3 (.3)	9.6	13	11.0	16	.0	0	1.6	3
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.	5-64	13.5	12.4 (3.0)	30.8	26.6 (4.2)	115.8	171	255.4	424	269.8	407	559.4	976
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	10.3	9.5 (2.6)	8.0	6.8 (2.1)	83.6	123	199.4	332	61.0	95	146.6	264
C43-C44 T.m.pelle	5-64	2.9	2.6 (1.3)	.3	.2 (.3)	29.1	44	51.1	85	.5	1	4.3	8
C50 T.m.mammella	5-64	.3	.3 (.4)	20.1	17.5 (3.4)	3.0	4	4.9	8	192.4	287	367.3	628
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.3	.2 (.3)	-	-	-	-	.5	1	4.6	9
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0	2.8	7
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	2.1	1.8 (1.1)	-	-	-	-	15.4	23	33.9	59
III GRUPPO:assist.osp.territ	5-64	57.7	53.4 (6.2)	16.7	14.4 (3.1)	576.8	808	1272.2	2073	143.4	211	388.6	710
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	2.4	2.1 (1.2)	2.1	1.8 (1.0)	59.1	85	81.5	132	22.0	35	44.0	79
-B24 AIDS	5-64	1.9	1.6 (1.0)	.5	.4 (.5)	37.2	58	49.1	83	12.6	20	15.3	27
C62 T.m.testicolo	5-64	.5	.5 (.6)	-	- (-)	3.6	5	7.5	12	-	-	-	-
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.8	.7 (.7)	.0	.0 (.0)	13.6	21	19.9	33	.0	0	.0	0
C91-C95 Leucemie	0-14	3.1	2.9 (3.4)	1.6	1.7 (3.0)	80.9	100	119.4	173	42.9	56	73.6	117
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.3	.2 (.4)	.5	.4 (.5)	1.7	3	5.0	9	1.0	2	6.9	13
I10-I15 Ipertensione	5-64	3.7	3.4 (1.5)	1.1	.9 (.7)	26.9	38	69.1	113	7.5	12	23.2	44
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	42.9	39.4 (5.3)	9.0	7.7 (2.2)	347.7	503	850.0	1406	62.2	95	209.7	398
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.3	1.2 (.9)	.3	.2 (.3)	18.8	26	34.0	54	1.6	3	6.6	13
J40-J47 Broncopn.cron.ostrutt	5-64	2.1	2.1 (1.2)	.5	.5 (.5)	24.5	27	77.3	126	3.3	5	19.7	38
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.3	.2 (.4)	.0	0	5.9	11	2.9	4	4.7	8
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	2.2	4	.0	0	.3	1
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
Screening di popolazione													
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	62.6	57.2 (6.0)	42.9	38.7 (5.0)								
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	59.9	59.0 (6.9)								
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.4	.3 (.3)								

Appendice

TABELLA A45. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 2 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		AMR	SAMR(E.S.)	----tassi <65 anni	standard.	YPLL---	MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)						# <75 anni	# <65 anni	# <75 anni	# <65 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria														
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	116.7	111.6 (12.8)	28.7	25.9 (5.9)	1601.2	1114	2747.7	2193	433.2	322	741.0	648	
C22 T.m.fegato	5-64	5.0	4.6 (2.5)	.0	.0 (.0)	35.9	28	95.2	83	.0	0	3.9	4	
C32 T.m.laringe	5-64	7.5	7.0 (3.1)	1.0	.9 (1.1)	45.4	34	131.5	111	6.3	5	29.1	28	
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	2.5	2.3 (1.8)	.0	.0 (.0)	7.7	6	27.8	23	.0	0	.0	0	
C67 T.m.vescica	5-64	31.6	29.4 (6.4)	3.5	3.0 (1.9)	199.1	151	561.4	473	28.7	24	69.5	68	
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0	
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	2.0	1.6 (1.5)	.5	.4 (.7)	45.4	38	55.6	52	10.4	9	12.9	13	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	8.0	7.3 (3.2)	7.9	7.4 (3.3)	72.1	57	203.9	178	125.9	82	225.2	187	
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	13.0	12.1 (4.1)	4.9	4.4 (2.4)	120.8	92	225.7	190	59.6	47	112.6	101	
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	54.4	53.4 (8.0)	22.1	16.0 (3.8)	1053.9	693	1364.3	1013	192.5	147	263.4	226	
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	17.9	18.5 (4.9)	5.9	5.0 (2.2)	561.6	338	677.6	462	106.5	82	138.8	119	
-X60-X84 Suicidi	0-75+	12.7	12.2 (3.8)	1.5	1.3 (1.1)	198.2	138	274.1	215	24.4	18	29.9	25	
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.4	.4 (.7)	.7	.6 (.7)	.0	0	.0	0	.0	0	3.3	3	
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.														
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	15.0	13.9 (4.4)	25.2	21.9 (5.3)	108.5	85	260.5	224	225.9	186	496.6	461	
C43-C44 T.m.pelle	5-64	11.5	10.6 (3.8)	6.9	6.0 (2.8)	75.7	59	202.9	175	53.9	45	130.4	123	
C50 T.m.mammella	5-64	3.5	3.2 (2.1)	.0	.0 (.0)	32.7	26	57.6	49	.0	0	1.2	2	
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-. -	(-)	.5	.4 (.7)	-. -	-. -	-. -	-. -	1.0	1	7.9	8	
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-. -	(-)	.0	.0 (.0)	-. -	-. -	-. -	-. -	.0	0	2.4	3	
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-. -	(-)	2.5	2.1 (1.7)	-. -	-. -	-. -	-. -	19.1	16	43.5	41	
III GRUPPO: assist.osp.territ														
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	58.1	54.7 (8.8)	17.8	15.7 (4.5)	639.0	459	1351.2	1116	162.6	125	435.0	406	
-B24 AIDS	5-64	1.5	1.3 (1.3)	3.0	2.5 (1.8)	47.9	33	67.4	53	29.2	25	57.6	54	
C62 T.m.testicolo	5-64	1.0	.8 (1.0)	1.0	.8 (1.0)	13.7	12	22.8	21	23.2	20	28.0	27	
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	-. -	-. -	-. -	-. -	
C91-C95 Leucemie	0-14	.5	.5 (6.8)	3.1	3.4 (5.9)	139.4	88	183.3	133	62.8	42	98.6	79	
I10-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.5	.4 (.8)	.0	.0 (.0)	3.2	3	8.2	8	.0	0	1.2	2	
I10-I15 Ipertensione	5-64	4.5	4.2 (2.4)	.5	.4 (.7)	38.9	29	88.4	75	3.0	3	14.8	15	
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	42.6	39.4 (7.4)	9.9	8.6 (3.3)	357.3	276	876.9	750	58.5	48	222.6	217	
J10-J22 Mal. respirat.acute	5-64	1.5	1.4 (1.4)	.5	.4 (.7)	10.0	8	25.7	22	3.0	3	8.2	8	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	2.5	2.6 (2.1)	1.0	.9 (1.0)	42.3	23	93.3	69	6.0	5	32.0	31	
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	3.8	3	.0	0	.0	0	
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0	
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0	
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	3.8	3	.0	0	.0	0	
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0	
Screening di popolazione														
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	67.6	63.3 (9.0)	36.1	33.7 (6.6)									
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	55.8	55.3 (9.4)									
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.7	.6 (.6)									

Appendice

TABELLA A46. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 2 DSB 2

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	----tassi <65 anni	standard. YPLL----	----tassi # <75 anni	standard. YPLL----
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15	T.m.prime vie aer-di	5-64	113.2	106.0 (22.0)	34.1	32.3 (12.4)	1318.8	302 2512.1	652 698.8
		5-64	4.9	4.5 (4.5)	.0	.0 (.0)	18.0	4 67.0	18 .0
C22	T.m.fegato	5-64	9.7	9.1 (6.5)	.0	.0 (.0)	43.3	10 143.2	38 .0
C32	T.m.laringe	5-64	1.6	1.5 (2.7)	.0	.0 (.0)	10.9	3 32.8	8 .0
C33-C34	T.m.trach bronch.pol	5-64	21.0	19.5 (9.4)	1.6	1.5 (2.6)	60.7	14 367.2	98 10.4
C67	T.m.vescica	5-64	4.9	4.5 (4.5)	.0	.0 (.0)	18.0	4 85.2	23 .0
F10	Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 9.7	3 .0
F11-F19	Farmacodipendenza	5-64	6.5	5.4 (4.7)	1.6	1.4 (2.4)	154.8	40 187.0	53 42.7
I60-I69	Dist.circol.encefalo	5-64	9.7	8.7 (6.2)	8.1	7.3 (5.7)	86.1	22 281.5	78 68.6
K70-K76	Cirrosi epatica	5-64	8.1	7.6 (5.9)	4.9	4.5 (4.5)	83.1	19 168.4	44 88.0
V01-Y99	Cause esterne mortal	0-75+	64.1	60.3 (14.9)	28.6	22.5 (8.6)	844.1	186 1169.7	289 489.1
-V01-V99	Incidenti mezzi tras	0-75+	20.1	18.1 (8.0)	11.9	11.9 (6.6)	371.0	81 489.2	120 350.4
-X60-X84	Suicidi	0-75+	11.3	10.5 (6.2)	4.8	3.6 (3.2)	102.7	26 167.5	46 34.4
-X85-Y09	Omicidi	0-75+	1.3	1.3 (2.4)	.0	.0 (.0)	61.9	13 71.1	16 .0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21	T.m.colon-retto	5-64	11.3	10.3 (6.8)	53.5	47.1 (14.3)	118.6	29 226.1	62 483.3
		5-64	4.9	4.3 (4.4)	9.7	8.4 (5.9)	69.8	18 128.6	36 40.5
C43-C44	T.m.pelle	5-64	4.9	4.4 (4.4)	.0	.0 (.0)	30.8	8 67.9	18 .0
C50	T.m.mammella	5-64	1.6	1.5 (2.7)	38.9	34.5 (12.3)	18.0	4 29.4	8 411.4
C53	T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	- .0
C54	T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	- .0
C55	T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	4.9	4.3 (4.3)	-	-	- 31.4
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99	Mal.batt.vir.parassi	5-64	48.5	45.2 (14.3)	13.0	11.2 (6.9)	485.7	113 1131.6	303 100.2
		5-64	3.2	2.9 (3.6)	1.6	1.3 (2.3)	56.2	13 78.5	21 34.4
-B24	AIDS	5-64	1.6	1.5 (2.7)	.0	.0 (.0)	32.6	8 42.6	11 .0
C62	T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0 .0	- -
C81	Malattia di Hodgkin	5-64	1.6	1.4 (2.5)	.0	.0 (.0)	43.6	11 51.7	14 .0
C91-C95	Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	3.5	1 22.4	7 3.1
I10-I19	Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 2.1	1 .0
I10-I15	Ipertensione	5-64	3.2	3.0 (3.7)	.0	.0 (.0)	7.1	2 34.2	9 .0
I20-I25	Mal.ischemiche cuore	5-64	35.6	33.3 (12.3)	8.1	7.1 (5.5)	360.8	83 811.8	215 44.9
J10-J22	Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 23.7	7 .0
J40-J47	Broncopn.cron.ostrut	5-64	3.2	3.0 (3.7)	.0	.0 (.0)	14.4	3 85.3	24 .0
K25-K28	Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	1.6	1.5 (2.6)	.0	0 21.6	6 17.8
K35-K38	Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 .0	0 .0
K40-K46	Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 .0	0 .0
K80-K82	Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 .0	0 .0
O00-O99	Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 .0	0 .0
Screening di popolazione									
C18-C21	T.m.colon-retto	50-74	34.0	30.0 (10.8)	53.9	47.9 (13.8)			
		50-69	-	- (-)	71.1	70.0 (18.9)			
C53	T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)			

Appendice

TABELLA A47. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 2 DSB 3

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI	FEMMINE		# <75 anni
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)				standard. YPLL---	standard. YPLL---	
I GRUPPO:prevenzione primaria											
C00-C15	T.m.prime vie aer-di	5-64	93.1	87.7 (20.7)	34.9	30.3 (11.8)	1126.1	223	2211.9	552	359.3
		5-64	3.4	2.9 (3.6)	.0	.0 (.0)	13.9	3	54.2	15	.0
C22	T.m.fegato	5-64	1.7	1.4 (2.5)	1.7	1.4 (2.4)	3.4	1	33.9	10	3.2
C32	T.m.laringe	5-64	6.8	6.0 (5.3)	.0	.0 (.0)	30.7	7	79.7	20	.0
C33-C34	T.m.trach bronch.pol	5-64	32.2	29.0 (11.6)	3.5	3.0 (3.6)	226.9	51	677.8	187	48.3
C67	T.m.vescica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	3.8	2	.0
F10	Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
F11-F19	Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
I60-I69	Dist.circol.encefalo	5-64	13.5	12.3 (7.6)	14.0	11.8 (7.3)	90.0	20	259.1	73	101.1
K70-K76	Cirrosi epatica	5-64	6.8	6.4 (5.6)	7.0	5.9 (5.2)	55.0	12	131.1	34	53.1
V01-Y99	Cause esterne mortal	0-75+	63.7	55.5 (14.1)	30.9	18.6 (7.0)	706.2	129	971.8	211	153.6
-V01-V99	Incidenti mezzi tras	0-75+	10.2	9.1 (5.8)	4.9	5.2 (4.6)	167.4	30	221.8	47	125.0
-X60-X84	Suicidi	0-75+	14.0	14.2 (7.7)	2.5	1.9 (2.5)	310.9	53	408.9	82	25.4
-X85-Y09	Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.											
C18-C21	T.m.colon-retto	5-64	10.2	9.2 (6.6)	31.4	27.3 (11.2)	61.8	13	180.5	48	271.7
		5-64	10.2	9.2 (6.6)	8.7	7.4 (5.7)	61.8	13	170.2	45	87.6
C43-C44	T.m.pelle	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	10.2	3	.0
C50	T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	22.7	19.9 (9.6)	.0	0	.0	0	184.2
C53	T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0
C54	T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0
C55	T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0
III GRUPPO:assist.osp.territ											
A00-B99	Mal.batt.vir.parassi	5-64	59.2	52.9 (15.6)	24.5	20.2 (9.4)	465.2	104	1164.8	318	165.6
		5-64	5.1	4.4 (4.4)	1.7	1.4 (2.4)	121.3	29	158.3	43	3.2
-B24	AIDS	5-64	5.1	4.4 (4.4)	.0	.0 (.0)	121.3	29	148.0	39	.0
C62	T.m.testicolo	5-64	1.7	1.4 (2.5)	-	- (-)	3.4	1	15.4	4	-
C81	Malattia di Hodgkin	5-64	1.7	1.7 (3.0)	.0	.0 (.0)	20.6	4	41.8	10	.0
C91-C95	Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	3.4	1	29.5	9	13.8
I00-I09	Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	1.7	1.4 (2.4)	.0	0	.0	0	3.2
I10-I15	Ipertensione	5-64	3.4	2.9 (3.6)	5.2	4.4 (4.4)	13.9	3	58.1	17	39.3
I20-I25	Mal.ischemiche cuore	5-64	40.6	36.1 (12.8)	12.2	10.2 (6.7)	207.1	47	674.9	186	106.1
J10-J22	Mal.respirat.acute	5-64	3.4	3.3 (4.2)	.0	.0 (.0)	92.1	18	114.5	26	.0
J40-J47	Broncopn.cron.ostrut	5-64	1.7	1.4 (2.5)	.0	.0 (.0)	3.4	1	68.0	23	.0
K25-K28	Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	1.9	1	.0
K35-K38	Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
K40-K46	Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
K80-K82	Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	1.9	1	.0
O00-O99	Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
Screening di popolazione											
C18-C21	T.m.colon-retto	50-74	57.4	52.8 (14.4)	54.1	45.0 (12.8)					
		50-69	-	- (-)	68.4	71.2 (19.5)					
C53	T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)					

TABELLA A48. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 2 DSB 4

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)			standard. YPLL--	standard. YPLL--	standard. YPLL--	standard. YPLL--		
I GRUPPO: prevenzione primaria													
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	101.6	94.7 (21.8)	37.4	32.9 (12.6)	1644.8	313	2785.3	655	580.8	114	967.6	242
C22 T.m.fegato	5-64	5.3	4.7 (4.8)	5.3	5.7 (5.9)	34.9	8	78.6	20	169.3	28	204.0	38
C32 T.m.laringe	5-64	3.5	3.0 (3.8)	1.8	1.3 (2.3)	15.1	3	116.2	33	3.1	1	47.7	15
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	1.8	1.6 (2.9)	.0	.0 (.0)	11.8	3	37.6	10	.0	0	.0	0
C67 T.m.vescica	5-64	29.8	26.2 (11.1)	5.3	4.2 (4.2)	226.7	44	582.1	149	46.0	11	103.5	31
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	3.5	3.6 (4.5)	.0	.0 (.0)	123.9	23	143.3	30	.0	0	.0	0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	14.0	12.1 (7.4)	7.1	5.8 (5.1)	75.2	17	283.1	79	36.4	8	158.8	49
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	3.5	3.0 (3.8)	7.1	6.0 (5.2)	15.1	3	70.4	19	50.4	12	114.4	31
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	55.7	51.7 (14.2)	21.3	14.7 (6.7)	1130.2	209	1402.9	296	272.5	54	324.9	73
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	19.9	20.0 (9.3)	8.8	8.2 (5.6)	678.0	119	800.5	158	272.5	54	321.6	72
-X60-X84 Suicidi	0-75+	10.6	9.1 (5.7)	.0	.0 (.0)	165.0	35	216.9	52	.0	0	.0	0
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.													
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	14.0	12.8 (7.9)	24.9	21.3 (9.9)	195.4	43	348.9	90	206.0	47	448.2	121
C43-C44 T.m.pelle	5-64	12.3	11.2 (7.4)	8.9	7.8 (6.0)	147.9	33	292.5	76	84.0	19	173.5	47
C50 T.m.mammella	5-64	1.8	1.5 (2.7)	1.8	1.3 (2.3)	47.5	11	56.3	14	3.1	1	22.1	7
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0	.0	0
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0	1.7	1
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0	1.7	1
III GRUPPO: assist.osp.territ													
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	1.8	1.4 (2.6)	.0	.0 (.0)	38.6	9	56.4	15	.0	0	9.6	3
-B24 AIDS	5-64	1.8	1.4 (2.6)	.0	.0 (.0)	38.6	9	47.7	13	.0	0	.0	0
C62 T.m.testicolo	5-64	1.8	1.6 (2.9)	-	- (-)	19.8	4	32.3	8	-	-	-	-
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	1.8	1.4 (2.4)	.0	.0 (.0)	23.2	6	33.0	9	.0	0	.0	0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	43.0	10	93.6	25	45.1	10	69.7	18
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	1.8	1.3 (2.3)	.0	0	2.0	1	3.1	1	14.2	4
I10-I15 Ipertensione	5-64	1.8	1.6 (2.9)	.0	.0 (.0)	19.8	4	49.8	13	.0	0	.0	0
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	54.3	48.4 (15.1)	3.6	3.0 (3.7)	437.1	98	977.1	255	50.2	12	115.6	36
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	3.4	2
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	27.0	10	.0	0	3.4	2
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	2.0	1	.0	0	.0	0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
Screening di popolazione													
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	80.4	70.0 (16.5)	42.5	39.1 (12.8)								
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	53.6	53.3 (16.7)								
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)								

Appendice

TABELLA A49. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.3 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE	
I GRUPPO: prevenzione primaria	2	0	1	3	17	6	17	11	14	15	30	45	65	87	145	170	137	164	929	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	3	9	3	1	5	31	
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	4	11	14	8	8	50	
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	5	3	1	0	15	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	9	28	40	35	54	21	13	215	
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	6	15	12	9	8	57	
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	10	17	23	47	65	71	111	352	
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	9	3	5	8	9	7	3	51	
V01-Y99 Cause esterne mortal	1	0	1	3	16	6	15	7	9	6	10	7	5	15	10	19	16	152		
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	1	0	1	3	13	3	8	0	5	1	3	5	1	1	10	6	4	2	67	
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	2	2	3	2	3	2	0	2	4	3	2	2	10	1	38	
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	10	7	15	21	28	21	16	123
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	7	7	13	19	27	20	16	112
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	2	1	1	0	11	
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	1	2	2	2	8	9	9	12	29	40	55	113	152	143	240	817	
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	2	4	3	1	2	0	1	0	0	4	1	3	21	
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	11	
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C91-C95 Leucemie	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	2	0	4	3	5	10	6	13	47	
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	7	2	13	9	14	16	65	
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	1	2	0	2	3	7	6	24	25	37	70	94	73	146	490	
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	6	5	5	13	34	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	17	30	37	44	
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	2	7	
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	

TABELLA A50. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.3 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	0	0	0	1	6	1	4	5	5	6	7	10	10	24	57	93	126	268	623
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	4	8	8
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	3	1	6	8	22	0
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	3	8	13	6	8	48
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	5	15
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	3	11	28	66	90	221	423
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	2	2	1	5	8	7	1
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	0	0	1	6	1	2	3	3	1	2	3	2	3	6	7	10	26	76
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	0	1	6	1	1	2	1	1	0	2	0	2	1	3	0	0	21
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	3	9
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	0	5	3	6	6	7	20	21	33	35	30	50	216
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	7	8	18	15	19	23	96
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	2	1	7
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	4	11	10	11	14	7	20	88
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	2	1	3	5	2	3	20
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
III GRUPPO: assist.osp.territ	1	0	0	0	1	2	1	4	1	0	5	9	10	28	69	85	143	403	762
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	9
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	3	11	4	7	35
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	7
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10	16	26	108
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	4	16	37	43	83	257	450
J10-J22 Mal.respirat.acute	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	11	44	64
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	1	7	11	9	63
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	11
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	11
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELLA A51. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.3 -

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	----tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni	----tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	133.0	124.6 (14.5)	33.4	30.7 (7.2)	2005.7	1192	3286.8	2283
C22 T.m.fegato	5-64	5.9	5.4 (2.9)	.6	.5 (.9)	40.4	27	98.9	75
C32 T.m.laringe	5-64	3.0	2.7 (2.0)	1.8	1.6 (1.6)	29.3	19	70.6	55
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	3.0	2.7 (2.0)	.0	.0 (.0)	16.5	11	44.8	34
C67 T.m.vescica	5-64	4.2	3.8 (2.4)	6.1	5.1 (2.8)	183.2	120	562.8	423
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.6	.5 (.9)	.0	.0 (.0)	16.3	11	19.3	14
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	3.0	2.8 (2.1)	.6	.5 (.9)	84.6	53	100.4	69
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	20.2	18.3 (5.4)	4.3	3.7 (2.4)	165.5	103	421.4	316
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	11.3	10.1 (4.0)	4.9	4.1 (2.5)	88.6	59	189.0	142
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	68.7	64.0 (9.1)	32.5	22.6 (4.9)	1354.5	773	1692.4	1088
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	30.3	29.3 (6.3)	9.0	9.3 (3.7)	859.8	463	1024.6	621
-X60-X84 Suicidi	0-75+	17.2	16.1 (4.5)	3.8	2.9 (1.7)	242.2	147	327.0	223
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	2.3	1.8 (1.4)	.9	.8 (.9)	48.8	31	59.8	43
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	13.1	11.8 (4.3)	28.6	24.2 (6.1)	100.3	65	256.1	193
C43-C44 T.m.pelle	5-64	10.1	9.1 (3.8)	7.9	6.6 (3.1)	74.2	48	201.7	153
C50 T.m.mammella	5-64	3.0	2.6 (2.0)	1.2	1.1 (1.3)	26.1	18	54.3	41
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	15.8	13.3 (4.5)	.0	0	.0	0
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	3.6	3.1 (2.2)	-	-	-	46.2
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	.0
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	67.7	61.9 (10.0)	20.1	17.5 (5.2)	696.1	440	1421.4	1052
-B24 AIDS	5-64	7.7	6.9 (3.3)	1.8	1.6 (1.5)	143.9	96	189.9	139
C62 T.m.testicolo	5-64	6.5	5.8 (3.0)	1.2	1.1 (1.3)	136.1	91	173.5	128
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	.7	1
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	90.8	52	144.4	97
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.6	.6 (.9)	1.8	1.7 (1.7)	11.9	8	22.2	16
I10-I15 Ipertensione	5-64	6.5	5.9 (3.0)	1.2	1.0 (1.2)	38.0	26	100.3	78
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	41.6	37.8 (7.8)	8.5	7.2 (3.3)	354.8	227	816.2	611
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.2	1.1 (1.3)	.0	.0 (.0)	7.8	5	30.4	24
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	3.6	3.4 (2.4)	3.0	2.7 (2.0)	45.1	25	105.0	77
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.6	.5 (.9)	.0	.0 (.0)	3.8	3	8.6	7
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.6	.5 (.9)	.0	0	.0	13.8
K80-K82 Colest.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	3.3	3
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	67.9	60.8 (9.1)	46.0	37.6 (7.1)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	49.9	48.8 (9.4)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	4.9	4.7 (1.9)				

Appendice

TABELLA A52. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 3 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	# <65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	#	
I GRUPPO:prevenzione primaria													
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	198.1	199.1 (67.0)	24.0	25.7 (26.0)	2703.2	139	4487.1	253	555.1	21	785.0	38
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	8.0	1	.0	0	.0	0
C22 T.m.fegato	5-64	7.3	8.2 (14.3)	8.0	8.7 (15.0)	97.6	4	167.4	8	102.3	4	167.1	8
C32 T.m.laringe	5-64	14.7	15.8 (19.4)	.0	.0 (.0)	75.9	3	212.1	11	.0	0	.0	0
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	36.7	40.5 (31.4)	.0	.0 (.0)	329.0	14	822.8	43	.0	0	36.8	3
C67 T.m.vescica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	64.5	5	.0	0	.0	0
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	29.3	30.0 (26.3)	.0	.0 (.0)	339.0	17	573.1	31	.0	0	6.1	1
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	22.0	24.6 (24.7)	8.0	7.0 (12.1)	213.5	9	412.9	20	49.5	3	110.8	7
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	102.8	88.3 (36.2)	31.5	18.4 (16.2)	1648.1	92	2226.0	135	403.4	14	464.2	19
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	27.1	20.9 (17.1)	5.2	8.0 (13.9)	248.3	13	348.5	20	403.4	14	452.1	18
-X60-X84 Suicidi	0-75+	27.1	27.0 (21.1)	5.2	2.3 (3.9)	736.3	39	957.5	56	.0	0	6.1	1
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	10.8	7.4 (9.3)	.0	.0 (.0)	144.7	9	187.0	13	.0	0	.0	0
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.	5-64	29.3	30.2 (26.3)	16.0	13.8 (16.9)	459.3	22	796.5	44	191.6	10	340.7	22
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	22.0	22.0 (22.1)	.0	.0 (.0)	401.3	19	673.8	38	.0	0	42.9	4
C43-C44 T.m.pelle	5-64	7.3	8.2 (14.2)	.0	.0 (.0)	58.0	3	122.7	6	.0	0	.0	0
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	16.0	13.8 (16.9)	.0	0	.0	0	191.6	10	297.8	18
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0	.0	0
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0	.0	0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0	.0	0
III GRUPPO:assist.osp.territ	5-64	58.7	61.1 (37.5)	16.0	14.0 (17.2)	317.4	15	1061.5	61	66.0	3	271.4	21
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
-B24 AIDS	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	.0	0	-	-	-	-
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	17.9	1	81.2	4	.0	0	18.2	3
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
I10-I15 Ipertensione	5-64	7.3	7.6 (13.2)	.0	.0 (.0)	17.9	1	89.3	5	.0	0	.0	0
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	36.7	38.3 (29.8)	8.0	7.0 (12.1)	263.7	13	801.4	47	49.5	3	171.9	13
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	8.0	1	.0	0	6.1	1
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	7.3	7.6 (13.2)	8.0	7.0 (12.2)	17.9	1	81.2	4	16.6	1	75.1	4
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
Screening di popolazione													
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	160.0	116.4 (42.9)	51.0	31.2 (21.3)								
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	22.7	23.9 (24.8)								
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)								

Appendice

TABELLA A53. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 3 DSB 2

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	# <65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	#	
I GRUPPO:prevenzione primaria													
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	111.5	104.4 (24.3)	21.9	19.2 (10.1)	1726.0	298 2786.4	577	351.6	68	571.4	133	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	7.8	6.7 (5.9)	.0	.0 (.0)	55.3	12 133.8	32	.0	0	.0	0	
C22 T.m.fegato	5-64	2.0	1.6 (2.9)	.0	.0 (.0)	4.0	1 22.6	6	.0	0	1.9	1	
C32 T.m.laringe	5-64	3.9	3.5 (4.3)	.0	.0 (.0)	33.2	7 72.9	17	.0	0	.0	0	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	29.3	25.6 (11.5)	6.0	5.0 (5.0)	174.7	36 527.8	124	59.2	13	137.3	35	
C67 T.m.vescica	5-64	2.0	1.7 (3.0)	.0	.0 (.0)	12.2	3 58.3	15	.0	0	.0	0	
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0	.0	0	
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (.0)	2.0	1.8 (3.1)	.0	0 0	0	54.4	11	64.5	14	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	15.6	13.8 (8.5)	4.0	3.2 (3.9)	93.3	18 275.2	66	30.9	7	86.3	24	
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	9.8	8.4 (6.5)	.0	.0 (.0)	50.4	11 122.1	29	.0	0	8.8	3	
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	61.0	57.0 (15.9)	38.1	22.9 (8.2)	1303.0	211 1573.4	288	207.2	38	272.5	57	
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	26.8	27.5 (11.7)	8.5	7.7 (5.7)	945.0	143 1095.3	187	203.5	37	250.3	50	
-X60-X84 Suicidi	0-75+	8.9	7.8 (5.6)	1.4	.6 (1.0)	53.0	10 89.8	19	.0	0	.0	0	
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	1.5	.8 (1.5)	1.4	1.2 (2.1)	.0	0 2.2	1	3.6	1	16.5	4	
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.													
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	11.7	10.2 (7.2)	25.9	20.9 (10.0)	87.8	18 197.4	47	176.4	38	421.2	108	
C43-C44 T.m.pelle	5-64	7.8	6.8 (5.9)	14.0	11.3 (7.4)	40.5	8 125.7	30	122.2	26	246.5	61	
C50 T.m.mammella	5-64	3.9	3.3 (4.1)	.0	.0 (.0)	47.3	10 71.7	17	.0	0	.0	0	
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	10.0	8.0 (6.2)	.0	0 0	0	42.8	9	143.1	38	
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	2.0	1.6 (2.8)	-	- -	-	11.3	3	29.7	8	
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	- -	-	.0	0	1.9	1	
III GRUPPO:assist.osp.territ													
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	76.3	68.6 (19.1)	23.9	20.2 (10.2)	816.2	156 1547.3	348	260.5	50	563.9	140	
-B24 AIDS	5-64	5.9	5.6 (5.6)	2.0	1.5 (2.7)	135.5	26 170.8	36	3.6	1	16.5	4	
C62 T.m.testicolo	5-64	5.9	5.6 (5.6)	.0	.0 (.0)	135.5	26 170.8	36	.0	0	.0	0	
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0	8.8	3	
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	50.0	10 124.5	29	86.7	18	127.3	29	
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	2.0	1.9 (3.3)	4.0	3.1 (3.8)	40.8	8 64.1	13	7.3	2	33.1	8	
I10-I15 Ipertensione	5-64	5.9	5.1 (5.1)	.0	.0 (.0)	20.2	4 68.8	17	.0	0	14.5	5	
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	45.0	39.7 (14.4)	8.0	6.3 (5.5)	431.2	86 863.4	200	37.6	8	215.6	63	
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	3.9	3.4 (4.3)	.0	.0 (.0)	25.0	5 56.9	13	.0	0	.0	0	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrutt	5-64	5.9	5.8 (5.9)	2.0	2.3 (3.9)	113.6	18 196.3	39	79.9	13	91.8	16	
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 2.2	1	.0	0	.0	0	
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0	.0	0	
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	2.0	1.8 (3.0)	.0	0 0	0	45.5	9	56.3	13	
K80-K82 Colenist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0	.0	0	
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0	.0	0	
Screening di popolazione													
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	47.4	42.9 (13.8)	42.6	40.2 (13.8)								
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	42.6	41.2 (15.4)								
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	2.7	2.4 (2.4)								

Appendice

TABELLA A54. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 3 DSB 3

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	# <65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	#	
I GRUPPO:prevenzione primaria													
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	135.0	126.0 (18.5)	40.2	37.1 (10.2)	2060.3	755 3396.2	1453	702.3	249 1062.0	458		
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	5.8	5.2 (3.7)	1.0	.8 (1.5)	36.9	15 90.5	43	14.0	6 21.8	11		
C22 T.m.fegato	5-64	2.9	2.6 (2.6)	2.0	1.7 (2.1)	35.3	14 85.6	41	20.0	8 39.0	19		
C32 T.m.laringe	5-64	1.0	.8 (1.5)	.0	.0 (.0)	2.1	1 12.9	7	.0	0 .0	0		
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	30.9	28.0 (8.6)	6.9	5.8 (3.8)	173.4	70 554.5	256	57.7	24 123.7	63		
C67 T.m.vescica	5-64	5.8	5.2 (3.7)	1.0	.8 (1.4)	36.9	15 102.6	48	5.9	3 12.4	6		
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	1.0	.8 (1.5)	.0	.0 (.0)	26.6	11 31.5	14	.0	0 .0	0		
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	4.8	4.5 (3.5)	.0	.0 (.0)	136.9	53 162.7	69	.0	0 .0	0		
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	21.2	19.0 (7.1)	4.9	4.3 (3.3)	181.6	68 479.7	219	73.7	29 162.9	85		
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	10.6	9.3 (4.9)	6.9	5.9 (3.9)	94.6	39 199.1	93	56.0	23 105.0	49		
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	67.8	64.3 (11.8)	29.9	23.0 (6.7)	1336.1	470 1676.7	664	475.1	157 597.1	225		
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	32.4	31.0 (8.3)	9.7	10.4 (5.0)	904.7	307 1086.8	414	356.9	110 425.4	149		
-X60-X84 Suicidi	0-75+	19.9	19.0 (6.4)	4.9	4.1 (2.8)	266.1	98 357.3	148	78.3	30 106.9	46		
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	1.5	1.4 (1.8)	.7	.7 (1.2)	58.3	22 68.8	28	22.2	9 27.5	13		
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.	5-64	11.6	10.3 (5.2)	31.4	26.8 (8.2)	60.1	25 216.6	103	282.4	115 562.1	270		
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	9.6	8.6 (4.7)	2.0	5.9 (3.5)	48.1	20 178.1	84	39.8	17 104.5	56		
C43-C44 T.m.pelle	5-64	1.9	1.6 (2.1)	2.0	1.8 (2.2)	12.0	5 38.5	18	26.4	10 48.4	22		
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	18.6	15.8 (6.3)	.0	0 0.0	0	147.4	61 305.6	146		
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	4.9	4.3 (3.3)	-	- -	-	68.8	28 103.6	47		
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	- -	-	.0	0 .0	0		
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	- -	-	.0	0 .0	0		
III GRUPPO:assist.osp.territ	5-64	64.6	58.8 (12.5)	18.6	16.5 (6.6)	691.3	269 1413.5	643	322.0	113 542.8	247		
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	9.6	8.6 (4.7)	2.0	1.7 (2.1)	169.8	70 227.8	103	49.3	20 60.6	28		
-B24 AIDS	5-64	7.7	6.8 (4.2)	2.0	1.7 (2.1)	157.4	65 201.4	92	49.3	20 59.7	27		
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0 1.1	1	-	- -	-		
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0.0	0	.0	0 .0	0		
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	120.3	41 162.6	63	43.4	15 74.6	34		
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	1.0	1.2 (2.0)	.0	0 5.4	3	47.1	14 61.9	23		
I10-I15 Ipertensione	5-64	6.8	6.0 (4.0)	2.0	1.6 (2.0)	49.9	21 118.4	57	7.7	3 36.5	21		
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	40.5	36.7 (9.8)	8.8	7.6 (4.4)	328.9	128 794.8	364	67.9	28 158.3	80		
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 19.7	10	76.6	21 86.0	28		
J40-J47 Broncopn.cron.ostrutt	5-64	1.9	1.7 (2.1)	2.9	2.5 (2.5)	16.4	7 65.3	33	30.0	13 59.4	31		
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	1.0	.8 (1.5)	.0	.0 (.0)	6.0	3 12.6	6	.0	0 .9	1		
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0.0	0	.0	0 .0	0		
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0.0	0	.0	0 4.5	3		
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 5.4	3	.0	0 .0	0		
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0.0	0	.0	0 .0	0		
Screening di popolazione													
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	67.2	62.2 (11.9)	47.1	36.4 (8.7)								
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	56.9	55.9 (12.8)								
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	6.7	6.4 (2.8)								

TABELLA A55. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.4 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	1	1	4	11	12	14	11	15	19	34	62	95	155	229	218	203	276	1361
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	4	6	7	4	4	3	35
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	7	7	13	13	10	6	62
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	5	4	1	1	20
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	24	37	78	75	66	19	21	337
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	9	14	18	15	11	82
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	1	0	0	0	3	5	1	13	13	22	63	97	126	205	549
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	8	6	10	13	18	8	9	6	83
V01-Y99 Cause esterne mortal	1	1	1	4	10	11	10	9	4	6	8	10	8	18	33	8	19	23	184
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	1	4	6	6	6	3	1	2	3	3	1	9	4	2	1	5	57
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	1	4	4	8	1	4	0	28
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	6	10	9	20	35	32	31	29	177
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	9	9	18	34	29	30	25	163
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	3	1	4	14
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	0	0	1	4	4	4	19	22	43	49	99	182	227	203	280	1137
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	3	5	6	6	4	29
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	2	1	4	14	8	7	7	48
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	5
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	5	5	20	16	15	24	93
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	1	1	1	4	13	18	32	38	66	110	125	120	158	687
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	7	7	24	20	39	100
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	9	21	39	25	37	138
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	1	6	18
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	7
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	9

TABELLA A56. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n.4 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	0	0	0	5	3	2	2	6	5	10	13	17	13	45	82	133	228	453	1017
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	2	16	
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	9	6	12	13	46
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	6	2	10	14	9	7	72
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	1	7	16
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	4	3	20	40	92	164	357	685
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	2	2	6	7	12	14	7	56
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	0	0	4	3	1	2	3	1	4	5	3	6	4	6	6	25	51	124
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	0	3	2	1	2	1	0	0	2	0	4	3	1	0	1	2	22
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	9
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	10	15	27	20	40	44	62	48	76	348
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	8	4	15	25	30	21	31	141
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	3	10	
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	10	18	14	22	15	22	19	31	161
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	3	8	8
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	2	7
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	4	4	6	21
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	1	4	0	1	2	2	4	4	12	28	32	85	135	215	517	1042
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	1	4	12	12	35
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	4	1	1	5	3	8	2	30
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	6	12
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	12	25	23	68
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	4	16	14	55	77	123	325	622
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	6	10	22	56	99
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	13	15	73
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	10
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Appendice

TABELLA A57. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL n. 4 -

Tasso di mortalità evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI			FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	# <75 anni	#	<65 anni	# <75 anni	#
I GRUPPO: prevenzione primaria											
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	115.5	102.1 (10.6)	31.3	28.1 (5.7)	1464.4	1278 2649.8	2790	516.0	427	823.6
C22 T.m.fegato	5-64	4.6	3.9 (2.0)	.0	.0 (.0)	36.2	34 82.6	92	.0	0	3.0
C32 T.m.laringe	5-64	5.4	4.6 (2.2)	1.2	1.1 (1.0)	31.8	31 89.3	103	14.9	14	31.8
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	2.9	2.4 (1.5)	.0	.0 (.0)	7.3	8 34.0	40	.0	0	0
C67 T.m.vescica	5-64	6.2	5.2 (2.3)	.4	.3 (.5)	23.7	24 92.1	108	2.3	3	7.9
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.4	.4 (.6)	.0	.0 (.0)	4.2	4 7.3	8	.0	0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	2.9	2.7 (1.7)	.4	.4 (.7)	77.9	73 93.3	96	15.6	13	17.9
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	14.9	12.7 (3.6)	4.9	4.3 (2.2)	120.7	113 296.1	341	60.7	48	144.5
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	12.0	10.2 (3.2)	4.1	3.5 (1.9)	94.6	93 210.0	237	54.8	53	93.3
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	57.7	50.6 (6.6)	36.1	23.6 (4.0)	890.5	721 1148.2	1070	305.0	232	395.4
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	17.9	17.4 (4.1)	6.4	6.4 (2.5)	483.2	373 591.2	519	185.1	131	228.9
-X60-X84 Suicidi	0-75+	8.8	7.2 (2.4)	2.6	2.7 (1.6)	56.8	53 98.1	106	74.4	56	91.9
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.3	.2 (.4)	.3	.3 (.4)	.0	0 0	0	.7	1	3.4
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.											
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	12.4	10.5 (3.3)	32.1	26.1 (5.1)	96.4	95 237.3	274	248.6	253	539.8
C43-C44 T.m.pelle	5-64	11.2	9.4 (3.1)	7.8	6.4 (2.5)	81.2	81 209.2	244	62.0	63	148.4
C50 T.m.mammella	5-64	1.2	1.1 (1.1)	.0	.0 (.0)	15.3	14 28.0	30	.0	0	.8
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	21.4	17.4 (4.1)	.0	0 0	0	163.4	167	343.4
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.8	.7 (.8)	-	- -	-	11.2	12	16.0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.4	.3 (.5)	-	- -	-	.7	1	7.1
III GRUPPO: assist.osp.territ											
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	60.4	51.0 (7.3)	23.9	20.2 (4.6)	478.0	473 1170.8	1359	245.4	210	487.0
-B24 AIDS	5-64	2.1	1.8 (1.3)	1.2	1.1 (1.1)	43.2	43 63.4	71	20.5	19	33.9
C62 T.m.testicolo	5-64	1.7	1.4 (1.2)	.8	.8 (.9)	37.4	37 46.2	50	18.2	17	23.1
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0 0	0	-	-	-
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	42.0	42 77.4	90	103.2	79	134.6
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	1.2	1.0 (.9)	.0	0 0	2.1	3	28.5	16
I10-I15 Ipertensione	5-64	4.5	4.5 (2.1)	1.6	1.3 (1.1)	33.9	34 89.6	107	3.0	3	33.0
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	44.7	37.8 (6.3)	11.5	9.3 (3.0)	329.4	325 816.9	942	72.5	73	192.1
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.2	1.0 (1.0)	1.2	1.0 (.9)	12.4	13 38.6	46	8.7	9	22.3
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	2.9	2.4 (1.5)	1.2	1.0 (.9)	15.4	16 64.0	79	2.2	3	15.4
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.4	.3 (.6)	.0	.0 (.0)	.8	1 8.9	11	.0	0	.8
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.8	.6 (.7)	.0	0 0	.9	2	3.1	3 8.3
K80-K82 Colenist.acuta e cro	5-64	.4	.3 (.6)	.0	.0 (.0)	.8	1 5.8	7	.0	0	1.8
OOO-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0	0
Screening di popolazione											
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	72.2	64.5 (7.5)	47.8	41.0 (6.0)						
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	69.6	68.4 (8.9)						
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	1.1	1.0 (.7)						

TABELLA A58. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 4 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		AMR	SAMR(E.S.)	----tassi <65 anni	standard.	MASCHI		FEMMINE		AMR	SAMR(E.S.)	----tassi standard. YPLL---	# <75 anni	# <65 anni	# <75 anni	# <65 anni	#			
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)					#	#	#	#											
I GRUPPO:prevenzione primaria	5-64	108.6	94.7 (13.4)	31.6	27.7 (7.3)	1341.6	693	2483.5	1518	475.9	239	794.9	501											
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	5.0	4.1 (2.7)	.0	.0 (.0)	26.3	16	76.0	50	.0	0	4.7	4											
C22 T.m.fegato	5-64	5.7	4.8 (3.0)	1.4	1.2 (1.5)	33.5	18	101.0	66	18.5	10	33.9	23											
C32 T.m.laringe	5-64	2.9	2.3 (2.1)	.0	.0 (.0)	8.2	5	33.4	23	.0	0	.0	0											
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	27.1	22.4 (6.3)	6.3	5.1 (2.9)	164.1	97	563.9	375	57.6	36	120.7	88											
C67 T.m.vescica	5-64	5.7	4.6 (2.9)	.7	.5 (.9)	30.3	18	79.5	55	3.8	3	12.6	10											
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.7	.6 (1.0)	.0	.0 (.0)	7.1	4	12.4	8	.0	0	.0	0											
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	4.3	3.9 (2.8)	.7	.7 (1.3)	113.2	62	136.0	82	25.6	13	29.4	16											
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	14.3	12.2 (4.8)	3.5	2.9 (2.3)	131.4	70	290.1	188	33.1	19	113.5	88											
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	11.4	9.7 (4.3)	6.3	5.4 (3.1)	96.2	53	213.1	135	85.8	48	140.8	92											
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	50.4	44.7 (8.3)	28.1	19.9 (5.0)	731.3	349	977.6	537	251.6	112	339.3	181											
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	15.3	14.9 (5.0)	7.0	7.2 (3.5)	399.3	182	495.6	256	198.0	81	250.1	121											
-X60-X84 Suicidi	0-75+	8.8	7.5 (3.3)	2.5	2.1 (1.6)	82.4	43	135.5	82	24.7	14	37.2	24											
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.5	.4 (.8)	.0	0	.0	0	1.3	1	5.9	4											
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.	5-64	11.4	9.3 (4.1)	36.5	29.2 (7.0)	83.1	50	219.3	148	295.4	180	625.8	443											
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	10.0	8.2 (3.8)	8.4	6.7 (3.4)	72.1	43	195.4	133	71.1	43	162.5	118											
C43-C44 T.m.pelle	5-64	1.4	1.1 (1.4)	.0	.0 (.0)	11.0	7	23.9	16	.0	0	1.4	2											
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	24.5	19.7 (5.8)	.0	0	.0	0	193.5	118	402.7	282											
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	1.4	1.2 (1.4)	-	-	-	-	19.1	12	27.2	18											
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.7	.5 (.9)	-	-	-	-	1.3	1	9.1	7											
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	1.4	1.1 (1.3)	-	-	-	-	10.5	7	22.9	17											
III GRUPPO:assist.osp.territ	5-64	50.0	41.7 (8.7)	24.5	20.8 (6.2)	392.4	228	1010.7	675	278.3	139	544.2	358											
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	2.1	1.8 (1.9)	2.1	1.9 (1.9)	45.5	26	68.0	43	35.6	19	59.0	38											
-B24 AIDS	5-64	2.1	1.8 (1.9)	1.4	1.4 (1.7)	45.5	26	57.3	36	31.8	17	40.5	23											
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	.0	0	-	-	-	-											
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.7	1.1 (1.9)	.0	0	3.9	3	50.2	16	55.1	19											
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	15.8	9	36.7	26	104.5	51	147.8	86											
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	2.1	1.6 (1.6)	.0	0	3.9	3	6.4	4	23.0	17											
I10-I15 Ipertensione	5-64	6.4	5.3 (3.1)	2.1	1.6 (1.6)	47.0	28	118.8	80	3.9	3	40.2	33											
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	33.6	28.0 (7.1)	9.1	7.3 (3.5)	247.1	144	637.1	425	60.6	36	172.3	131											
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.4	1.1 (1.5)	1.4	1.1 (1.4)	14.4	8	40.9	27	13.3	8	29.5	22											
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	2.9	2.3 (2.0)	.0	.0 (.0)	19.7	12	74.3	52	.0	0	8.0	7											
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.7	.6 (1.0)	.0	.0 (.0)	1.4	1	15.3	10	.0	0	1.4	2											
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0											
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.7	.5 (.9)	.0	0	.8	1	3.8	3	8.0	6											
K80-K82 Colest.acuta e cro	5-64	.7	.6 (1.0)	.0	.0 (.0)	1.4	1	10.4	7	.0	0	.0	0											
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0											
Screening di popolazione																								
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	70.5	65.3 (10.2)	44.5	40.3 (8.1)																			
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	79.2	78.3 (12.6)																			
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	1.8	1.7 (1.2)																			

Appendice

TABELLA A59. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 4 DSB 2

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)			# <65 anni	# <75 anni	# <65 anni	# <75 anni
I GRUPPO:prevenzione primaria											
C00-C15	T.m.prime vie aer-di	5-64	119.8	110.0 (23.3)	25.0	23.7 (11.3)	1818.9	357	3005.0	719	466.3
		5-64	1.8	1.6 (2.9)	.0	.0 (.0)	36.0	8	68.0	18	.0
C22	T.m.fegato	5-64	5.3	4.6 (4.6)	.0	.0 (.0)	33.2	8	71.7	18	.0
C32	T.m.laringe	5-64	1.8	1.4 (2.6)	.0	.0 (.0)	3.5	1	26.4	8	.0
C33-C34	T.m.trach bronch.pol	5-64	40.5	34.8 (12.6)	5.4	4.5 (4.5)	161.6	38	596.2	163	25.1
C67	T.m.vescica	5-64	7.0	5.9 (5.2)	.0	.0 (.0)	14.1	3	129.0	37	.0
F10	Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
F11-F19	Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
I60-I69	Dist.circol.encefalo	5-64	12.3	10.5 (6.9)	5.4	4.3 (4.3)	39.7	9	219.9	63	17.4
K70-K76	Cirrosi epatica	5-64	7.0	6.1 (5.3)	.0	.0 (.0)	64.8	15	131.3	36	.0
V01-Y99	Cause esterne mortal	0-75+	76.7	67.2 (15.9)	48.1	29.7 (9.5)	1466.0	276	1762.3	377	423.8
-V01-V99	Incidenti mezzi tras	0-75+	23.8	23.8 (10.1)	3.8	3.8 (4.2)	839.8	150	976.2	196	154.6
-X60-X84	Suicidi	0-75+	10.6	7.8 (5.0)	2.5	3.8 (4.7)	39.5	9	65.1	18	203.8
-X85-Y09	Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.											
C18-C21	T.m.colon-retto	5-64	14.1	12.3 (7.6)	28.6	24.3 (10.5)	111.2	25	258.0	69	196.4
		5-64	14.1	12.3 (7.6)	8.9	7.4 (5.8)	111.2	25	249.5	67	47.0
C43-C44	T.m.pelle	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	8.4	3	.0
C50	T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	16.1	13.9 (8.0)	.0	0	.0	0	127.5
C53	T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0
C54	T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0
C55	T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	3.6	3.0 (3.6)	-	-	-	-	21.9
III GRUPPO:assist.osp.territ											
A00-B99	Mal.batt.vir.parassi	5-64	61.7	53.9 (15.8)	21.4	17.8 (9.0)	591.7	133	1273.3	342	148.2
		5-64	3.5	3.0 (3.7)	.0	.0 (.0)	72.4	17	93.5	24	.0
-B24	AIDS	5-64	1.8	1.5 (2.7)	.0	.0 (.0)	48.4	11	57.4	14	.0
C62	T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	.0	-	-
C81	Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
C91-C95	Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	98.9	23	160.8	43	89.2
I00-I09	Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	1.9	1	.0
I10-I15	Ipertensione	5-64	.0	.0 (.0)	1.8	1.4 (2.4)	.0	0	7.9	3	3.3
I20-I25	Mal.ischemiche cuore	5-64	49.3	43.2 (14.2)	12.5	10.1 (6.6)	413.4	92	935.3	249	45.9
J10-J22	Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (.0)	1.8	1.4 (2.4)	.0	0	20.8	7	3.3
J40-J47	Broncopn.cron.ostrut	5-64	3.5	2.9 (3.7)	1.8	1.4 (2.4)	7.0	2	52.8	15	3.3
K25-K28	Ulcer.a peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
K35-K38	Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
K40-K46	Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	1.8	1.4 (2.4)	.0	0	.0	0	3.3
K80-K82	Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	1.4
O00-O99	Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
Screening di popolazione											
C18-C21	T.m.colon-retto	50-74	74.1	63.9 (15.4)	46.7	44.1 (13.3)					
C50	T.m.mammella	50-69	-	- (-)	58.6	59.2 (17.3)					
C53	T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)					

Appendice

TABELLA A60. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 1997-1999.
ASL 4 DSB 3

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	---tassi <65 anni	standard. YPLL---	---tassi # <75 anni	standard. YPLL---	# <65 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria										
C00-C15	T.m.prime vie aer-di	5-64	131.6	113.8 (25.9)	38.6	35.5 (15.2)	1372.3	229	2688.1	553
		5-64	6.7	5.7 (5.8)	.0	.0 (.0)	61.9	11	114.6	24
C22	T.m.fegato	5-64	4.5	3.8 (4.7)	2.3	2.0 (3.5)	27.8	5	83.1	18
C32	T.m.laringe	5-64	4.5	3.6 (4.4)	.0	.0 (.0)	8.5	2	43.4	10
C33-C34	T.m.trach bronch.pol	5-64	37.9	31.1 (13.1)	11.3	9.8 (7.6)	231.7	44	694.9	158
C67	T.m.vescica	5-64	6.7	5.4 (5.4)	.0	.0 (.0)	12.8	3	73.1	17
F10	Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
F11-F19	Farmacodipendenza	5-64	2.2	2.1 (3.7)	.0	.0 (.0)	65.5	11	77.7	14
I60-I69	Dist.circol.encefalo	5-64	20.1	16.9 (9.8)	9.1	9.1 (8.3)	187.8	34	404.4	90
K70-K76	Cirrosi epatica	5-64	20.1	16.7 (9.7)	2.3	1.8 (3.2)	128.2	24	302.0	66
V01-Y99	Cause esterne mortal	0-75+	56.0	47.1 (14.5)	46.3	26.7 (9.5)	648.1	96	894.6	157
-V01-V99	Incidenti mezzi tras	0-75+	18.1	16.2 (8.8)	7.7	6.7 (5.7)	282.8	42	391.5	68
-X60-X84	Suicidi	0-75+	6.6	4.9 (4.4)	3.1	3.0 (3.6)	.0	0	22.9	6
-X85-Y09	Omicidi	0-75+	1.6	1.0 (1.9)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.										
C18-C21	T.m.colon-retto	5-64	13.4	11.1 (7.9)	22.7	18.5 (10.2)	108.4	20	253.9	57
		5-64	11.1	9.0 (7.0)	4.5	3.9 (4.8)	63.9	13	193.1	45
C43-C44	T.m.pelle	5-64	2.2	2.1 (3.6)	.0	.0 (.0)	44.6	8	60.7	12
C50	T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	18.2	14.6 (9.0)	.0	0	.0	0
C53	T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	0
C54	T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	0
C55	T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	0
III GRUPPO: assist.osp.territ										
A00-B99	Mal.batt.vir.parassi	5-64	91.4	76.3 (20.7)	25.0	21.1 (11.2)	604.9	113	1542.6	343
		5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	12.6	3
-B24	AIDS	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
C62	T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	.0	-
C81	Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
C91-C95	Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	52.8	10	97.4	22
I10-I19	Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
I10-I15	Ipertensione	5-64	8.9	7.3 (6.3)	.0	.0 (.0)	34.6	7	103.1	23
I20-I25	Mal.ischemiche cuore	5-64	73.6	61.4 (18.5)	18.2	14.9 (9.2)	481.0	89	1219.4	268
J10-J22	Mal.respirat.acute	5-64	2.2	1.9 (3.5)	.0	.0 (.0)	23.5	4	55.7	13
J40-J47	Broncopn.cron.ostrut	5-64	2.2	1.8 (3.2)	4.5	3.3 (4.1)	13.0	3	49.4	13
K25-K28	Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	2.3	1
K35-K38	Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
K40-K46	Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	2.3	1
K80-K82	Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
O00-O99	Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
Screening di popolazione										
C18-C21	T.m.colon-retto	50-74	74.8	63.6 (16.8)	59.1	38.0 (11.8)				
C50	T.m.mammella	50-69	-	- (-)	52.2	51.5 (17.7)				
C53	T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)				

Appendice

TABELLA A61. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
UMBRIA

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	4	1	6	20	57	40	55	55	59	59	138	163	300	432	662	920	683	1022	4676
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	10	12	11	21	37	31	11	13	150
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	7	8	17	31	38	56	22	19	201
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	11	4	10	13	11	11	9	75
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	1	1	1	0	10	15	36	55	113	163	237	250	130	74	1086
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	15	23	33	54	45	54	234
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	1	7
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	6	6	9	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	33
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	1	1	2	0	6	5	23	24	58	108	198	370	393	758	1947
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	2	0	1	4	7	11	17	13	28	28	52	56	26	28	273
V01-Y99 Cause esterne mortal	4	1	6	20	47	31	42	44	28	23	35	32	53	47	54	92	45	66	670
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	4	1	6	14	32	19	27	29	12	9	14	7	17	12	18	30	15	17	283
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	4	10	7	9	8	9	8	13	16	18	18	11	30	13	16	190
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	0	4	2	9	20	28	51	81	106	114	80	102	597
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	16	25	46	70	100	101	73	92	533
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	4	3	5	9	6	9	6	8	55
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	2	9	
III GRUPPO: assist.osp.territ	2	1	1	2	4	4	12	15	25	48	73	112	189	305	524	768	697	1288	4070
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	1	0	3	4	4	4	4	2	5	8	9	26	14	21	105
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	1	0	3	4	3	4	0	0	0	0	0	0	0	15
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	3	1	0	2	3	15
C91-C95 Leucemie	2	1	1	0	3	0	1	2	0	0	3	6	14	23	40	35	18	33	182
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	3	2	15
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	11	8	25	38	57	67	90	307
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	3	6	4	13	34	54	77	139	192	348	445	405	750	2470
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	3	8	10	17	34	37	125	240
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	3	10	13	37	58	145	143	244	664
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	8	12	4	11	41
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	9
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	3	5	16

TABELLA A62. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
UMBRIA

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE	
I GRUPPO: prevenzione primaria	3	2	1	8	10	13	11	16	19	31	50	40	84	140	257	493	582	1740	3500	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	7	7	9	8	17	57		
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	9	11	21	36	25	43	151	
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	7	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	11	15	18	39	43	46	34	245	
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	4	9	12	11	25	67	
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	10	14	9	22	48	134	330	441	1502	2518
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	3	9	14	18	29	36	173	
V01-Y99 Cause esterne mortal	3	2	1	8	10	13	8	11	7	16	10	18	16	21	31	26	69	277		
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	1	1	1	4	8	8	4	6	3	3	7	4	6	5	6	12	5	3	87	
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	3	1	4	1	4	4	2	6	3	8	7	4	4	3	1	55	
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4	
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	1	1	5	17	13	31	62	68	88	101	146	202	157	258	1150	
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	13	17	27	42	53	99	72	119	452	
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	3	2	10	6	3	19	49	
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	1	5	13	8	19	37	46	50	53	70	82	63	93	540	
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	5	1	2	0	1	2	2	5	23	
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	0	5	6	6	6	31	
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	3	4	7	7	11	16	55	
III GRUPPO: assist.osp.territ	1	0	1	2	2	3	2	2	10	14	25	33	58	132	263	577	698	2112	3935	
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	1	3	3	13	16	15	31	89	
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	1	0	2	0	9	
C91-C95 Leucemie	1	0	1	2	0	2	0	0	2	2	6	5	7	9	14	25	25	41	142	
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	12	6	9	37
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	3	7	12	22	85	87	283	504
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	1	1	0	1	4	6	11	19	32	80	169	336	456	1370	2486	
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	8	15	42	41	197	309		
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	5	11	22	47	55	147	295	
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7	4	16	29	
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	5	12
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	13	23
000-099 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TABELLA A63. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
UMBRIA

Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-14	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75+	0-74	0-75+	
I GRUPPO: prevenzione primaria	7.0	33.7	81.7	46.7	60.3	58.0	69.3	73.6	162.6	223.5	383.4	619.6	1013.3	2521.9	187.6	390.5	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.5	1.2	11.8	16.4	14.0	30.1	56.6	52.8	8.7	12.5	
C22 T.m.fegato	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	2.5	8.2	10.9	21.7	44.4	58.1	93.1	9.5	16.8	
C32 T.m.laringe	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	5.9	15.0	5.1	14.3	19.8	29.7	4.0	6.3	
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	.0	.0	1.4	1.2	1.1	.0	11.7	18.7	42.4	75.4	144.4	233.7	362.7	436.1	57.8	90.7	
C67 T.m.vescica	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.5	9.5	19.1	32.9	50.5	146.9	7.4	19.5	
F10 Alcoolismo psic.alco	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	2.4	1.3	1.2	1.4	.0	.9	.5	.6	
F11-F19 Farmacodipendenza	.0	.0	8.6	7.0	9.9	7.4	4.7	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.0	2.8	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	.0	.0	1.4	1.2	2.2	.0	7.0	6.2	27.1	32.9	74.1	154.9	303.0	1461.3	39.0	162.6	
K70-K76 Cirrosi epatica	.0	.0	2.9	.0	1.1	4.2	8.2	13.7	20.0	17.8	35.7	40.1	79.5	105.6	14.9	22.8	
V01-Y99 Cause esterne mortal	7.0	33.7	67.3	36.2	46.1	46.4	32.9	28.7	41.2	43.8	67.7	67.4	82.6	195.0	42.7	56.0	
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	7.0	23.6	45.8	22.2	29.6	30.6	14.1	11.2	16.5	9.5	21.7	17.2	27.5	59.5	20.2	23.6	
-X60-X84 Suicidi	.0	6.7	14.3	8.2	9.9	8.4	10.6	10.0	15.3	21.9	23.0	25.8	16.8	56.6	12.0	15.9	
-X85-Y09 Omicidi	.0	.0	1.4	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.2	
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.2	2.3	11.2	23.6	38.3	65.1	116.1	162.2	284.3	27.5	49.9
C18-C21 T.m.colon-retto	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	2.3	8.7	18.9	34.2	58.7	100.4	153.0	255.5	24.4	44.5	
C43-C44 T.m.pelle	.0	.0	.0	.0	.0	3.2	.0	2.5	4.7	4.1	6.3	12.9	9.1	22.0	2.9	4.6	
C50 T.m.mammella	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.8	.0	6.7	.2	.8	
III GRUPPO: assist.osp.territori	2.6	3.4	5.7	4.7	13.2	15.8	29.3	59.9	86.0	153.5	241.5	437.4	802.0	2644.9	120.4	339.9	
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	.0	.0	1.4	.0	3.3	4.2	4.7	5.0	4.7	2.7	6.3	11.4	13.7	58.6	4.0	8.8	
-B24 AIDS	.0	.0	1.4	.0	3.3	4.2	3.5	5.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	1.3	
C62 T.m.testicolo	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	2.3	.0	.0	.0	1.2	1.4	.0	.0	.5	.4	
C81 Malattia di Hodgkin	.0	1.7	.0	1.2	1.1	1.1	.0	1.2	.0	1.3	.0	4.3	1.5	4.8	.9	1.3	
C91-C95 Leucemie	2.6	0	4.3	.0	1.1	2.1	.0	.0	3.5	8.2	17.8	32.9	61.2	82.6	8.8	15.2	
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	.0	1.4	4.5	9.6	.5	1.3	
I10-I15 Ipertensione	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	3.7	8.2	15.0	10.2	35.8	58.1	205.6	8.5	25.6	
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	.0	.0	.0	3.5	6.6	4.2	15.3	42.4	63.6	105.5	177.6	275.3	532.6	1537.2	79.6	206.3	
J10-J22 Mal.respirat.acute	.0	1.7	.0	.0	.0	.0	2.3	1.2	2.4	4.1	10.2	14.3	26.0	188.3	4.0	20.0	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	.0	.0	.0	.0	1.1	2.1	3.5	6.2	3.5	13.7	16.6	53.0	88.7	511.1	12.1	55.4	
K25-K28 Ulcera peptica	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	.0	1.3	1.2	4.3	12.2	25.9	1.3	3.4	
K35-K38 Appendicite	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	
K40-K46 Ernia addominale	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.0	6.7	.2	
K80-K82 Colecist.acuta e cro	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.8	.0	13.4	.2	1.3	

TABELLA A64. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
UMBRIA

Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-14	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75+	0-74	0-75+
I GRUPPO: prevenzione primaria	4.1	14.4	14.9	15.2	12.1	17.0	22.3	38.3	57.8	51.8	99.7	176.8	318.0	1698.7	61.5	273.4
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	2.5	2.3	2.5	2.3	8.8	8.6	20.5	2.1	4.5
C22 T.m.fegato	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	4.6	1.2	10.6	13.8	25.9	62.8	4.2	11.8
C32 T.m.laringe	.0	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	4.9	.6	.5	.5
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	2.3	9.9	12.7	19.4	21.3	49.2	53.2	65.2	12.3	19.1
C67 T.m.vescica	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	5.9	5.0	11.1	29.0	1.7	5.2
F10 Alcoolismo psic.alco	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	.0	.1	.1
F11-F19 Farmacodipendenza	.0	.0	.0	.0	2.2	.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.3
I60-I69 Dist.circol.encefalo	.0	.0	.0	.0	.0	2.1	7.0	12.4	16.2	11.6	26.1	60.6	165.8	1371.6	22.0	196.7
K70-K76 Cirrosi epatica	.0	.0	.0	.0	.0	2.1	1.2	3.7	3.5	3.8	10.6	17.6	22.2	72.4	4.8	13.5
V01-Y99 Cause esterne mortal	4.1	14.4	14.9	15.2	8.8	11.7	8.2	8.6	18.5	12.9	21.3	20.2	25.9	76.0	13.6	21.6
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	2.0	7.2	12.0	9.4	4.4	6.4	3.5	3.7	8.1	5.1	7.1	6.3	7.4	12.1	6.0	6.8
-X60-X84 Suicidi	.0	5.4	1.5	4.7	1.1	4.2	4.7	2.5	6.9	3.8	9.4	8.8	4.9	4.8	4.2	4.3
-X85-Y09 Omicidi	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	1.2	.2	.3	.3
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	.0	.0	1.5	1.2	5.5	18.0	15.2	38.3	71.6	88.2	104.4	127.5	180.6	372.3	47.8	89.8
C18-C21 T.m.colon-retto	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	9.9	15.0	22.0	32.0	53.0	65.5	175.0	14.5	35.3
C43-C44 T.m.pelle	.0	.0	1.5	.0	.0	1.1	.0	2.5	1.2	1.2	3.5	2.5	12.3	16.9	1.9	3.8
C50 T.m.mammella	.0	.0	.0	1.2	5.5	13.8	9.4	23.5	42.8	59.6	59.3	66.9	86.6	143.6	27.1	42.2
C53 T.m.collo dell'utero	.0	.0	.0	.0	.0	2.1	2.3	1.2	5.8	1.2	2.3	.0	1.2	5.4	1.3	1.8
C54 T.m.corpo dell'utero	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	3.5	1.2	3.5	.0	6.1	10.9	1.2	2.4
C55 T.m.utero n.s.	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	.0	1.2	3.5	2.5	3.5	5.0	8.6	20.5	1.9	4.3
III GRUPPO: assist.osp.territori	1.4	3.6	3.0	3.5	2.2	2.1	11.7	17.3	28.9	42.8	68.8	166.7	325.4	2043.9	49.2	307.4
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	.0	.0	1.5	.0	1.1	.0	4.7	.0	1.2	1.2	3.5	3.7	16.0	37.4	2.4	7.0
-B24 AIDS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.3	.2
C81 Malattia di Hodgkin	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	1.2	.0	5.0	1.2	1.2	.6	.7
C91-C95 Leucemie	1.4	3.6	.0	2.3	.0	.0	2.3	2.5	6.9	6.4	8.3	11.3	17.3	54.9	4.6	11.1
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	5.0	4.9	.9	2.9
I10-I15 Ipertensione	.0	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	3.7	1.2	3.8	8.3	15.1	27.2	274.6	4.4	39.4
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	.0	.0	1.5	1.2	.0	1.1	4.7	7.4	12.7	24.6	37.9	101.0	209.1	1304.7	29.1	194.2
J10-J22 Mal.respirat.acute	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.5	1.2	1.2	2.3	10.1	18.5	169.0	2.6	24.1
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	.0	1.2	3.5	3.8	5.9	13.8	27.2	150.3	4.1	23.0
K25-K28 Ulcera peptica	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	1.2	16.3	.2	2.3
K35-K38 Appendicite	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
K40-K46 Ernia addominale	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2	2.4	5.4	.3	.9
K80-K82 Colecist.acuta e cro	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.9	.0	1.8
000-099 Gravid.parto puerper	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

Appendice

TABELLA A65. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
UMBRIA

Tassi annui standardizzati (pop. 1991) di mortalità per 100.000 residenti, per causa.

CAUSA popolazione	MASCHI						FEMMINE					
	TUTTE LE ETA'			0-74			TUTTE LE ETA'			0-74		
	----tassi standardizzati----	Umbra (E.S.)	Italiana Mond.	tassi standardizzati	Umbra	Italiana Mond.	----tassi standardizzati----	Umbra (E.S.)	Italiana Mond.	tassi standardizzati	Umbra	Italiana Mond.
I GRUPPO: prevenzione primaria	350.6 (9.0)	312.9	154.8	178.4	154.6	104.5	155.6 (4.9)	142.0	63.1	52.8	45.7	31.7
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	11.5 (1.6)	9.8	5.2	8.2	6.8	4.2	3.1 (.7)	2.7	1.4	1.8	1.5	1.0
C22 T.m. fegato	15.4 (1.9)	13.2	6.3	9.1	7.5	4.6	7.7 (1.1)	6.7	2.9	3.5	2.9	1.8
C32 T.m.laringe	5.9 (1.2)	5.1	2.6	3.9	3.3	2.0	.4 (.3)	.3	.2	.4	.3	.2
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	84.0 (4.5)	71.7	35.9	54.7	45.4	27.8	14.9 (1.7)	12.9	6.9	10.7	9.0	5.7
C67 T.m.vescica	17.4 (2.0)	15.3	6.4	7.0	5.7	3.4	3.2 (.7)	2.8	1.2	1.4	1.1	.7
F10 Alcoolismo psic.alco	.6 (.4)	.5	.4	.5	.5	.3	.1 (.1)	.1	.0	.1	.1	.0
F11-F19 Farmacodipendenza	2.7 (.8)	2.9	2.6	2.9	3.1	2.7	.3 (.3)	.3	.2	.3	.3	.2
I60-I69 Dist.circol.encefalo	139.1 (5.5)	125.3	48.6	36.1	29.6	17.8	100.2 (3.7)	92.1	34.5	17.5	14.4	8.9
K70-K76 Cirrosi epatica	20.8 (2.2)	18.2	9.9	14.0	12.0	8.0	8.8 (1.2)	7.8	3.5	4.1	3.4	2.2
V01-Y99 Cause esterne mortal	53.3 (3.6)	50.9	36.9	42.1	40.7	33.6	17.1 (1.9)	16.4	12.2	13.1	12.7	10.9
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	23.0 (2.4)	22.9	19.2	20.1	20.3	18.3	6.5 (1.3)	6.5	5.5	6.0	6.0	5.4
-X60-X84 Suicidi	15.2 (1.9)	14.2	9.6	11.9	11.2	8.6	4.2 (1.0)	4.0	3.1	4.1	3.9	3.0
-X85-Y09 Omicidi	.2 (.2)	.2	.2	.2	.2	.2	.3 (.2)	.3	.2	.2	.2	.1
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	45.3 (3.2)	39.4	19.0	26.1	21.7	13.4	65.0 (3.5)	57.6	30.8	42.0	36.3	24.1
C18-C21 T.m.colon-retto	40.3 (3.1)	35.0	16.7	23.1	19.1	11.7	24.0 (2.1)	21.0	10.0	12.6	10.6	6.7
C43-C44 T.m.pelle	4.2 (1.0)	3.7	2.0	2.8	2.4	1.6	2.4 (.7)	2.2	1.2	1.5	1.3	.9
C50 T.m.mammella	.7 (.4)	.6	.2	.2	.1	.1	32.5 (2.5)	28.9	16.7	24.1	21.1	14.1
C53 T.m.collo dell'utero	- (-)	-	-	-	-	-	1.4 (.5)	1.3	.9	1.2	1.1	.8
C54 T.m.corpo dell'utero	- (-)	-	-	-	-	-	1.7 (.6)	1.5	.8	1.0	.9	.6
C55 T.m.utero n.s.	- (-)	-	-	-	-	-	2.9 (.7)	2.6	1.3	1.6	1.4	.9
III GRUPPO: assist.osp.territ	296.1 (8.1)	264.4	114.2	112.7	94.2	59.5	165.5 (4.9)	150.5	59.3	40.5	33.6	21.1
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	7.8 (1.3)	7.1	3.6	3.8	3.4	2.4	4.4 (.9)	3.9	1.9	2.0	1.7	1.2
-B24 AIDS	1.2 (.5)	1.2	1.1	1.3	1.3	1.1	.2 (.2)	.2	.2	.3	.3	.2
C62 T.m.testicolo	.4 (.3)	.4	.3	.4	.4	.3	- (-)	-	-	-	-	-
C81 Malattie di Hodgkin	1.2 (.5)	1.1	.8	.9	.9	.7	.7 (.4)	.6	.3	.6	.5	.3
C91-C95 Leucemie	13.7 (1.8)	12.0	6.5	8.3	7.0	4.9	7.7 (1.2)	6.9	3.9	4.2	3.7	2.9
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	1.1 (.5)	1.0	.4	.4	.3	.2	1.9 (.6)	1.6	.7	.8	.6	.4
I10-I15 Ipertensione	22.6 (2.3)	20.1	8.3	8.0	6.6	4.0	20.6 (1.7)	18.8	7.0	3.6	3.0	1.9
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	180.2 (6.4)	160.4	70.3	74.3	61.9	38.6	103.0 (3.8)	93.8	35.9	23.5	19.2	11.6
J10-J22 Mal.respirat.acute	16.6 (1.9)	15.3	6.1	3.8	3.2	2.1	12.0 (1.3)	11.0	4.2	2.1	1.7	1.0
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	47.7 (3.2)	42.9	16.3	11.3	9.3	5.6	12.7 (1.4)	11.5	4.5	3.4	2.8	1.7
K25-K28 Ulcera peptica	2.9 (.8)	2.5	1.1	1.1	.9	.6	1.2 (.4)	1.1	.4	.1	.1	.1
K35-K38 Appendicite	.1 (.1)	.1	.0	.0	.0	.0	.0 (.0)	.0	.0	.0	.0	.0
K40-K46 Ernia addominale	.6 (.4)	.5	.2	.1	.1	.1	.5 (.3)	.5	.2	.2	.2	.1
K80-K82 Colecist.acuta e cro	1.2 (.5)	1.0	.4	.2	.2	.1	.9 (.3)	.8	.3	.0	.0	.0
000-099 Gravid.parto puerper	.0 (.0)	.0	.0	.0	.0	.0	.0 (.0)	.0	.0	.0	.0	.0

TABELLA A66. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
UMBRIA

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI				FEMMINE			
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	---tassi <65 anni	standard.	YPLL--#	<75 anni	---tassi <65 anni	standard.	YPLL--#	<75 anni
I GRUPPO:prevenzione primaria	5-64	105.0	96.5 (5.4)	31.4	27.9 (2.9)	1565.8	4951	2605.0	9773	478.8	1517	780.4	3041
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	4.1	3.6 (1.0)	1.0	.8 (.4)	30.3	109	76.0	316	9.2	34	20.1	88
C22 T.m.fegato	5-64	3.9	3.4 (.9)	1.7	1.3 (.6)	24.6	88	75.2	313	9.0	34	28.0	129
C32 T.m.laringe	5-64	2.3	2.1 (.7)	.1	.1 (.1)	16.5	59	40.5	165	3.1	11	4.6	20
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	25.6	22.3 (2.5)	6.1	5.1 (1.1)	162.5	582	470.2	1960	44.9	169	109.8	486
C67 T.m.vescica	5-64	2.8	2.4 (.8)	.7	.5 (.3)	11.7	43	49.5	211	2.6	10	10.0	48
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.6	.5 (.3)	.1	.1 (.1)	4.7	18	9.0	37	.2	1	.9	4
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	3.6	3.6 (1.0)	.3	.3 (.3)	113.3	358	133.4	468	8.3	29	10.1	39
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	13.2	11.5 (1.8)	6.9	5.8 (1.2)	92.4	327	275.8	1162	58.9	221	143.7	663
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	9.1	8.0 (1.5)	2.3	1.9 (.7)	90.4	319	174.9	709	18.6	71	42.7	191
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	56.0	50.9 (3.5)	21.6	16.4 (1.8)	1019.2	3050	1300.0	4433	324.1	937	410.7	1374
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	23.6	22.9 (2.4)	6.8	6.5 (1.2)	653.5	1911	786.3	2593	183.1	517	223.5	721
-X60-X84 Suicidi	0-75+	15.9	14.2 (1.8)	4.3	4.0 (.9)	223.4	687	306.8	1081	80.2	240	108.9	381
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.2	.2 (.2)	.3	.3 (.2)	10.0	27	11.2	33	4.4	13	5.8	20
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.	5-64	12.6	10.9 (1.7)	31.5	26.4 (2.7)	81.2	300	230.8	971	272.8	1017	543.9	2344
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	10.7	9.3 (1.6)	7.4	6.1 (1.2)	63.5	233	193.4	814	48.0	181	124.4	553
C43-C44 T.m.pelle	5-64	1.9	1.6 (.6)	1.0	.9 (.5)	17.7	68	36.1	152	13.8	44	22.2	88
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	19.7	16.5 (2.1)	.0	0	1.2	5	178.1	668	339.4	1455
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	1.4	1.2 (.5)	-	-	-	-	17.0	64	25.9	108
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.9	.7 (.4)	-	-	-	-	6.7	25	13.0	56
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	1.1	.9 (.5)	-	-	-	-	9.1	35	19.0	84
III GRUPPO:assist.osp.territ	5-64	53.5	47.1 (3.7)	16.8	14.3 (2.0)	485.2	1693	1103.3	4519	170.3	568	378.6	1627
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	3.0	2.6 (.8)	1.2	1.1 (.5)	45.9	163	70.2	280	20.0	64	30.7	119
-B24 AIDS	5-64	1.7	1.5 (.6)	.3	.3 (.2)	36.7	129	45.9	179	5.0	18	7.1	28
C62 T.m.testicolo	5-64	.4	.4 (.3)	-	- (-)	6.8	25	10.0	41	-	-	-	-
C81 Malattie di Hodgkin	5-64	.7	.7 (.4)	.2	.2 (.2)	19.1	57	24.9	85	1.8	7	5.5	24
C91-C95 Leucemie	0-14	2.6	2.5 (2.1)	1.4	1.4 (1.6)	63.2	189	105.9	390	57.3	165	83.1	293
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.1	.1 (.1)	.2	.2 (.2)	.7	3	2.5	11	.4	2	4.4	22
I10-I15 Ipertensione	5-64	3.3	2.9 (.9)	1.7	1.4 (.6)	24.3	88	67.4	283	12.3	46	31.7	144
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	36.4	31.7 (3.0)	8.3	6.9 (1.3)	267.4	968	678.8	2838	61.9	221	177.3	812
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.9	1.7 (.7)	.7	.5 (.3)	19.2	59	40.4	155	5.3	20	15.5	73
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	4.1	3.6 (1.0)	1.4	1.2 (.5)	35.3	129	93.0	393	10.2	39	27.7	128
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.3	.3 (.2)	.1	.1 (.1)	3.2	13	8.2	37	1.1	4	1.9	8
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.2	2	.0	0	.8	4
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	1.2	5	.0	0	.0	0
000-099 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
Screening di popolazione													
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	69.3	63.8 (4.0)	37.3	34.1 (2.9)								
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	56.9	56.6 (4.3)								
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	1.9	1.8 (.5)								

Appendice

TABELLA A67. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.1 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE	
I GRUPPO: prevenzione primaria	0	1	1	1	9	5	6	6	14	12	30	26	53	87	105	139	88	149	732	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	7	10	7	1	3	33	
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	10	2	0	28	
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	2	2	0	2	0	15	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	8	9	18	28	42	32	20	10	172
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	7	12	6	6	42	
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3	12	15	22	60	50	118	286	
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	4	10	7	8	2	3	48	
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	1	1	1	8	5	4	5	9	7	6	2	13	11	8	10	5	9	105	
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	1	1	1	3	2	3	4	4	3	1	0	2	3	2	3	0	0	33	
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	4	2	1	0	1	1	4	0	3	3	4	2	3	4	32	
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	8	13	16	12	16	14	86
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8	11	16	10	14	12	76	
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	1	1	8	
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	6	9	25	28	53	84	100	102	175	590
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	3	8	
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	2	4	6	4	1	24	
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	4	7	8	9	52	
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	6	18	19	34	58	50	59	341	
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	9	19	42
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	4	29	23	41	110	
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	2	7	
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

TABELLA A68. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.1 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE	
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	0	0	2	4	3	3	2	7	5	8	3	9	14	40	71	72	266	510	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	2	6	
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	5	4	7	22	
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	6	9	6	5	3	37	
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	3	10	
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	2	20	48	53	237	367	
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	7	3	6	21	
V01-Y99 Cause esterne mortal	1	0	0	2	4	3	2	1	3	4	3	0	2	3	3	1	5	7	44	
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	1	0	0	2	4	1	1	1	2	2	1	0	1	1	1	1	1	1	21	
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1	0	12	
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	9	10	19	15	31	25	18	43	179	
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	7	5	17	14	8	20	78	
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	0	0	4	10	
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	5	6	11	9	8	10	8	74	
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	5	12	
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	5	11	23	37	83	95	327	588	
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	0	7	
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	6	2	10	26
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	11	14	59	94
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	15	23	56	61	191	357
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	4	32	43	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	11	25	47	
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TABELLA A69. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.1 -

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	# <75 anni	<65 anni	# <75 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	116.0	107.2 (14.6)	33.2	31.3 (8.1)	1531.1	772 2742.1	1623	697.3 328 985.7 553
C22 T.m.fegato	5-64	3.5	3.1 (2.4)	.7	.6 (1.0)	21.9	13 83.2	55	7.4 4 19.2 13
C32 T.m.laringe	5-64	1.4	1.3 (1.5)	1.4	1.2 (1.5)	2.9	2 47.1	32	15.1 8 27.1 18
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	6.4	5.8 (3.3)	.7	.7 (1.1)	61.5	34 114.8	71	20.6 11 25.2 15
C67 T.m.vescica	5-64	28.3	25.6 (7.0)	5.8	5.2 (3.1)	210.6	112 558.0	350	48.6 27 116.0 76
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.7	.6 (1.0)	.0	.0 (.0)	9.8	6 13.9	9	.0 0 0 0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	1.4	1.3 (1.5)	.0	.0 (.0)	39.9	22 47.3	28	.0 0 0 0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	14.9	13.2 (4.9)	5.1	4.3 (2.8)	81.5	46 265.7	172	52.6 29 106.3 74
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	12.7	11.4 (4.6)	1.4	1.2 (1.4)	111.3	63 243.8	154	16.5 10 29.9 21
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	56.7	52.2 (8.9)	22.5	20.0 (5.6)	976.8	467 1299.1	708	535.2 238 655.2 331
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	17.8	17.2 (5.3)	10.8	11.4 (4.5)	507.2	243 622.5	335	408.4 173 480.5 230
-X60-X84 Suicidi	0-75+	17.3	15.9 (4.9)	6.1	6.0 (3.0)	277.4	125 364.3	189	126.7 64 173.1 99
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 0 0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	10.6	9.4 (4.1)	34.0	29.1 (7.3)	56.8	33 197.1	128	262.2 148 562.7 368
C43-C44 T.m.pelle	5-64	9.2	8.2 (3.9)	10.1	8.7 (4.0)	42.6	24 166.1	108	63.0 35 161.3 108
C50 T.m.mammella	5-64	1.4	1.2 (1.4)	1.4	1.2 (1.4)	14.2	8 30.9	20	22.5 13 33.8 23
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	20.2	17.4 (5.6)	.0	0 0	0	163.0 92 334.0 214
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.7	.6 (1.0)	-	- -	-	7.4 4 12.1 8
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	- -	-	.0 0 0 0
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	53.7	48.8 (9.7)	16.6	14.3 (5.1)	431.8	235 1093.3	691	97.8 54 318.8 219
-B24 AIDS	5-64	.0	.0 (.0)	1.4	1.3 (1.5)	.0	0 5.7	4	21.1 12 30.8 19
C62 T.m.testicolo	5-64	.7	.7 (1.1)	-.7	.6 (1.1)	.0	0 0	0	13.7 8 17.9 11
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.7	.7 (1.1)	.0	.0 (.0)	20.0	11 23.6	14	.0 0 3.5 3
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	76.4	36 131.3	74	21.1 12 52.1 33
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 4.8	3	.0 0 0 0
I10-I15 Ipertensione	5-64	4.2	3.9 (2.7)	2.2	1.7 (1.7)	33.6	18 85.6	54	4.1 3 29.3 22
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	36.1	32.5 (7.8)	7.9	6.8 (3.5)	249.2	141 690.0	444	37.7 21 162.1 114
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.4	1.3 (1.5)	1.4	1.3 (1.6)	2.9	2 25.8	18	12.3 7 27.5 18
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	5.0	4.4 (2.9)	.7	.6 (1.0)	30.9	18 92.9	59	1.4 1 13.4 11
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.7	.7 (1.1)	.0	.0 (.0)	4.8	3 14.9	9	.0 0 0 0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 0 0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 0 0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 0 0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 0 0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	70.7	64.9 (10.4)	56.4	47.7 (8.8)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	64.4	63.3 (11.6)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	1.0	.9 (.9)				

Appendice

TABELLA A70. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 1 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI	FEMMINE		# <75 anni	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)				standard. YPLL---	standard. YPLL---		
I GRUPPO:prevenzione primaria												
C00-C15	T.m.prime vie aer-di	5-64	122.8	114.5 (20.0)	39.0	37.1 (11.8)	1629.5	470	2893.1	979	939.6	250 1244.8
C22	T.m.fegato	5-64	2.5	2.3 (2.8)	1.3	1.1 (1.9)	11.2	3	71.9	27	12.8	4 27.1 10
C32	T.m.laringe	5-64	4.9	4.6 (4.1)	.0	.0 (.0)	37.8	12	84.3	29	23.5	8 34.7 13
C33-C34	T.m.trach bronch.pol	5-64	36.8	33.7 (10.7)	7.5	6.6 (4.6)	305.7	92	706.7	250	66.8	22 141.6 53
C67	T.m.vescica	5-64	1.2	1.2 (2.1)	1.3	1.0 (1.7)	8.6	3	58.5	22	2.3	1 11.9 5
F10	Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 0 0
F11-F19	Farmacodipendenza	5-64	2.5	2.2 (2.8)	.0	.0 (.0)	69.6	22	82.6	28	.0	0 0 0
I60-I69	Dist.circol.encefalo	5-64	17.2	15.3 (7.1)	5.0	4.2 (3.7)	108.2	35	321.7	119	51.8	17 99.7 41
K70-K76	Cirrosi epatica	5-64	9.8	8.6 (5.3)	2.5	2.0 (2.5)	83.3	28	188.2	70	28.9	10 51.0 20
V01-Y99	Cause esterne mortal	0-75+	54.7	50.6 (11.8)	25.2	22.9 (8.2)	999.8	274	1328.5	415	753.4	189 877.4 247
-V01-V99	Incidenti mezzi tras	0-75+	17.0	16.9 (7.1)	13.5	14.6 (6.9)	495.3	132	619.5	187	580.7	140 667.8 180
-X60-X84	Suicidi	0-75+	16.0	14.0 (6.0)	5.4	5.4 (3.9)	237.8	66	317.8	101	172.7	49 208.4 66
-X85-Y09	Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 0 0
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.												
C18-C21	T.m.colon-retto	5-64	3.7	3.1 (3.1)	44.0	37.6 (11.1)	26.6	9	123.0	48	314.5	101 697.2 261
C43-C44	T.m.pelle	5-64	3.7	3.1 (3.1)	11.3	9.6 (5.5)	26.6	9	123.0	48	84.5	28 192.5 75
C50	T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	1.3	1.1 (1.9)	.0	0	.0	0	12.8	4 23.5 9
C53	T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	1.3	1.1 (1.9)	-	-	-	-	12.8	4 20.9 8
C54	T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0 0 0
C55	T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	2.5	2.3 (2.8)	-	-	-	-	11.3	3 37.1 13
III GRUPPO:assist.osp.territ												
A00-B99	Mal.batt.vir.parassi	5-64	46.7	42.6 (12.0)	22.6	19.5 (8.0)	416.9	133	1029.9	378	131.8	42 405.8 157
-B24	AIDS	5-64	.0	.0 (.0)	1.3	1.1 (1.9)	.0	0	6.7	3	23.5	8 30.8 11
C62	T.m.testicolo	5-64	1.2	1.1 (2.0)	-	- (-)	24.9	8	32.6	11	-	- - -
C81	Malattia di Hodgkin	5-64	1.2	1.1 (2.0)	.0	.0 (.0)	34.8	11	41.3	14	.0	0 0 0
C91-C95	Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	64.0	20	115.8	41	36.9	12 90.0 33
I10-I19	Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	1.6	1	.0	0 0 0
I10-I15	Ipertensione	5-64	6.1	5.6 (4.4)	3.8	3.0 (3.0)	34.4	11	101.2	37	7.0	3 46.8 19
I20-I25	Mal.ischemiche cuore	5-64	30.7	27.9 (9.7)	11.3	9.7 (5.6)	233.6	76	640.0	238	55.3	18 207.8 83
J10-J22	Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (.0)	1.3	1.3 (2.2)	.0	0	3.2	2	9.0	3 27.7 10
J40-J47	Broncopn.cron.ostrut	5-64	1.2	1.0 (1.7)	.0	.0 (.0)	16.5	6	60.6	23	.0	0 2.6 2
K25-K28	Ulcera peptica	5-64	1.2	1.2 (2.1)	.0	.0 (.0)	8.6	3	26.6	9	.0	0 0 0
K35-K38	Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 0 0
K40-K46	Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 0 0
K80-K82	Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 0 0
O00-O99	Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 0 0
Screening di popolazione												
C18-C21	T.m.colon-retto	50-74	67.9	59.6 (12.8)	63.9	52.3 (12.1)						
C50	T.m.mammella	50-69	-	- (-)	91.1	89.0 (18.2)						
C53	T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	1.7	1.6 (1.6)						

Appendice

TABELLA A71. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 1 DSB 2

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI		FEMMINE		# <75 anni
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)			standard. YPLL---	standard. YPLL---	# <65 anni	# <75 anni	
I GRUPPO: prevenzione primaria												
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	106.7	97.7 (21.3)	25.5	23.4 (10.5)	1402.3	302	2548.2	644	374.0	78	638.6
C22 T.m.fegato	5-64	5.0	4.3 (4.4)	.0	.0 (.0)	38.0	9	101.1	28	.0	0	8.2
C32 T.m.laringe	5-64	8.3	7.4 (5.8)	1.7	1.5 (2.7)	94.7	23	158.6	42	47.4	11	16.5
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	16.7	14.7 (8.1)	3.4	3.0 (3.7)	83.3	20	360.0	100	21.5	5	76.9
C67 T.m.vescica	5-64	5.0	4.3 (4.4)	.0	.0 (.0)	24.1	6	84.1	23	.0	0	.0
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	1.7	1.4 (2.5)	.0	.0 (.0)	23.8	6	33.9	9	.0	0	.0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	11.7	10.2 (6.7)	5.1	4.4 (4.4)	45.3	11	189.8	53	53.7	13	115.1
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	16.7	14.8 (8.2)	.0	.0 (.0)	147.1	35	315.3	84	.0	0	1.7
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	59.4	53.9 (13.9)	19.1	16.6 (7.5)	946.0	193	1261.8	293	248.1	48	364.0
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	18.9	17.6 (8.0)	7.2	7.3 (5.4)	522.8	111	627.4	148	183.8	33	236.7
-X60-X84 Suicidi	0-75+	18.9	18.0 (8.3)	7.2	6.8 (4.8)	329.9	59	425.5	88	64.3	15	125.5
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.												
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	20.0	17.6 (8.8)	20.4	17.5 (8.8)	97.5	23	296.0	80	191.5	47	380.1
C43-C44 T.m.pelle	5-64	16.7	14.7 (8.1)	8.5	7.2 (5.6)	62.9	15	221.2	60	31.3	8	114.9
C50 T.m.mammella	5-64	3.3	2.9 (3.6)	1.7	1.3 (2.3)	34.6	8	74.8	20	34.9	9	46.7
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-. -	(-)	.0	.0 (.0)	-. -	-. -	-. -	-. -	.0	0	.0
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-. -	(-)	.0	.0 (.0)	-. -	-. -	-. -	-. -	.0	0	.0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-. -	(-)	.0	.0 (.0)	-. -	-. -	-. -	-. -	.0	0	1.7
III GRUPPO: assist.osp.territ												
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	63.4	56.8 (16.0)	8.5	7.3 (5.7)	452.2	102	1178.5	313	52.7	13	203.3
-B24 AIDS	5-64	.0	.0 (.0)	1.7	1.5 (2.6)	.0	0	4.2	2	17.7	4	30.7
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	93.2	16	152.6	33	.0	0	1.7
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	9.1	3	.0	0	.0
I10-I15 Ipertensione	5-64	1.7	1.5 (2.6)	.0	.0 (.0)	32.0	8	64.5	18	.0	0	5.2
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	43.3	38.4 (13.1)	3.4	2.9 (3.6)	271.0	65	757.7	207	14.0	3	100.4
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	3.3	2.9 (3.6)	1.7	1.5 (2.6)	6.9	2	55.9	16	17.7	4	29.0
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	10.0	8.8 (6.3)	1.7	1.4 (2.4)	49.2	12	134.1	36	3.3	1	28.2
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
Screening di popolazione												
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	74.5	71.6 (17.0)	46.4	41.1 (12.7)							
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	29.0	28.5 (11.9)							
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)							

Appendice

TABELLA A72. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.2 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	3	0	0	9	19	15	23	27	14	23	47	58	103	182	269	318	264	381	1755
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	4	5	5	17	11	3	5	57
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	6	15	19	21	10	11	89
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	5	3	4	6	28
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	14	18	42	70	80	98	45	27	403
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	9	17	14	20	76
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	2	3	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	7	10	14	46	88	120	159	278	726
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	1	0	0	1	0	6	5	3	8	11	25	19	13	6	98
V01-Y99 Cause esterne mortal	3	0	0	9	16	11	17	22	5	7	14	15	21	21	26	29	16	27	259
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	3	0	0	6	12	6	10	13	0	2	8	1	10	3	5	12	5	5	101
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	1	3	2	4	6	3	5	3	9	6	8	5	9	3	6	73
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	10	22	33	43	31	22	45	216
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	9	20	27	41	29	21	43	197
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	5	2	1	1	2	17
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
III GRUPPO: assist.osp.territ	1	1	1	0	2	2	6	5	10	23	27	50	84	131	208	296	287	491	1625
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2	1	1	4	6	3	9	6	3	40
-B24 AIDS	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	5
C91-C95 Leucemie	1	1	1	0	1	0	0	2	0	0	1	2	5	14	14	15	5	15	77
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	3	12	14	18	33	38	127
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	2	3	0	6	17	21	35	68	79	143	180	162	291	1007
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	2	6	7	18	41	80
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	6	2	14	25	58	57	262
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	3	10
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	4
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	8

TABELLA A73. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.2 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	1	1	4	2	3	5	10	7	11	20	18	33	56	88	183	219	714	1376
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	5	4	4	8	26
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	7	8	16	9	19	19	66
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	7	10	13	16	17	18	9	101
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	3	9	23
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	3	5	19	40	120	161	620	979
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	7	7	11	14	22	67
V01-Y99 Cause esterne mortal	1	1	1	4	2	3	4	7	3	2	7	5	10	6	5	12	9	27	109
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	1	2	2	1	2	2	1	1	2	1	4	2	3	4	0	0	28
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	2	0	1	0	4	2	0	0	3	2	3	2	0	1	1	21
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	1	1	5	8	9	24	21	34	40	44	76	59	84	406
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	4	8	20	13	38	24	39	157
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	5	15	189
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	1	1	3	5	3	13	15	20	17	25	30	24	32	189
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	0	0	1	0	1	10
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	3	3	12
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	2	3	3	5	4	23
III GRUPPO: assist.osp.territ	1	0	1	0	1	2	2	2	3	8	9	12	20	50	103	227	267	867	1575
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	3	6	6	6	10	36
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3
C91-C95 Leucemie	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	2	2	5	3	11	11	14	54
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	4	2	16
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	3	2	7	33	30	98
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	6	11	30	72	134	190	590	1042
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	5	15	12	92	128
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	1	4	6	20	12	51	101
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	7
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	7
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELLA A74. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.2 -

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	# <75 anni	<65 anni	# <75 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	92.5	86.2 (8.2)	31.2	27.8 (4.5)	1424.5	1824 2414.9	3640	463.6 605 763.9 1205
C22 T.m.fegato	5-64	4.4	3.9 (1.7)	.8	.7 (.7)	36.0	52 80.2	132	9.7 14 19.2 33
C32 T.m.laringe	5-64	3.6	3.2 (1.5)	1.9	1.6 (1.0)	31.1	43 85.6	139	11.5 18 35.9 65
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	1.6	1.5 (1.0)	.0	.0 (.0)	9.6	13 29.5	48	.0 0 2.0 4
C67 T.m.vescica	5-64	22.7	20.2 (3.8)	7.6	6.5 (2.1)	136.3	196 433.8	714	55.3 83 127.9 223
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.5	.5 (.6)	.0	.0 (.0)	2.4	3 6.4	10	.0 0 0 0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	4.4	4.2 (1.8)	.3	.2 (.4)	126.1	167 149.9	220	7.4 11 8.7 14
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	9.6	8.6 (2.5)	5.2	4.4 (1.7)	71.9	103 241.7	408	52.8 81 123.1 225
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	6.6	5.9 (2.0)	1.6	1.3 (.9)	67.7	93 137.8	222	11.6 18 33.6 62
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	54.2	49.7 (5.4)	21.3	16.5 (2.9)	937.5	1147 1213.0	1688	314.4 378 406.0 564
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	21.1	20.6 (3.6)	5.5	5.3 (1.8)	576.9	686 697.3	934	139.4 158 174.5 228
-X60-X84 Suicidi	0-75+	15.3	13.8 (2.8)	4.1	4.0 (1.5)	208.6	273 295.5	438	94.6 116 125.7 178
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.4	.5 (.6)	.6	.5 (.5)	24.6	27 27.8	33	10.8 13 14.2 20
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	11.5	10.2 (2.7)	27.9	23.8 (4.0)	70.5	103 217.6	362	241.0 363 489.5 843
C43-C44 T.m.pelle	5-64	9.9	8.8 (2.5)	6.2	5.3 (1.9)	54.1	78 180.5	300	48.0 73 119.9 210
C50 T.m.mammella	5-64	1.6	1.4 (1.0)	.5	.5 (.5)	16.4	25 35.5	59	2.3 3 8.0 14
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	16.5	14.1 (3.1)	.0	0 1.5	3	143.7 214 281.9 481
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	2.2	1.8 (1.1)	-	- -	-	25.3 38 38.7 65
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.8	.7 (.6)	-	- -	-	3.8 6 9.4 17
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	57.7	52.0 (6.2)	16.3	14.2 (3.1)	531.0	738 1206.0	1946	198.5 271 402.8 685
-B24 AIDS	5-64	3.6	3.2 (1.5)	1.4	1.3 (1.0)	54.6	74 87.5	135	29.3 36 43.7 65
C62 T.m.testicolo	5-64	1.9	1.8 (1.1)	.3	.2 (.4)	47.6	64 58.4	88	1.7 3 3.7 6
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.3	.2 (.4)	-	- (-)	5.2	8 8.3	13	- - -
C91-C95 Leucemie	0-14	.5	.5 (.6)	.0	.0 (.0)	5.8	8 11.0	18	.0 0 1.7 3
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	4.6	4.6 (4.6)	3.3	3.3 (4.0)	84.2	103 134.3	197	61.0 73 85.2 122
I10-I15 Ipertensione	5-64	.0	.0 (.0)	.5	.4 (.5)	.0	0 0	0	1.0 2 9.3 18
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	3.3	3.0 (1.4)	2.2	1.8 (1.1)	25.6	37 72.2	118	22.2 33 40.6 71
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	41.6	37.2 (5.2)	7.0	6.0 (2.0)	304.5	433 768.2	1257	55.7 82 164.2 303
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	1.6	1.5 (1.0)	.5	.5 (.5)	16.2	23 32.4	53	7.7 12 15.2 28
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	3.3	3.0 (1.4)	2.2	1.9 (1.1)	34.9	52 87.6	148	21.6 33 42.7 75
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 1.9	3	.0 0 0 0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 .7	2	.0 0 0 .3 1
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 1.5	3	.0 0 0 .0 0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 0 .0 0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	69.9	63.9 (6.4)	31.9	30.3 (4.5)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	50.2	49.9 (6.4)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	2.9	2.8 (.9)				

Appendice

TABELLA A75. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 2 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	----tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni	----tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni
I GRUPPO:prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	99.1	91.5 (11.7)	31.8	28.2 (6.3)	1543.9	1034	2563.1	1987
C22 T.m.fegato	5-64	4.8	4.2 (2.5)	1.5	1.4 (1.4)	39.6	29	81.6	68
C32 T.m.laringe	5-64	2.1	1.8 (1.6)	1.5	1.3 (1.3)	8.9	7	49.4	43
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	1.6	1.4 (1.5)	.0	.0 (.0)	8.1	6	27.5	23
C67 T.m.vescica	5-64	26.0	23.0 (5.7)	8.7	7.4 (3.1)	165.4	123	495.6	414
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.5	.4 (.8)	.0	.0 (.0)	1.1	1	4.9	4
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	5.3	5.1 (2.9)	.5	.4 (.8)	156.6	103	186.2	137
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	8.5	7.6 (3.3)	4.6	3.9 (2.2)	59.3	43	220.9	185
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	8.5	7.6 (3.3)	1.5	1.3 (1.3)	91.3	63	173.0	139
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	51.8	48.7 (7.7)	22.6	17.2 (4.2)	1007.0	654	1274.3	933
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	20.5	20.3 (5.1)	6.0	5.5 (2.6)	617.4	384	732.6	511
-X60-X84 Suicidi	0-75+	15.6	14.1 (4.0)	4.1	4.1 (2.2)	230.5	172	321.4	265
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.8	.9 (1.2)	.4	.3 (.6)	46.5	27	52.6	33
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	16.4	14.5 (4.5)	29.8	25.3 (5.8)	102.8	78	295.9	249
C43-C44 T.m.pelle	5-64	14.3	12.7 (4.2)	6.2	5.2 (2.6)	73.3	54	233.8	197
C50 T.m.mammella	5-64	2.1	1.8 (1.6)	1.0	.9 (1.1)	29.6	23	59.0	50
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	19.0	16.2 (4.6)	.0	0	3.1	3
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	2.1	1.8 (1.6)	-	-	-	32.1
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	1.0	.8 (1.0)	-	-	-	6.0
				.5	.4 (.7)	-	-	-	5.1
									4
									8.9
									8
III GRUPPO:assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	65.2	58.7 (9.2)	12.8	11.0 (3.8)	679.7	487	1380.6	1128
-B24 AIDS	5-64	4.8	4.4 (2.6)	1.5	1.4 (1.4)	82.0	56	119.2	92
C62 T.m.testicolo	5-64	2.6	2.5 (2.0)	.5	.5 (.8)	70.7	48	85.8	64
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	3.1	3
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	19.0	16.2 (4.6)	.0	0	3.1	3
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	5.5	5.7 (7.0)	3.2	2.9 (5.0)	120.7	78	165.6	124
I10-I15 Ipertensione	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	45.6	40.9 (7.6)	2.6	2.2 (1.7)	41.8	31	99.8	83
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.6	1.4 (1.4)	.0	.0 (.0)	14.9	11	32.0	26
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	4.2	3.6 (2.3)	2.1	1.7 (1.5)	48.1	38	107.6	93
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.7	1
K80-K82 Colecit.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
									0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	84.7	78.9 (10.1)	29.1	26.7 (5.9)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	58.8	58.8 (9.8)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	2.7	2.7 (1.3)				

TABELLA A76. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 2 DSB 2

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)			standard. YPLL---	# <65 anni	# <75 anni	standard. YPLL---
I GRUPPO:prevenzione primaria											
C00-C15	T.m.prime vie aer-di	5-64	81.2	75.4 (18.6)	29.4	27.1 (11.3)	1111.0	254	2052.0	536	420.6
		5-64	4.9	4.4 (4.5)	.0	.0 (.0)	44.5	11	104.6	28	.0
C22	T.m.fegato	5-64	6.5	5.9 (5.2)	3.3	2.8 (3.4)	55.4	13	122.0	33	20.3
C32	T.m.laringe	5-64	1.6	1.4 (2.5)	.0	.0 (.0)	17.3	4	32.7	9	.0
C33-C34	T.m.trach bronch.pol	5-64	26.0	24.2 (10.5)	4.9	4.3 (4.3)	149.8	35	464.5	123	44.1
C67	T.m.vescica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	2.2	1	.0
F10	Alcoolismo psic.alco	5-64	1.6	1.5 (2.7)	.0	.0 (.0)	11.2	3	23.7	6	.0
F11-F19	Farmacodipendenza	5-64	4.9	4.2 (4.2)	.0	.0 (.0)	122.9	31	147.6	41	.0
I60-I69	Dist.circol.encefalo	5-64	8.1	7.4 (5.8)	3.3	2.8 (3.5)	66.0	16	236.8	66	13.7
K70-K76	Cirrosi epatica	5-64	1.6	1.4 (2.6)	4.9	4.2 (4.2)	3.5	1	58.2	17	23.5
V01-Y99	Cause esterne mortal	0-75+	44.9	40.8 (12.0)	15.4	13.7 (7.1)	640.4	141	859.3	213	319.0
-V01-V99	Incidenti mezzi tras	0-75+	13.7	12.7 (6.7)	4.7	5.9 (5.3)	354.8	80	428.0	108	254.8
-X60-X84	Suicidi	0-75+	19.9	17.2 (7.5)	4.7	4.3 (3.7)	123.0	30	220.4	59	47.1
-X85-Y09	Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.											
C18-C21	T.m.colon-retto	5-64	6.5	6.0 (5.2)	21.2	18.1 (8.7)	21.7	5	133.0	36	158.5
		5-64	4.9	4.5 (4.6)	4.9	4.3 (4.3)	18.2	4	114.9	31	30.8
C43-C44	T.m.pelle	5-64	1.6	1.4 (2.6)	.0	.0 (.0)	3.5	1	18.1	5	.0
C50	T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	11.4	9.7 (6.4)	.0	0	.0	0	67.3
C53	T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0
C54	T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0
C55	T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	4.9	4.1 (4.1)	-	-	-	-	60.5
III GRUPPO:assist.osp.territ											
A00-B99	Mal.batt.vir.parassi	5-64	29.2	26.9 (11.0)	9.8	8.3 (5.9)	266.5	60	773.6	208	80.5
-B24	AIDS	5-64	1.6	1.3 (2.3)	.0	.0 (.0)	34.4	9	75.9	22	.0
C62	T.m.testicolo	5-64	1.6	1.3 (2.3)	.0	.0 (.0)	34.4	9	42.5	13	.0
C81	Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	11.4	9.7 (6.4)	.0	0	.0	0	67.3
C91-C95	Leucemie	0-14	1.6	1.5 (2.7)	.0	.0 (.0)	11.2	3	23.7	6	.0
I00-I09	Cardiopat.reumat.cro	5-64	8.8	9.6 (16.6)	.0	.0 (.0)	101.5	19	159.8	37	3.2
I10-I15	Ipertensione	5-64	.0	.0 (.0)	3.3	2.9 (3.5)	.0	0	.0	0	0
I20-I25	Mal.ischemiche cuore	5-64	19.5	17.6 (8.8)	4.9	4.1 (4.1)	115.8	28	428.3	118	9.7
J10-J22	Mal.respirat.acute	5-64	1.6	1.4 (2.6)	.0	.0 (.0)	3.5	1	20.3	6	.0
J40-J47	Broncopn.cron.ostrut	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	25.2	8	.0
K25-K28	Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
K35-K38	Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
K40-K46	Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	2.2	1	.0
K80-K82	Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
O00-O99	Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
Screening di popolazione											
C18-C21	T.m.colon-retto	50-74	55.4	51.5 (14.4)	22.9	24.0 (10.3)					
C50	T.m.mammella	50-69	-	- (-)	56.7	54.3 (16.7)					
C53	T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)					

Appendice

TABELLA A77. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 2 DSB 3

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	# <75 anni	# <65 anni	# <75 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	74.0	70.9 (19.0)	38.7	34.9 (13.1)	1299.6	253	2121.4	503
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	1.7	1.6 (2.9)	.0	.0 (.0)	12.0	3	29.2	8
C22 T.m.fegato	5-64	1.7	1.9 (3.4)	1.8	1.6 (2.8)	69.7	13	110.6	25
C32 T.m.laringe	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	8.8	3
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	17.2	15.4 (8.5)	5.3	4.3 (4.3)	90.0	20	324.8	87
C67 T.m.vescica	5-64	1.7	1.6 (2.9)	.0	.0 (.0)	12.0	3	34.1	8
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	1.7	1.5 (2.8)	.0	.0 (.0)	48.8	11	57.8	14
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	12.1	10.5 (7.0)	14.1	12.0 (7.4)	92.9	21	259.7	75
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	3.4	3.0 (3.7)	.0	.0 (.0)	22.0	5	65.4	18
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	56.1	48.6 (13.3)	27.0	19.5 (8.2)	952.3	178	1230.5	266
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	24.2	23.9 (10.0)	4.9	5.0 (4.3)	703.9	128	851.9	174
-X60-X84 Suicidi	0-75+	5.1	4.9 (4.3)	2.5	3.7 (4.5)	73.1	13	113.2	25
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	3.4	2.7 (3.4)	24.6	21.6 (10.0)	38.3	10	96.9	29
C43-C44 T.m.pelle	5-64	3.4	2.7 (3.4)	7.0	6.4 (5.6)	38.3	10	96.9	29
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	15.8	13.6 (7.9)	.0	0	.0	0
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	1.8	1.6 (2.8)	-	-	-	18.8
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	63.7	56.7 (16.2)	28.2	25.3 (11.1)	386.9	88	1136.8	307
-B24 AIDS	5-64	1.7	1.4 (2.5)	1.8	2.4 (4.1)	3.4	1	15.3	4
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	27.3	6	119.2	31
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
I10-I15 Ipertensione	5-64	1.7	1.5 (2.7)	.0	.0 (.0)	18.6	4	41.2	11
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	48.2	42.4 (13.9)	17.6	15.0 (8.3)	270.5	62	806.6	220
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.7	1.5 (2.7)	1.8	1.5 (2.7)	18.6	4	34.3	9
J40-J47 Broncopn.cron.estrut	5-64	5.2	4.8 (4.9)	3.5	3.0 (3.7)	48.5	11	109.2	28
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	1.9	1
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
K80-K82 Colenist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	8.8	3
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	41.8	33.1 (10.7)	35.3	35.7 (12.4)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	24.9	25.7 (11.6)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)				

TABELLA A78. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 2 DSB 4

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)			standard. YPLL---	# <65 anni	standard. YPLL---	# <65 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria											
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	101.8	96.0 (22.2)	23.2	21.1 (10.2)	1502.8	283	2625.1	615	542.0	102
C22 T.m.fegato	5-64	5.3	4.6 (4.7)	.0	.0 (.0)	39.8	9	101.1	28	.0	0
C32 T.m.laringe	5-64	7.0	6.1 (5.3)	1.8	1.4 (2.4)	43.2	10	142.8	38	3.3	1
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	3.5	3.2 (4.0)	.0	.0 (.0)	15.9	3	53.0	13	.0	0
C67 T.m.vescica	5-64	14.0	11.6 (7.1)	8.9	7.7 (6.0)	75.8	18	315.3	91	64.4	14
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	1.8	1.4 (2.5)	.0	.0 (.0)	3.4	1	35.6	10	.0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	3.5	3.4 (4.2)	.0	.0 (.0)	107.2	22	126.5	28	.0	0
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	12.3	10.9 (7.2)	.0	.0 (.0)	99.3	23	297.3	82	.0	0
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	8.8	7.5 (5.9)	.0	.0 (.0)	101.4	24	177.9	48	.0	0
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	69.5	62.4 (15.5)	17.4	15.4 (7.6)	1016.8	173	1375.2	276	474.4	87
-X60-X84 Suicidi	0-75+	27.5	26.0 (10.3)	5.0	4.6 (4.2)	553.8	94	712.2	142	121.1	23
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	19.7	18.8 (8.9)	5.0	4.1 (3.6)	370.5	58	482.4	88	44.5	11
		.0	.0 (.0)	2.5	2.3 (3.0)	.0	0	.0	0	70.6	13
										81.1	16
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.											
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	8.8	7.9 (6.2)	32.1	26.7 (10.9)	49.3	11	178.8	48	218.6	52
C43-C44 T.m.pelle	5-64	7.0	6.4 (5.6)	7.1	5.9 (5.1)	45.8	10	163.3	43	35.8	8
C50 T.m.mammella	5-64	1.8	1.4 (2.5)	.0	.0 (.0)	3.4	1	15.5	4	.0	0
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	14.3	12.0 (7.3)	.0	0	.0	0	105.9	25
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	7.1	5.9 (5.1)	-	-	-	-	56.1	13
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	1.8	1.4 (2.4)	-	-	-	-	3.3	1
		-	- (-)	1.8	1.5 (2.6)	-	-	-	-	17.6	4
										30.3	8
III GRUPPO: assist.osp.territ											
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	57.9	50.3 (15.2)	23.2	20.2 (9.8)	451.2	104	1130.7	303	256.8	51
-B24 AIDS	5-64	3.5	2.9 (3.7)	1.8	1.4 (2.4)	36.1	8	67.3	18	3.3	1
C62 T.m.testicolo	5-64	1.8	1.5 (2.7)	.0	.0 (.0)	32.7	8	42.8	11	.0	0
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	-	- (-)	-	- (-)	32.7	8	42.8	11	-	-
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	11.0	11.7 (20.3)	.0	0	15.0	5	132.7	22
I10-I15 Ipertensione	5-64	.0	.0 (.0)	3.6	2.8 (3.4)	.0	0	.0	0	6.6	2
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	3.5	2.9 (3.6)	1.8	1.4 (2.4)	6.8	2	51.1	14	3.3	1
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	45.6	39.5 (13.5)	7.1	6.4 (5.6)	330.5	77	834.6	223	52.5	12
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	1.8	1.5 (2.7)	1.8	1.4 (2.4)	32.7	8	46.8	13	23.3	6
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	1.8	1.7 (3.1)	3.6	3.0 (3.7)	12.5	3	63.7	18	35.1	8
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	9.0	3	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
K80-K82 Colecit.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
Screening di popolazione											
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	67.2	61.3 (15.7)	46.6	43.8 (13.4)						
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	39.5	40.4 (14.5)						
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	9.5	8.8 (4.4)						

Appendice

TABELLA A79. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.3 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	0	0	3	5	12	7	11	7	13	9	29	34	54	73	107	198	140	216	918
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	3	5	3	2	22	
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	1	11	4	4	31
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	5	4	3	2	19
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	8	10	16	30	36	49	23	17
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	7	12	15	47
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	7	9	11	23	39	89	78	150
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	1	2	6	2	6	9	6	8
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	0	3	5	8	4	8	5	6	4	7	6	10	7	12	24	11	18	138
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	3	2	6	4	4	2	3	2	2	1	3	4	4	6	5	5	58
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	3	1	0	2	1	3	1	2	4	4	2	1	9	3	40
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	7	11	22	26	20	23	121
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	5	10	19	23	17	19	103
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	2	3	4	17
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	1	1	1	2	5	4	6	16	14	31	42	98	154	141	246	762
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3	0	0	0	1	2	4	1	17
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3	7	7	3	7	30
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	1	7
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3	11	9	11	41
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	9	9	24	25	67	96	90	176	504
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	9	3	20	38
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	9	13	22	29	109
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	7
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2

TABELLA A80. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.3 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	0	0	1	1	6	1	3	2	7	12	10	15	26	31	116	114	290	636
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	2	2	2	2	11
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	9	4	6	23
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	4	7	7	9	5	2	39
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	5	12
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	4	13	17	82	93	249	469
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0	6	6	11	30
V01-Y99 Cause esterne mortal	1	0	0	1	1	6	0	2	1	1	4	5	2	1	3	6	2	15	51
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	0	0	1	6	0	2	0	0	3	3	0	1	0	2	0	0	18
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	2	0	0	0	6
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	2	4	2	9	14	11	18	22	22	41	37	59	241
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	5	9	9	19	15	23	23	88
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	2	8	8
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	2	3	2	7	8	8	10	12	10	15	19	27	123
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	1	1	7
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	0	0	6
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	9
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	2	1	1	0	0	1	3	3	6	15	25	38	94	143	376	708
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	7
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
C91-C95 Leucemie	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	5	2	5	6	25
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	8	15	39	70
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	5	8	17	21	62	91	272	481
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	10	11	28	55	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	6	13	22	49	
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELLA A81. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.3 -

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	---tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni	---tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	110.6	103.8 (13.3)	35.7	31.4 (7.2)	1708.5	973 2768.4	1858	529.2 308 851.0 595
C22 T.m.fegato	5-64	3.6	3.2 (2.2)	1.8	1.5 (1.5)	19.7	13 57.5	43	18.7 13 33.8 26
C32 T.m.laringe	5-64	4.8	4.3 (2.6)	.6	.5 (.8)	20.1	13 65.8	48	6.1 4 14.2 12
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	2.4	2.2 (1.8)	.0	.0 (.0)	12.9	8 37.3	28	.0 0 .0 0
C67 T.m.vescica	5-64	22.8	20.2 (5.6)	5.5	4.6 (2.6)	149.2	100 437.9	332	51.1 34 110.7 88
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	1.2	1.0 (1.2)	.0	.0 (.0)	12.1	8 46.9	36	1.1 1 8.7 8
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	4.8	5.2 (3.2)	.6	.6 (.9)	181.3	97 208.6	123	17.2 11 20.5 14
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	19.8	18.0 (5.4)	9.2	7.7 (3.4)	189.3	116 433.5	316	67.3 46 175.5 143
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	9.0	8.1 (3.6)	3.1	2.5 (1.9)	94.2	61 166.0	121	15.9 11 41.8 33
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	62.5	54.8 (8.3)	21.9	16.5 (4.4)	1017.3	548 1294.8	796	351.7 188 445.9 273
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	26.3	24.7 (5.8)	7.7	8.0 (3.3)	624.4	328 756.8	450	230.4 128 288.8 180
-X60-X84 Suicidi	0-75+	18.1	16.2 (4.5)	2.6	2.1 (1.5)	268.8	143 358.1	218	18.2 12 35.3 27
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.4	.2 (.4)	.0	0 0	0	.0 0 .0 0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	11.4	10.0 (3.9)	36.9	30.8 (6.8)	77.5	53 210.2	162	337.3 227 648.2 500
C43-C44 T.m.pelle	5-64	9.0	7.9 (3.5)	8.0	6.6 (3.1)	67.3	46 176.8	137	52.8 36 136.6 109
C50 T.m.mammella	5-64	2.4	2.2 (1.8)	1.2	1.0 (1.1)	10.3	7 33.3	25	2.3 2 14.4 13
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	24.6	20.7 (5.6)	.0	0 0	0	249.7 167 445.2 338
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	1.8	1.5 (1.5)	-	- -	-	25.3 18 36.8 28
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	1.2	1.0 (1.2)	-	- -	-	7.3 5 15.1 12
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	48.7	43.5 (8.4)	19.7	17.5 (5.4)	477.5	303 1021.4	759	236.4 123 460.8 324
-B24 AIDS	5-64	5.4	4.7 (2.7)	.0	.0 (.0)	92.6	63 124.9	93	.0 0 1.2 2
C62 T.m.testicolo	5-64	3.0	2.6 (2.0)	.0	.0 (.0)	62.5	43 78.9	59	.0 0 .0 0
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	2.2	2.0 (1.8)	.0	0 0	0	- - - -
C91-C95 Leucemie	0-14	1.8	2.0 (2.0)	.6	.5 (.8)	74.1	38 88.5	51	6.1 4 13.0 10
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.6	.5 (.9)	.0	.0 (.0)	40.9	21 68.2	44	117.5 52 146.8 78
I10-I15 Ipertensione	5-64	3.0	2.7 (2.0)	1.2	1.0 (1.2)	11.5	8 42.5	32	7.3 5 25.9 22
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	30.0	26.4 (6.4)	11.1	9.5 (3.9)	202.8	137 545.1	422	97.3 57 232.5 177
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.2	1.0 (1.2)	1.2	1.0 (1.1)	7.3	5 21.1	17	2.3 2 12.6 12
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	4.2	3.7 (2.4)	1.8	1.5 (1.4)	31.7	21 101.2	78	6.0 4 28.3 23
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.6	.5 (.8)	.0	.0 (.0)	12.7	9 20.6	17	.0 0 .0 0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 .0 0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 .0 0
K80-K82 Colecit.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 .0 0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 .0 0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	60.6	54.1 (8.6)	39.1	36.4 (7.3)	-	-	-	-
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	64.5	63.9 (10.7)	-	-	-	-
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	2.5	2.3 (1.3)	-	-	-	-

Appendice

TABELLA A82. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 3 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI	FEMMINE		# <75 anni	#
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)				standard. YPLL---	standard. YPLL---		
I GRUPPO: prevenzione primaria												
C00-C15	T.m.prime vie aer-di	5-64	154.7	161.9 (61.6)	15.8	11.9 (14.6)	1657.4	73	3311.0	168	161.4	10 391.3
		5-64	7.4	7.1 (12.5)	.0	.0 (. .)	17.0	1	76.9	4	.0	0 45.4
C22	T.m.fegato	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0 0
C32	T.m.laringe	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	16.2	2	.0	0 0
C33-C34	T.m.trach.bronch.pol	5-64	44.2	47.9 (34.1)	7.9	5.7 (9.8)	237.2	10	770.0	38	146.7	9 227.0
C67	T.m.vescica	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0 0
F10	Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0 0
F11-F19	Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0 0
I60-I69	Dist.circol.encefalo	5-64	36.8	38.5 (30.0)	.0	.0 (. .)	277.7	13	743.2	39	.0	0 52.2
K70-K76	Cirrosi epatica	5-64	7.4	7.1 (12.5)	7.9	6.2 (10.8)	17.0	1	85.0	5	14.7	1 66.6
V01-Y99	Cause esterne mortal	0-75+	87.5	81.5 (36.6)	5.3	2.3 (4.0)	1108.6	48	1619.4	80	.0	0 0
-V01-V99	Incidenti mezzi tras	0-75+	32.8	28.7 (21.0)	5.3	2.3 (4.0)	393.8	18	529.5	28	.0	0 0
-X60-X84	Suicidi	0-75+	27.3	32.3 (25.2)	.0	.0 (. .)	604.1	23	879.2	39	.0	0 0
-X85-Y09	Omicidi	0-75+	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0 0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.												
C18-C21	T.m.colon-retto	5-64	7.4	5.6 (9.8)	31.7	27.1 (23.6)	93.8	6	278.6	18	325.8	17 650.1
C43-C44	T.m.pelle	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	6	278.6	18	.0	0 38.6
C50	T.m.mammella	5-64	.0	.0 (. .)	31.7	27.1 (23.6)	.0	0	.0	0	.0	0 0
C53	T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (. .)	-	-	-	-	.0	0 0
C54	T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (. .)	-	-	-	-	.0	0 0
C55	T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.0	.0 (. .)	-	-	-	-	.0	0 0
III GRUPPO: assist.osp.territ												
A00-B99	Mal.batt.vir.parassi	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0 0
-B24	AIDS	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0 0
C62	T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (. .)	-	- (-)	.0	0	.0	0	-	- -
C81	Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0 0
C91-C95	Leucemie	0-14	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	53.7	3	.0	0 6.8
I10-I19	Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0 0
I10-I15	Ipertensione	5-64	7.4	8.7 (15.2)	.0	.0 (. .)	62.1	3	131.4	6	.0	0 13.6
I20-I25	Mal.ischemiche cuore	5-64	29.5	32.4 (28.2)	23.8	21.5 (21.6)	232.0	10	636.3	34	227.6	11 488.4
J10-J22	Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	45.5	3	.0	0 0
J40-J47	Broncopn.cron.ostrut	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	16.2	2	.0	0 6.8
K25-K28	Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0 0
K35-K38	Appendicite	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0 0
K40-K46	Ernia addominale	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0 0
K80-K82	Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0 0
O00-O99	Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0 0
Screening di popolazione												
C18-C21	T.m.colon-retto	50-74	81.0	74.8 (38.3)	18.1	17.9 (19.4)						
C50	T.m.mammella	50-69	-	- (-)	119.0	110.9 (52.4)						
C53	T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (. .)						

TABELLA A83. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 3 DSB 2

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	standard.	YPLL---	MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)				# <75 anni	# <65 anni	# <75 anni	# <65 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria												
C00-C15	T.m.prime vie aer-di	5-64	91.3	86.5 (22.3)	36.0	32.0 (13.4)	1637.9	281	2566.6	527	510.4	85 801.2
C22	T.m.fegato	5-64	3.9	3.4 (4.2)	.0	.0 (.0)	16.2	3	57.2	13	.0	0 .0
C32	T.m.laringe	5-64	5.8	4.9 (5.0)	.0	.0 (.0)	34.5	8	84.8	20	.0	0 1.9
C33-C34	T.m.trach bronch.pol	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	13.1	3	.0	0 .0
C67	T.m.vescica	5-64	11.7	10.0 (7.1)	10.0	8.3 (6.5)	62.2	13	271.9	66	87.4	18 169.3
F10	Alcoolismo psic.alco	5-64	1.9	1.5 (2.7)	.0	.0 (.0)	18.3	4	29.8	8	.0	0 .0
F11-F19	Farmacodipendenza	5-64	3.9	3.2 (4.0)	.0	.0 (.0)	92.7	20	112.0	27	.0	0 .0
I60-I69	Dist.circol.encefalo	5-64	19.4	17.9 (9.9)	12.0	9.6 (6.8)	262.4	47	512.4	113	91.2	20 206.6
K70-K76	Cirrosi epatica	5-64	.0	.0 (.0)	2.0	1.7 (2.9)	.0	0	4.4	2	28.1	6 40.0
V01-Y99	Cause esterne mortal	0-75+	62.8	56.3 (15.5)	22.3	15.2 (7.9)	1139.4	183	1437.0	265	303.7	42 383.4
-V01-V99	Incidenti mezzi tras	0-75+	24.8	23.6 (10.3)	2.8	3.5 (4.4)	646.7	108	788.2	148	120.6	17 146.7
-X60-X84	Suicidi	0-75+	19.0	17.8 (8.9)	2.8	2.5 (3.1)	362.4	56	463.5	83	15.3	3 41.1
-X85-Y09	Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.												
C18-C21	T.m.colon-retto	5-64	11.7	10.1 (7.2)	38.0	31.2 (12.4)	54.8	12	165.2	41	407.5	86 753.8
C43-C44	T.m.pelle	5-64	5.8	4.9 (5.0)	12.0	9.7 (6.9)	26.3	6	95.3	25	77.6	17 206.1
C50	T.m.mammella	5-64	5.8	5.1 (5.2)	.0	.0 (.0)	28.4	6	69.9	16	.0	0 1.9
C53	T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	20.0	16.7 (9.1)	.0	0	.0	0	248.8	52 430.4
C54	T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	6.0	4.9 (4.9)	-	-	-	-	81.1	18 115.4
C55	T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0 .0
III GRUPPO: assist.osp.territ												
A00-B99	Mal.batt.vir.parassi	5-64	52.5	46.8 (15.8)	20.0	19.0 (10.9)	569.0	108	1159.0	263	348.1	47 614.0
-B24	AIDS	5-64	5.8	5.2 (5.2)	.0	.0 (.0)	118.5	24	154.5	35	.0	0 .0
C62	T.m.testicolo	5-64	3.9	3.4 (4.2)	.0	.0 (.0)	79.9	17	101.6	23	.0	0 .0
C81	Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	.0	0	-	- -
C91-C95	Leucemie	0-14	1.9	2.9 (5.1)	2.0	1.6 (2.8)	131.8	16	146.9	20	19.0	4 31.0
I10-I19	Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	30.4	7	60.1	15	279.6	32 314.7
I10-I15	Ipertensione	5-64	3.9	3.4 (4.2)	.0	.0 (.0)	16.2	3	46.3	11	.0	0 .0
I20-I25	Mal.ischemiche cuore	5-64	33.0	28.8 (12.1)	10.0	7.9 (6.1)	235.4	49	630.0	152	34.2	8 221.3
J10-J22	Mal.respirat.acute	5-64	1.9	1.5 (2.7)	.0	.0 (.0)	18.3	4	29.8	8	.0	0 5.8
J40-J47	Broncopn.cron.ostrut	5-64	1.9	1.5 (2.7)	4.0	3.2 (3.9)	18.3	4	91.1	23	15.3	3 41.1
K25-K28	Ulcer.a peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
K35-K38	Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
K40-K46	Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
K80-K82	Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
O00-O99	Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
Screening di popolazione												
C18-C21	T.m.colon-retto	50-74	55.4	44.9 (13.3)	55.5	53.6 (15.9)						
C50	T.m.mammella	50-69	-	- (-)	53.4	51.5 (17.2)						
C53	T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	7.9	7.3 (4.2)						

Appendice

TABELLA A84. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 3 DSB 3

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI	FEMMINE		# <75 anni	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)				standard. YPLL---	standard. YPLL---		
I GRUPPO: prevenzione primaria												
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	114.4	106.5 (17.3)	38.0	33.2 (9.4)	1758.2	620	2821.0	1163	579.4	213	925.7
C22 T.m.fegato	5-64	3.0	2.5 (2.6)	3.0	2.5 (2.5)	22.1	9	55.9	26	30.4	13	49.1
C32 T.m.laringe	5-64	4.9	4.3 (3.4)	1.0	.8 (1.5)	14.4	6	62.7	28	10.0	4	22.2
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	3.9	3.5 (3.0)	.0	.0 (0.0)	20.8	8	51.3	23	.0	0	0
C67 T.m.vescica	5-64	25.6	22.5 (7.7)	3.0	2.4 (2.4)	188.5	77	492.8	228	18.0	8	62.7
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	1.0	.8 (1.5)	.0	.0 (0.0)	10.0	4	16.4	8	.0	0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	5.9	6.5 (4.7)	1.0	.9 (1.6)	242.6	77	276.4	97	28.5	11	33.8
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	17.8	15.8 (6.5)	9.0	7.5 (4.3)	146.2	57	362.4	164	61.9	26	172.3
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	13.8	12.4 (5.8)	3.0	2.4 (2.4)	155.3	60	262.8	114	9.8	4	39.5
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	59.0	50.8 (10.2)	23.9	18.9 (6.1)	944.1	317	1185.4	451	419.0	147	531.7
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	26.1	24.6 (7.5)	10.5	10.8 (4.9)	637.8	203	765.6	274	311.0	111	392.3
-X60-X84 Suicidi	0-75+	16.4	13.5 (5.1)	2.8	2.1 (1.9)	181.1	63	243.6	97	21.5	8	36.0
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (0.0)	.7	.4 (.7)	.0	0	.0	0	.0	0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.												
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	11.8	10.3 (5.2)	37.0	30.9 (8.8)	84.7	35	221.1	103	301.7	124	591.4
C43-C44 T.m.pelle	5-64	10.9	9.4 (4.9)	7.0	5.8 (3.8)	82.6	34	202.5	94	45.9	19	111.7
C50 T.m.mammella	5-64	1.0	.8 (1.5)	2.0	1.6 (1.9)	2.0	1	18.5	9	3.7	2	22.7
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (0.0)	26.0	22.0 (7.5)	.0	0	.0	0	240.2	98	431.3
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (0.0)	-	-	-	-	.0	0	1
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	2.0	1.6 (2.0)	-	-	-	-	11.8	5	24.7
III GRUPPO: assist.osp.territ												
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	48.3	42.6 (10.6)	19.0	16.3 (6.5)	461.9	183	980.2	449	185.2	66	380.1
-B24 AIDS	5-64	5.9	5.1 (3.6)	.0	.0 (0.0)	93.4	38	128.6	58	.0	0	1.9
C62 T.m.testicolo	5-64	3.0	2.5 (2.6)	.0	.0 (0.0)	63.3	26	79.4	36	.0	0	0
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (0.0)	-	- (-)	.0	0	.0	0	-	-	-
C91-C95 Leucemie	0-14	2.0	1.8 (2.3)	.0	.0 (0.0)	57.6	22	73.7	31	.0	0	4.9
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	1.0	.8 (1.5)	.0	.0 (0.0)	49.5	14	71.8	26	55.6	20	85.4
I10-I15 Ipertensione	5-64	2.0	1.7 (2.1)	2.0	1.6 (2.0)	4.1	2	32.3	15	11.8	5	40.5
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	28.6	24.8 (8.0)	10.0	8.8 (4.9)	185.7	78	496.0	236	112.2	38	204.4
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.0	.8 (1.5)	2.0	1.6 (1.9)	2.0	1	12.8	7	3.7	2	17.8
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	1.0	.8 (1.4)	.0	.0 (0.0)	42.5	17	116.2	53	1.9	1	24.2
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	20.9	9	34.0	17	.0	0	0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0	.0	0	.0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0	.0	0	.0	0	0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0	.0	0	.0	0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (0.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0	.0	0	.0	0	0
Screening di popolazione												
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	60.8	56.1 (11.4)	33.1	29.6 (8.3)							
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	63.9	64.3 (13.8)							
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (0.0)							

TABELLA A85. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.4 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	0	2	5	17	13	15	15	18	15	32	45	90	90	181	265	191	276	1271
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	1	6	7	8	4	3	38
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	6	11	14	6	4	53
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	4	2	1	13
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	4	6	18	37	35	79	71	42	20
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	2	12	18	13	13	69
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	21	24	49	101	106	212	523
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	7	2	10	5	14	20	5	11	81
V01-Y99 Cause esterne mortal	1	0	2	5	15	11	13	12	8	5	8	9	9	8	8	29	13	12	168
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	1	0	2	5	11	7	10	10	5	2	3	5	2	2	5	10	5	6	91
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	2	3	2	1	2	1	4	3	5	5	1	10	4	2	45
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	11	14	24	25	45	22	20	174
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	11	13	22	24	39	21	18	157
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	4	1	1	1	1	13
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	4	4
III GRUPPO: assist.osp.territ	1	0	0	1	0	1	2	3	8	13	21	23	46	79	134	218	167	376	1093
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	3	13	4	14	40
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3
C91-C95 Leucemie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	2	13	9	9	9	51
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	7	14	20	16	23	87
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	1	2	1	5	7	18	15	28	54	80	119	94	194	618
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	3	5	3	13	7	45	80
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	5	8	16	36	34	78	183
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	2	6	17
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	5

TABELLA A86. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.4 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	0	1	0	1	3	1	2	1	3	8	10	9	27	44	98	123	177	470	978
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	5	14	14
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	7	6	8	11	40
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	13	11	14	6	14	68
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	22
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	3	10	14	57	80	134	396	703
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	4	9	5	13	16	55
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	1	0	1	3	1	2	1	0	0	2	0	4	6	10	12	10	20	73
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	2	5	4	2	20
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	1	1	16
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	1	0	1	5	2	9	15	26	17	24	49	60	43	72	324
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	7	7	8	14	28	25	37	129
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	3	0	8	16
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	1	5	1	6	11	17	9	15	27	27	12	23	154
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	3
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4	0	2	2	11
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	1	1	11
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	7	10	12	34	85	173	193	542	1064
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	8	7	16	39
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	0	5	6	7	11	37
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	4	9
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	7	33	28	87
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	7	18	53	84	114	317	606
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	15	14	45
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	17	19	49	98
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1	6	12
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	5
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	11
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Appendice

TABELLA A87. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL n.4 -

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI			FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	----tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni	----tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni	#	
I GRUPPO: prevenzione primaria											
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	113.9	101.1 (10.9)	27.9	23.5 (5.1)	1708.3	1382	2709.8	2651	333.7	277
C22 T.m.fegato	5-64	4.3	3.6 (2.0)	.8	.7 (.7)	33.3	32	78.3	86	3.1	3
C32 T.m.laringe	5-64	5.1	4.2 (2.0)	2.1	1.6 (1.2)	30.0	30	81.8	94	3.7	4
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	.9	.7 (.8)	.0	.0 (.0)	3.4	3	16.1	18	.0	.4
C67 T.m.vescica	5-64	30.3	24.8 (5.1)	4.2	3.3 (1.8)	184.4	174	496.8	564	23.8	25
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	4.7	3.7 (1.9)	.8	.7 (.8)	17.3	18	58.1	69	6.5	7
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (.0)	.4	.3 (.5)	.0	0	2.2	3	.7	1
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	3.0	3.0 (1.9)	.4	.4 (.6)	88.9	73	105.9	96	8.6	8
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	13.2	10.5 (3.2)	9.3	7.3 (2.7)	62.4	63	224.1	267	63.9	65
V01-Y99 Cause esterne mortal	5-64	11.1	9.3 (3.1)	3.4	2.7 (1.6)	112.1	102	199.1	213	32.0	32
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	53.6	49.5 (6.8)	21.5	13.8 (3.1)	1176.5	888	1446.9	1242	191.4	133
-X60-X84 Suicidi	0-75+	29.0	28.6 (5.4)	5.9	4.2 (1.7)	885.8	654	1050.1	873	78.3	58
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	14.4	12.4 (3.2)	4.7	3.9 (1.8)	178.8	146	250.5	236	76.8	48
		.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.											
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	16.2	13.3 (3.7)	32.1	25.9 (5.1)	113.3	112	282.4	319	284.2	280
C43-C44 T.m.pelle	5-64	14.1	11.6 (3.4)	7.2	5.6 (2.3)	86.3	84	238.2	269	35.6	38
C50 T.m.mammella	5-64	2.1	1.7 (1.3)	1.3	1.3 (1.3)	27.0	28	41.8	48	35.3	26
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	21.1	16.9 (4.1)	.0	0	2.2	3	191.1	195
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.4	.3 (.5)	-	-	-	-	4.0	4
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	1.3	1.1 (1.0)	-	-	-	-	15.0	14
		-	- (-)	.8	.7 (.7)	-	-	-	-	3.1	3
III GRUPPO: assist.osp.territ											
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	50.3	41.8 (6.7)	15.6	12.6 (3.5)	455.1	418	1018.0	1123	120.9	119
-B24 AIDS	5-64	2.1	1.8 (1.4)	1.7	1.4 (1.2)	27.1	26	43.9	48	18.6	17
C62 T.m.testicolo	5-64	1.3	1.1 (1.1)	.4	.4 (.6)	23.8	23	31.1	33	8.6	8
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.9	.7 (.8)	-	- (-)	9.7	10	14.5	17	-	-
C91-C95 Leucemie	0-14	2.6	2.4 (4.1)	.0	.0 (.0)	36.2	29	70.5	75	28.6	28
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.5	1	.0	0
I10-I15 Ipertensione	5-64	3.0	2.5 (1.6)	.8	.7 (.8)	26.3	26	68.1	78	4.8	5
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	32.8	27.2 (5.3)	8.4	6.7 (2.6)	270.0	258	637.7	716	61.8	62
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	3.0	2.7 (1.8)	.0	.0 (.0)	42.9	29	74.9	68	.0	0
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	2.7	3.9 (2.0)	.4	.3 (.5)	42.1	39	97.6	109	.7	1
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.4	.3 (.5)	.4	.3 (.5)	.8	1	5.4	8	4.0	4
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	2.2	3	.0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
Screening di popolazione											
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	73.2	69.4 (8.1)	33.5	30.5 (5.3)						
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	57.5	57.5 (8.3)						
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.5	.5 (.5)						

TABELLA A88. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 4 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)			standard. YPLL---	# <65 anni	# <75 anni	standard. YPLL---
I GRUPPO:prevenzione primaria											
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	127.0	110.6 (15.0)	24.6	20.4 (6.2)	1746.0	823	2834.2	1606	274.2	138 559.8 368
C22 T.m.fegato	5-64	4.5	3.6 (2.6)	.7	.5 (.9)	26.3	15	75.0	48	3.9	3 15.9 12
C32 T.m.laringe	5-64	7.4	6.0 (3.3)	.0	.0 (.0)	43.5	25	114.7	74	.0	0 4.9 4
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	.7	.6 (1.1)	.0	.0 (.0)	4.4	3	22.2	14	.0	0 .7 1
C67 T.m.vescica	5-64	32.7	26.5 (7.0)	5.1	3.9 (2.5)	198.5	108	525.7	340	25.2	16 90.9 66
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.7	.5 (.9)	.0	0	3.9	3	1.3	1 5.7 4
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	3.7	3.5 (2.8)	.0	.0 (.0)	98.9	49	120.1	66	.0	0 .0 0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	16.3	12.6 (4.7)	7.2	5.8 (3.2)	69.2	40	240.7	163	60.2	35 152.9 115
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	9.7	8.1 (4.0)	4.3	3.4 (2.4)	97.4	46	183.2	106	33.0	20 75.1 53
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	57.3	52.4 (9.3)	20.4	12.8 (3.9)	1186.6	524	1472.0	740	139.6	58 186.1 94
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	30.3	29.3 (7.2)	6.1	3.9 (2.0)	862.9	372	1035.7	504	26.4	15 39.2 26
-X60-X84 Suicidi	0-75+	15.7	13.2 (4.4)	5.1	4.1 (2.4)	146.1	73	217.0	125	71.6	28 94.5 46
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0 0
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.											
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	17.1	13.9 (5.1)	36.9	29.0 (7.0)	137.5	78	295.5	189	320.5	193 606.1 419
C43-C44 T.m.pelle	5-64	14.1	11.5 (4.6)	8.0	6.0 (3.1)	92.2	51	233.7	149	35.9	23 102.9 75
C50 T.m.mammella	5-64	3.0	2.4 (2.1)	1.4	1.2 (1.5)	45.3	27	61.8	40	19.8	12 29.6 20
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-.-	(-)	.7	.6 (1.0)	-.-	-.-	-.-	-.-	6.8	4 11.2 8
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-.-	(-)	1.4	1.1 (1.4)	-.-	-.-	-.-	10.7	7	20.7 15
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-.-	(-)	.7	.5 (.9)	-.-	-.-	-.-	3.9	3	13.1 10
III GRUPPO:assist.osp.territ											
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	47.5	39.5 (8.7)	10.1	8.2 (3.8)	478.9	244	1004.9	619	90.1	50 240.5 175
-B24 AIDS	5-64	.7	.6 (1.1)	1.4	1.2 (1.5)	4.4	3	9.3	6	16.5	8 26.3 16
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	.7	.7 (1.2)	.0	0	.0	0	15.2	8 19.9 11
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	3.0	2.4 (2.1)	1.4	1.2 (1.5)	45.3	27	61.8	40	19.8	12 29.6 20
C91-C95 Leucemie	0-14	4.6	4.1 (7.2)	.0	.0 (.0)	53.6	24	83.0	48	30.2	17 50.0 33
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0 0
I10-I15 Ipertensione	5-64	5.2	4.4 (2.9)	.7	.5 (.9)	46.2	26	97.2	62	3.9	3 22.2 18
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	31.2	25.6 (6.9)	4.3	3.5 (2.5)	261.3	143	607.7	389	32.7	18 98.5 75
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.5	1.8 (2.3)	.0	.0 (.0)	57.4	18	79.5	33	.0	0 11.9 9
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	4.5	3.7 (2.7)	.0	.0 (.0)	39.5	20	97.3	61	.0	0 15.4 13
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.7	.5 (1.0)	.7	.6 (1.0)	1.3	1	7.8	6	6.8	4 11.2 8
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0 0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 4.2 3
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	3.9	3	.0 0 .0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0 0
Screening di popolazione											
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	65.4	62.6 (10.2)	31.8	29.5 (7.0)	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	62.1	62.3 (11.3)	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.9	.9 (.8)	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-

Appendice

TABELLA A89. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 4 DSB 2

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	----tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni	----tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	97.0	89.7 (21.5)	21.8	19.1 (9.8)	1871.7	356	2754.3	628
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	3.6	3.2 (4.0)	1.8	1.4 (2.4)	46.7	10	83.3	21
C22 T.m.fegato	5-64	1.8	1.5 (2.6)	5.4	4.2 (4.2)	18.0	4	41.1	13
C32 T.m.laringe	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	28.7	24.5 (10.7)	1.8	1.5 (2.6)	249.2	53	537.2	140
C67 T.m.vescica	5-64	3.6	2.9 (3.6)	.0	.0 (.0)	21.3	5	56.4	17
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	3.6	3.8 (4.9)	.0	.0 (.0)	134.4	23	155.1	30
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	9.0	7.4 (5.8)	3.6	2.9 (3.6)	68.1	16	233.4	66
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	9.0	7.4 (5.8)	.0	.0 (.0)	102.7	24	163.0	43
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	44.1	42.8 (13.4)	24.1	16.6 (7.3)	1231.1	220	1484.5	299
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	24.1	26.0 (10.9)	7.6	7.2 (5.5)	1021.5	179	1183.7	232
-X60-X84 Suicidi	0-75+	12.0	10.2 (6.1)	6.3	4.5 (3.6)	169.9	32	225.9	48
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	12.6	10.4 (6.8)	21.8	19.0 (9.6)	82.4	19	212.3	58
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	10.8	9.0 (6.4)	5.4	4.5 (4.5)	79.0	18	187.9	51
C43-C44 T.m.pelle	5-64	1.8	1.4 (2.5)	1.8	2.5 (4.3)	3.4	1	15.3	4
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	14.5	12.0 (7.3)	.0	0	9.1	3
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	.0
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	.0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	.0
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	57.5	47.9 (14.7)	18.1	14.9 (8.1)	452.3	103	1066.1	287
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	5.4	4.6 (4.7)	.0	.0 (.0)	98.9	23	135.5	35
-B24 AIDS	5-64	5.4	4.6 (4.7)	.0	.0 (.0)	98.9	23	129.6	33
C62 T.m.testicolo	5-64	1.8	1.4 (2.5)	-	- (-)	3.4	1	15.3	4
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	1.8	1.5 (2.7)	.0	0	.0	0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	3.4	1	35.4	10
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
I10-I15 Ipertensione	5-64	.0	.0 (.0)	1.8	1.5 (2.7)	.0	0	16.9	6
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	34.1	28.5 (11.4)	9.1	7.4 (5.8)	246.8	56	662.7	178
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	7.2	5.9 (5.2)	.0	.0 (.0)	43.1	10	94.0	25
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	7.2	5.9 (5.1)	1.8	1.4 (2.4)	56.9	13	106.0	28
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
K80-K82 Colecit.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	57.7	51.5 (14.1)	39.1	33.1 (11.2)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	39.4	39.5 (14.2)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)				

Appendice

TABELLA A90. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2000-2002.
ASL 4 DSB 3

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	# <65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	#	
I GRUPPO:prevenzione primaria	5-64	95.1	84.0 (23.0)	45.8	38.3 (15.2)	1372.0	203	2244.2	417	496.8	77	899.1	182
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	4.5	3.7 (4.6)	.0	.0 (.0)	34.7	7	77.3	17	.0	0	.0	0
C22 T.m.fegato	5-64	2.3	1.7 (3.1)	4.6	3.3 (4.1)	4.2	1	32.6	8	7.8	2	48.6	13
C32 T.m.laringe	5-64	2.3	1.7 (3.1)	.0	.0 (.0)	4.2	1	19.0	4	.0	0	.0	0
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	24.9	19.5 (10.2)	4.6	4.0 (4.9)	62.1	13	359.2	84	28.5	5	94.5	22
C67 T.m.vescica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	2.3	1	.0	0	.0	0
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (.0)	2.3	2.1 (3.6)	.0	0	.0	0	43.6	8	57.2	11
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	9.1	7.0 (6.1)	22.9	17.5 (9.6)	32.7	7	155.7	38	121.0	23	318.4	76
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	18.1	14.4 (8.9)	4.6	3.9 (4.8)	166.2	32	288.2	63	65.5	12	96.6	20
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	54.7	48.2 (15.4)	21.6	13.3 (7.4)	1067.8	144	1309.6	203	230.4	28	283.8	41
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	31.5	28.9 (12.3)	3.1	1.5 (1.9)	777.6	103	916.1	138	.0	0	.0	0
-X60-X84 Suicidi	0-75+	13.3	12.8 (8.1)	1.5	2.8 (4.9)	290.2	41	382.2	63	158.2	16	173.8	19
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.	5-64	18.1	15.0 (9.2)	29.8	24.7 (11.9)	80.8	15	330.3	73	232.6	43	494.0	108
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	18.1	15.0 (9.2)	6.9	5.9 (5.9)	80.8	15	316.8	69	50.4	9	118.8	26
C43-C44 T.m.pelle	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	13.5	3	.0	0	.0	0
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	18.3	15.1 (9.3)	.0	0	.0	0	134.7	25	296.6	65
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0	.0	0
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	2.3	2.1 (3.6)	-	-	-	-	43.6	8	61.0	13
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	2.3	1.7 (2.9)	-	-	-	-	3.9	1	17.7	4
III GRUPPO:assist.osp.territ	5-64	49.8	41.2 (15.3)	29.8	24.4 (11.8)	380.0	70	988.9	218	259.8	48	569.5	133
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	2.3	1.7 (3.1)	4.6	3.7 (4.6)	4.2	1	30.2	7	47.5	8	76.8	16
-B24 AIDS	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	.0	0	-	-	-	-
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	11.2	3	.0	0	.0	0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	23.0	4	76.0	17	36.1	7	67.8	14
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	2.3	1	.0	0	.0	0
I10-I15 Ipertensione	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	42.9	11	.0	0	13.2	4
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	36.2	30.1 (13.1)	20.6	16.8 (9.7)	317.8	58	690.8	148	176.2	33	406.0	96
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	2.3	1.7 (3.1)	.0	.0 (.0)	4.2	1	43.8	10	.0	0	1.9	1
J40-J47 Broncopn.cron.ostrutt	5-64	2.3	1.8 (3.2)	.0	.0 (.0)	30.8	6	86.8	20	.0	0	1.9	1
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	4.6	2	.0	0	1.9	1
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K80-K82 Colenist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
Screening di popolazione													
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	114.7	111.1 (23.6)	32.3	31.6 (12.8)								
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	65.0	65.1 (20.4)								
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)								

Appendice

TABELLA A91. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
UMBRIA

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE	
I GRUPPO: prevenzione primaria	0	0	2	15	26	26	33	39	39	63	64	115	184	238	368	556	530	586	2884	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	7	17	14	19	17	12	8	104	
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	12	23	30	39	30	15	162	
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	5	6	9	12	7	1	50	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	16	21	40	73	96	139	171	107	47	719
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	20	20	48	40	29	174	
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	2	5	10	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	10	10	27	41	89	198	263	417	1068	
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	7	6	11	15	23	24	26	19	11	152
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	0	2	15	24	21	19	28	19	28	13	25	26	15	38	45	52	57	427	
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	1	11	19	14	13	19	6	12	6	7	8	7	14	9	10	11	167	
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	3	5	4	2	4	7	8	4	7	9	5	13	18	18	11	118	
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	1	0	0	1	0	0	0	9	
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	1	2	0	4	2	10	10	16	33	57	65	96	69	56	421	
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	1	1	0	4	2	5	8	14	29	54	57	89	63	49	376	
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	2	2	2	3	6	7	5	7	40	
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	5	
III GRUPPO: assist.osp.territ	2	0	1	0	0	2	2	7	24	25	46	75	107	197	293	466	625	839	2711	
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	2	0	0	0	0	0	1	2	5	4	4	5	5	12	16	19	24	16	115	
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	10	
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	5	
C91-C95 Leucemie	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	4	2	9	18	16	21	29	15	118	
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	2	1	9	
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	9	15	23	53	50	92	258	
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	2	1	2	15	15	31	53	68	119	179	256	330	466	1537	
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	8	14	14	21	41	68	174	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	15	36	85	134	162	440	
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	4	7	8	27	
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	8	
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	4	6	18

TABELLA A92. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
UMBRIA

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE	
I GRUPPO: prevenzione primaria	4	1	3	4	6	4	8	11	14	8	28	45	46	78	141	275	467	1039	2182	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	3	3	3	4	6	25	
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	1	5	8	15	26	24	16	100	
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	5	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	12	14	14	25	31	30	36	14	180
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	7	38	
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	1	1	0	0	0	2	2	2	3	13	14	18	62	168	347	878	1511	
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	3	3	4	16	8	22	9	7	78	
V01-Y99 Cause esterne mortal	4	1	1	3	5	3	5	8	5	4	4	14	5	5	17	22	39	96	241	
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	1	1	1	3	4	2	2	4	1	2	2	6	1	3	1	7	5	4	50	
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	1	0	2	2	4	1	0	3	2	1	6	2	2	2	28	
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	9	
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	6	5	15	30	35	43	53	70	79	113	132	142	723	
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	9	7	13	18	32	65	50	77	287	
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	2	4	1	4	7	8	34	34	
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	5	3	8	14	18	30	33	38	35	32	54	45	315	
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	2	1	2	3	12	
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	3	0	1	3	0	12	
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	2	4	6	9	10	16	9	63	
III GRUPPO: assist.osp.territ	2	0	1	0	1	2	2	5	6	13	16	21	49	72	143	293	526	1431	2583	
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	2	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	3	4	9	13	25	36	36	137	
-B24 AIDS	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
C91-C95 Leucemie	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	2	1	4	7	3	14	17	21	14	88
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	5	11
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	4	7	11	19	34	72	254	399
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	9	10	29	35	77	164	307	834	1474
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	5	9	14	34	122	189	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	7	8	32	42	135	231	
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	4	18
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	9
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	13
000-099 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

TABELLA A93. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
UMBRIA

Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-14	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75+	0-74	0-75+
I GRUPPO: prevenzione primaria	1.9	39.0	57.1	46.0	51.7	58.4	63.0	113.0	117.6	217.3	364.9	495.0	852.0	2263.9	162.6	351.9
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.2	7.2	7.4	13.2	33.7	29.1	43.9	50.1	9.0	12.7
C22 T.m.fegato	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.0	23.8	47.8	69.4	113.7	10.5	19.8
C32 T.m.laringe	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.5	13.2	9.9	12.4	20.8	27.0	4.0	6.1
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	.0	.0	.0	.0	3.1	3.0	8.1	28.7	38.6	75.6	144.8	199.6	321.8	440.0	52.8	87.7
C67 T.m.vescica	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.3	17.8	41.5	46.3	158.4	7.6	21.2
F10 Alcoolismo psic.alco	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3	.0	.1
F11-F19 Farmacodipendenza	.0	.0	4.4	8.8	15.7	9.0	3.2	1.8	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	3.6	3.3
I60-I69 Dist.circol.encefalo	.0	.0	.0	.0	.0	1.5	8.1	12.6	18.4	18.9	53.5	85.2	206.0	1188.8	25.5	130.3
K70-K76 Cirrosi epatica	.0	.0	.0	.0	3.1	3.0	9.7	12.6	11.0	20.7	29.7	47.8	55.5	75.8	12.9	18.5
V01-Y99 Cause esterne mortal	1.9	39.0	52.7	37.2	29.8	41.9	30.7	50.2	23.9	47.2	51.5	31.1	87.9	208.5	36.6	52.1
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	.9	28.6	41.7	24.8	20.4	28.4	9.7	21.5	11.0	13.2	15.8	14.5	32.4	40.6	18.4	20.4
-X60-X84 Suicidi	.0	7.8	11.0	7.1	3.1	6.0	11.3	14.3	7.4	13.2	17.8	10.3	30.0	63.6	9.5	14.4
-X85-Y09 Omicidi	.0	.0	.0	1.8	1.6	1.5	.0	5.4	1.8	1.8	.0	.0	2.3	.0	1.2	1.1
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	.0	.0	2.2	3.5	.0	6.0	3.2	17.9	18.4	30.2	65.4	118.5	150.4	299.2	26.8	51.4
C18-C21 T.m.colon-retto	.0	.0	2.2	1.8	.0	6.0	3.2	9.0	14.7	26.4	57.5	112.3	131.9	272.1	23.5	45.9
C43-C44 T.m.pelle	.0	.0	.0	1.8	.0	.0	.0	9.0	3.7	3.7	3.9	6.2	13.8	25.7	2.8	4.9
C50 T.m.mammella	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.9	.0	4.6	1.3	.5	.6
III GRUPPO: assist.osp.territori	2.8	.0	.0	3.5	3.1	10.5	38.8	44.8	84.5	141.7	212.2	409.7	678.3	2613.3	104.7	330.8
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	1.9	.0	.0	.0	1.6	3.0	8.1	7.2	7.4	9.4	9.9	24.9	37.0	79.8	7.5	14.0
-B24 AIDS	.0	.0	.0	.0	.0	1.5	4.8	5.4	1.8	1.8	1.9	.0	.0	.0	1.3	1.2
C62 T.m.testicolo	.0	.0	.0	.0	.0	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.2
C81 Malattia di Hodgkin	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	1.9	.0	2.3	2.7	.4	.6
C91-C95 Leucemie	.9	.0	.0	.0	.0	1.5	3.2	.0	7.4	3.7	17.8	37.4	37.0	88.0	7.1	14.4
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.0	4.1	.0	8.1	.4	1.1
I10-I15 Ipertensione	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.2	5.4	9.2	11.3	17.8	31.1	53.2	264.0	8.4	31.5
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	.0	.0	.0	3.5	1.6	3.0	24.2	26.9	57.0	100.1	134.8	247.5	414.4	1424.4	65.0	187.6
J10-J22 Mal.respirat.acute	.0	.0	.0	.0	.0	1.5	.0	5.4	3.7	3.7	15.8	29.1	32.4	176.0	5.9	21.2
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.6	9.9	31.1	83.3	515.8	7.9	53.7
K25-K28 Ulcera peptica	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.7	1.9	4.1	6.9	25.7	1.1	3.3
K35-K38 Appendicite	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
K40-K46 Ernia addominale	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.3	9.4	.1	1.0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	.0	6.9	18.9	.5	2.2

TABELLA A94. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
UMBRIA

Tassi annui di mortalita' per 100.000 residenti, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-14	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75+	0-74	0-75+
I GRUPPO: prevenzione primaria	7.9	11.0	14.0	7.2	12.7	16.8	22.5	14.2	50.1	80.5	84.7	141.8	264.3	1490.6	53.0	248.9
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.2	.0	3.6	.0	3.6	5.4	5.6	10.9	1.6	2.9
C22 T.m.fegato	.0	.0	.0	1.8	.0	.0	1.6	.0	5.4	1.7	9.2	14.5	28.1	55.2	4.5	11.4
C32 T.m.laringe	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	1.8	1.8	1.7	.4	.6	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	.0	.0	.0	.0	1.6	1.5	.0	3.5	21.5	25.0	25.7	45.4	58.1	67.0	13.2	20.5
C67 T.m.vescica	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.6	5.6	26.8	.8	4.3	
F10 Alcoolismo psic.alco	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1
F11-F19 Farmacodipendenza	.0	.0	2.3	.0	.0	.0	.0	1.6	.0	.0	.0	.0	1.8	.0	.4	.3
I60-I69 Dist.circol.encefalo	1.0	2.7	.0	.0	3.0	3.2	3.5	5.4	23.2	25.7	32.7	116.2	1165.8	15.6	172.4	
K70-K76 Cirrosi epatica	1.0	.0	.0	.0	3.2	.0	4.8	.0	5.4	5.3	7.3	29.0	14.9	31.8	5.3	8.9
V01-Y99 Cause esterne mortal	5.9	8.2	11.7	5.4	8.0	12.2	8.0	7.1	7.2	25.0	9.2	9.0	31.8	131.4	11.1	27.5
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	3.0	8.2	9.4	3.6	3.2	6.1	1.6	3.5	3.6	10.7	1.8	5.4	1.8	13.4	4.5	5.7
-X60-X84 Suicidi	.0	.0	2.3	.0	3.2	3.0	6.4	1.8	.0	5.3	3.6	1.8	11.2	5.0	2.9	3.2
-X85-Y09 Omicidi	.0	.0	.0	1.8	1.6	3.0	.0	1.8	3.6	.0	.0	.0	1.7	.9	1.0	
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	.0	.0	.0	.0	9.6	7.6	24.1	53.2	62.7	76.9	97.6	127.3	148.0	323.9	44.4	82.5
C18-C21 T.m.colon-retto	.0	.0	.0	.0	.0	1.5	6.4	19.5	16.1	12.5	23.9	32.7	59.9	160.7	12.5	32.7
C43-C44 T.m.pelle	.0	.0	.0	.0	.0	1.5	1.6	3.5	1.8	5.3	3.6	7.2	1.8	15.9	2.0	3.9
C50 T.m.mammella	.0	.0	.0	.0	8.0	4.6	12.8	24.8	32.2	53.6	60.7	69.1	65.6	109.6	24.3	35.9
C53 T.m.collo dell'utero	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6	.0	3.6	.0	.0	1.8	3.7	5.0	.8	1.4
C54 T.m.corpo dell'utero	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.4	1.7	1.8	5.4	.0	3.3	1.1	1.4
C55 T.m.utero n.s.	.0	.0	.0	.0	1.6	.0	1.6	5.3	3.6	3.5	7.3	10.9	16.8	29.3	3.7	7.2
III GRUPPO: assist.osp.territori	3.0	.0	2.3	3.6	3.2	7.6	9.6	23.1	28.7	37.5	90.2	130.9	268.0	1883.1	44.0	294.7
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	2.0	.0	.0	.0	3.2	1.5	3.2	3.5	3.6	5.3	7.3	16.3	24.3	81.2	5.3	15.6
-B24 AIDS	1.0	.0	.0	.0	3.2	1.5	1.6	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.8
C81 Malattia di Hodgkin	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
C91-C95 Leucemie	1.0	.0	.0	1.8	.0	4.6	.0	3.5	1.8	7.1	12.8	5.4	26.2	43.5	4.8	10.0
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.0	3.7	6.7	.4	1.3
I10-I15 Ipertensione	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6	3.5	1.8	1.7	7.3	20.0	35.6	301.3	5.2	45.5
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	.0	.0	1.8	.0	.0	3.2	10.6	16.1	17.8	53.4	63.6	144.3	1092.2	22.3	168.2	
J10-J22 Mal.respirat.acute	.0	.0	2.3	.0	.0	1.6	1.8	.0	3.5	.0	9.0	16.8	142.3	.2	21.6	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.6	1.7	7.3	12.7	14.9	174.9	2.9	26.4
K25-K28 Ulcera peptica	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	20.9	.4	3.2
K35-K38 Appendicite	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7	.0	.2
K40-K46 Ernia addominale	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.5	.0	1.0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	10.0	.1	1.5
000-099 Gravid.parto puerper	.0	.0	.0	.0	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1

Appendice

TABELLA A95. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
UMBRIA

Tassi annui standardizzati (pop. 1991) di mortalità per 100.000 residenti, per causa.

CAUSA	popolazione	MASCHI						FEMMINE					
		TUTTE LE ETA'			0-74			TUTTE LE ETA'			0-74		
		----tassi standardizzati----	Umbra (E.S.)	Italiana Mond.	tassi standardizzati	Umbra	Italiana Mond.	----tassi standardizzati----	Umbra (E.S.)	Italiana Mond.	tassi standardizzati	Umbra	Italiana Mond.
I GRUPPO: prevenzione primaria		313.7 (8.3)	280.8	138.4	156.2	135.9	92.3	138.6 (4.5)	126.9	56.8	46.2	40.2	28.4
C00-C15 T.m.prime vie aer-di		11.8 (1.7)	10.3	5.6	8.7	7.4	4.7	2.1 (.6)	1.8	1.0	1.4	1.2	.8
C22 T.m. fegato		17.9 (2.0)	15.3	7.1	10.1	8.3	4.9	7.7 (1.1)	6.6	3.0	3.8	3.2	2.0
C32 T.m.laringe		5.7 (1.1)	4.9	2.5	3.9	3.3	2.0	.5 (.3)	.4	.2	.3	.3	.2
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol		80.3 (4.3)	68.8	34.4	50.7	42.3	26.3	15.8 (1.7)	13.6	7.3	11.6	9.8	6.2
C67 T.m.vescica		18.8 (2.0)	16.4	6.7	7.4	6.1	3.6	2.2 (.5)	2.0	.8	.7	.5	.3
F10 Alcoolismo psic.alco		.1 (.1)	.1	.0	.0	.0	.0	.1 (.2)	.1	.1	.1	.1	.1
F11-F19 Farmacodipendenza		3.1 (.9)	3.3	2.9	3.4	3.5	3.0	.4 (.3)	.4	.3	.4	.4	.3
I60-I69 Dist.circol.encefalo		110.0 (4.8)	99.9	38.1	23.8	19.6	12.1	84.9 (3.2)	78.7	29.3	12.7	10.6	6.8
K70-K76 Cirrosi epatica		17.2 (2.0)	15.0	8.3	12.4	10.6	7.0	7.0 (1.2)	6.1	3.4	4.8	4.1	2.7
V01-Y99 Cause esterne mortal		48.7 (3.4)	46.8	32.6	35.9	34.9	28.8	17.9 (1.8)	17.1	11.4	10.4	10.0	9.0
-V01-V99 Incidenti mezzi tras		20.0 (2.2)	20.1	16.6	18.4	18.6	16.1	5.3 (1.1)	5.3	4.7	4.6	4.7	4.5
-X60-X84 Suicidi		13.4 (1.8)	12.5	8.0	9.3	8.8	6.9	2.7 (.7)	2.5	1.8	2.5	2.3	1.7
-X85-Y09 Omicidi		1.0 (.5)	1.0	.9	1.1	1.1	.9	1.0 (.5)	.9	.7	.9	.9	.7
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.		46.5 (3.2)	40.4	19.5	25.9	21.7	13.7	59.5 (3.3)	52.8	28.9	39.5	34.3	23.0
C18-C21 T.m.colon-retto		41.6 (3.1)	36.0	17.1	22.7	19.0	11.7	21.5 (1.9)	19.0	9.3	10.8	9.3	6.2
C43-C44 T.m.pelle		4.4 (1.0)	3.9	2.2	2.7	2.3	1.7	2.8 (.7)	2.5	1.4	1.8	1.6	1.1
C50 T.m.mammella		.6 (.4)	.5	.3	.5	.4	.3	28.0 (2.3)	24.9	14.7	21.9	19.2	12.8
C53 T.m.collo dell'utero		- (-)	-	-	-	-	-	1.0 (.4)	.9	.5	.7	.6	.4
C54 T.m.corpo dell'utero		- (-)	-	-	-	-	-	1.2 (.5)	1.1	.6	1.0	.9	.6
C55 T.m.utero n.s.		- (-)	-	-	-	-	-	5.1 (1.0)	4.5	2.3	3.2	2.7	1.8
III GRUPPO: assist.osp.territ		286.1 (7.8)	256.6	108.0	99.7	83.2	52.3	152.6 (4.5)	140.3	56.7	37.0	31.0	20.3
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi		12.6 (1.7)	11.2	6.1	7.1	6.2	4.6	10.0 (1.3)	8.9	4.6	4.6	4.0	3.1
-B24 AIDS		1.2 (.5)	1.1	1.0	1.2	1.2	1.0	.8 (.4)	.8	.9	.9	.9	.9
C62 T.m.testicolo		.2 (.2)	.2	.1	.2	.2	.1	- (-)	-	-	-	-	-
C81 Malattie di Hodgkin		.6 (.4)	.5	.2	.4	.3	.2	.0 (.1)	.0	.0	.0	.0	.0
C91-C95 Leucemie		13.1 (1.7)	11.4	5.4	7.0	5.8	3.7	6.9 (1.1)	6.1	3.3	4.0	3.5	2.5
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro		1.0 (.5)	.9	.4	.4	.4	.2	.7 (.3)	.6	.3	.3	.2	.2
I10-I15 Ipertensione		27.0 (2.4)	24.4	10.0	8.1	6.7	4.2	22.2 (1.7)	20.7	8.0	4.2	3.5	2.1
I20-I25 Mal.ischemiche cuore		163.0 (5.9)	146.0	62.7	62.0	51.8	32.2	85.7 (3.3)	78.9	30.7	18.6	15.5	9.6
J10-J22 Mal.respirat.acute		18.2 (2.0)	16.6	6.8	5.7	4.8	3.0	10.5 (1.1)	9.9	3.9	2.1	1.8	1.2
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut		45.0 (3.0)	40.7	14.3	7.2	5.7	3.3	13.4 (1.3)	12.3	4.7	2.5	2.1	1.3
K25-K28 Ulcera peptica		2.9 (.8)	2.6	1.0	1.0	.8	.5	1.6 (.5)	1.5	.6	.4	.3	.2
K35-K38 Appendicite		.0 (.0)	.0	.0	.0	.0	.0	.1 (.1)	.1	.0	.0	.0	.0
K40-K46 Ernia addominale		.8 (.4)	.7	.3	.1	.1	.0	.5 (.2)	.4	.1	.0	.0	.0
K80-K82 Colecist.acuta e cro		1.8 (.6)	1.6	.6	.5	.4	.2	.7 (.3)	.7	.2	.1	.1	.0
000-099 Gravid.parto puerper		.0 (.0)	.0	.0	.0	.0	.0	.1 (.1)	.1	.1	.1	.1	.1

TABELLA A96. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
UMBRIA

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI				FEMMINE			
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	# <75 anni	YPLL--	#	<65 anni	# <75 anni	YPLL--	#
I GRUPPO:prevenzione primaria	5-64	98.0	90.2 (5.2)	29.0	25.8 (2.7)	1397.3	4573	2326.7	8955	448.9	1440	718.0	2819
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	5.5	4.8 (1.1)	1.0	.8 (.4)	34.6	130	89.1	376	9.9	38	19.0	83
C22 T.m.fegato	5-64	4.0	3.6 (1.0)	1.8	1.6 (.6)	20.0	74	75.3	323	17.1	59	37.5	163
C32 T.m.laringe	5-64	2.4	2.1 (.7)	.2	.1 (.1)	13.9	51	38.1	160	.3	1	2.4	11
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	25.7	22.6 (2.5)	7.2	6.0 (1.2)	167.0	629	459.0	1958	50.1	193	121.4	545
C67 T.m.vescica	5-64	2.7	2.4 (.8)	.2	.1 (.1)	12.5	46	54.0	231	.3	1	3.5	18
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.2	.1 (.2)	.0	0	0	0	1.7	6	2.8	11
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	4.4	4.1 (1.1)	.3	.4 (.3)	122.4	419	145.9	554	12.3	33	14.5	44
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	9.7	8.5 (1.5)	6.2	5.3 (1.2)	70.3	265	191.7	830	61.0	203	125.2	538
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	7.9	6.9 (1.3)	2.6	2.3 (.8)	75.2	286	152.7	648	37.4	128	67.2	278
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	52.1	46.8 (3.3)	27.5	17.1 (1.7)	881.4	2673	1120.6	3876	258.7	780	324.5	1130
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	20.4	20.1 (2.2)	5.7	5.3 (1.1)	572.2	1673	693.8	2296	156.4	433	188.1	595
-X60-X84 Suicidi	0-75+	14.4	12.5 (1.6)	3.2	2.5 (.7)	180.4	551	241.7	851	42.3	149	58.4	235
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	1.1	1.0 (.4)	1.0	.9 (.4)	23.5	85	31.2	126	23.2	84	29.7	119
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.	5-64	12.6	11.2 (1.7)	30.4	25.5 (2.6)	107.5	388	257.2	1073	270.4	1044	530.7	2340
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	10.3	9.2 (1.6)	7.3	6.1 (1.2)	83.0	300	213.5	894	65.5	254	131.2	586
C43-C44 T.m.pelle	5-64	1.9	1.7 (.7)	1.6	1.3 (.6)	23.8	85	40.2	164	15.9	63	29.2	129
C50 T.m.mammella	5-64	.3	.3 (.2)	18.1	15.1 (2.0)	.7	3	3.4	15	155.8	601	305.8	1343
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.5	.4 (.3)	-	-	-	-	6.3	24	10.5	45
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.8	.7 (.4)	-	-	-	-	6.4	24	14.1	60
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	2.1	1.8 (.6)	-	-	-	-	20.6	79	40.0	178
III GRUPPO:assist.osp.territ	5-64	46.7	41.2 (3.4)	18.9	16.0 (2.1)	392.4	1446	946.8	4006	188.3	670	390.3	1709
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	4.2	3.6 (1.0)	2.6	2.2 (.7)	68.3	248	110.0	453	50.9	178	77.1	318
-B24 AIDS	5-64	1.6	1.4 (.6)	1.0	.8 (.4)	22.0	85	31.7	135	29.5	104	35.4	139
C62 T.m.testicolo	5-64	.2	.1 (.1)	-	- (-)	3.3	14	4.2	20	-	-	-	-
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.3	.3 (.2)	.0	.0 (.0)	1.3	5	3.8	16	.0	0	.0	0
C91-C95 Leucemie	0-14	.9	1.0 (1.4)	1.0	1.1 (1.5)	31.1	106	71.1	289	39.2	134	63.0	258
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.2	.1 (.1)	.2	.1 (.1)	1.0	4	3.8	16	.3	1	1.8	9
I10-I15 Ipertensione	5-64	4.0	3.6 (1.0)	1.5	1.2 (.5)	30.4	114	76.1	324	11.3	44	32.4	154
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	30.2	26.7 (2.7)	9.3	7.8 (1.4)	231.6	859	581.0	2464	59.6	224	160.6	736
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	2.6	2.3 (.8)	.8	.8 (.5)	18.2	70	51.1	220	16.4	49	26.9	104
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	1.3	1.1 (.5)	1.1	1.0 (.5)	4.7	18	34.7	159	5.6	21	20.0	93
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.5	.4 (.3)	.2	.1 (.2)	2.3	9	8.1	35	1.7	6	4.3	19
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.2	1	.0	0	.0	0
K80-K82 Coleist.acuta e cro	5-64	.2	.1 (.2)	.0	.0 (.0)	.3	1	2.1	10	.0	0	.2	1
OO0-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.2	.2 (.2)	.0	0	.0	0	3.3	14	4.1	19
Screening di popolazione													
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	65.1	60.5 (4.8)	28.8	25.8 (3.1)								
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	53.8	53.0 (5.0)								
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.6	.6 (.3)								

Appendice

TABELLA A97. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.1 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	0	0	1	5	4	7	4	5	7	14	14	20	38	47	51	84	75	89	465
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	9	3	2	5	5	2	32
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	11	5	5	2	34
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	7
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	10	11	18	23	15	4	91
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	6	4	5	21
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	5	10	9	31	35	65	161
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	6	9	3	6	5	2	38
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	0	1	5	4	6	4	5	2	8	3	8	4	3	6	7	6	7	79
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	1	3	2	4	3	4	0	4	1	2	1	2	4	2	2	1	36
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	2	2	1	0	0	1	2	0	2	1	1	1	4	3	2	22
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	1	6	9	8	17	7	10	65
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	5	8	8	17	6	8	56
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	1	2	8	8
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	9	15	20	29	35	65	92	104
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	1	3	1	1	11
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	0	2	2	0	11
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	3	8	10	11	40
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	5	8	11	17	24	42	51	219
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	5	2	3	5	30
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	8	16	25	55
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	5
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4

TABELLA A98. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.1 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	1	2	0	2	0	0	0	3	1	6	6	5	5	19	41	57	155	304
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	3
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4	1	4	2	15	15
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	4	4	2	3	16
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	6	6
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	2	8	30	46	126	218
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	0	0	7
V01-Y99 Cause esterne mortal	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	3	5	18	38
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	1	10
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	7	3	8	16	24	15	21	106
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	5	19	8	10	49	49
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	1	1	0	0	7
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	2	1	9	2	6	9	40
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	1	2	8
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	7	6	17	47	79	237	400
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	5	7	16	16
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	5
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	13	38
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	4	11	27	46	130	226
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	26	38
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	6	4	24	37
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Appendice

TABELLA A99. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.1 -

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	---tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni	---tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	123.9	118.2 (15.5)	27.7	26.4 (7.4)	1841.0	906	3017.3	1741
C22 T.m.fegato	5-64	15.6	14.5 (5.2)	1.1	.9 (1.3)	76.7	44	213.2	133
C32 T.m.laringe	5-64	3.1	2.9 (2.3)	4.3	3.7 (2.6)	11.2	6	95.5	65
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	4.2	3.8 (2.7)	.0	.0 (0)	22.1	13	58.5	36
C67 T.m.vescica	5-64	20.8	19.1 (6.0)	3.2	2.9 (2.3)	129.8	75	368.1	239
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	2.1	1.8 (1.8)	.0	.0 (0)	17.3	10	45.4	30
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (0)	1.1	1.0 (1.3)	.0	0	.0	11.4
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	1.0	1.1 (1.5)	.0	.0 (0)	39.6	19	45.5	24
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	11.5	10.5 (4.4)	6.4	5.5 (3.1)	89.2	51	239.8	155
V01-Y99 Cause esterne mortal	5-64	13.5	12.3 (4.8)	2.1	2.4 (2.4)	112.7	66	262.2	169
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	62.5	59.3 (9.7)	28.6	18.6 (4.8)	1342.3	623	1688.7	891
-X60-X84 Suicidi	0-75+	28.5	27.7 (6.7)	7.5	6.9 (3.3)	797.7	369	967.5	506
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	17.4	16.8 (5.2)	3.0	2.7 (2.1)	354.6	146	435.8	206
		1.6	1.3 (1.2)	.0	.0 (0)	29.4	16	36.1	23
									.0
									0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	14.6	12.9 (4.9)	23.5	20.3 (6.1)	127.1	78	287.8	191
C43-C44 T.m.pelle	5-64	9.4	8.5 (4.0)	1.1	.9 (1.3)	67.8	41	190.2	126
C50 T.m.mammella	5-64	4.2	3.5 (2.4)	5.3	4.6 (2.9)	57.0	35	86.8	59
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	1.0	1.0 (1.4)	13.9	12.0 (4.7)	2.4	1	10.7	6
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (0)	-	-	-	.0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	1.1	1.0 (1.3)	-	-	-	11.4
		-	- (-)	2.1	1.8 (1.8)	-	-	-	6
						-	-	-	18.7
									11
									24
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	55.2	50.3 (9.7)	14.9	13.3 (5.0)	422.4	241	1025.3	659
-B24 AIDS	5-64	3.1	2.8 (2.2)	3.2	2.8 (2.2)	28.2	16	57.5	38
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (0)	.0	.0 (0)	.0	0	.0	0
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (0)	-	- (-)	.0	0	.0	-
C91-C95 Leucemie	0-14	1.0	1.0 (1.4)	.0	.0 (0)	2.4	1	10.7	6
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (0)	.0	.0 (0)	41.3	24	89.4	56
I10-I15 Ipertensione	5-64	.0	.0 (0)	.0	.0 (0)	.0	0	.0	0
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	5.2	4.6 (2.9)	.0	.0 (0)	40.4	24	97.3	64
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	31.2	28.5 (7.3)	8.5	7.4 (3.6)	257.9	145	607.2	389
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	5.2	4.7 (3.0)	.0	.0 (0)	34.6	21	102.9	68
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	2.1	1.8 (1.8)	2.1	1.9 (1.9)	13.0	8	37.2	25
K35-K38 Appendicite	5-64	1.0	1.0 (1.4)	.0	.0 (0)	2.4	1	10.7	6
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (0)	.0	.0 (0)	.0	0	.0	0
K80-K82 Colenist.acuta e cro	5-64	1.0	1.0 (1.4)	.0	.0 (0)	2.4	1	12.1	8
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (0)	.0	.0 (0)	.0	0	.0	0
									0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	57.6	54.0 (11.6)	29.7	24.8 (7.7)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	30.9	31.6 (10.0)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (0)				

Appendice

TABELLA A100. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 1 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	tassi standard. YPLL--
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	117.6	112.3 (19.9)	35.3	33.8 (11.1)	1692.8	489 2784.5	934 834.4	223 1109.5
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	16.3	15.6 (7.4)	.0	.0 (.0)	51.9	16 205.7	71 .0	0 .0
C22 T.m.fegato	5-64	3.6	3.3 (3.4)	5.6	4.9 (4.0)	15.4	5 99.3	39 56.3	19 96.6
C32 T.m.laringe	5-64	5.4	4.9 (4.0)	.0	.0 (.0)	33.6	11 72.5	26 .0	0 .0
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	21.7	20.0 (8.2)	3.7	3.3 (3.3)	135.4	45 370.7	138 39.0	13 67.5
C67 T.m.vescica	5-64	1.8	1.5 (2.2)	.0	.0 (.0)	18.2	6 49.5	19 .0	0 1.9
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	1.9	1.7 (2.3)	.0	0 .0	0 19.5	6 31.8
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	1.8	1.9 (2.7)	.0	.0 (.0)	68.3	19 78.4	24 .0	0 .0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	7.2	6.5 (4.6)	7.4	6.2 (4.4)	82.5	28 164.8	63 101.3	35 161.7
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	16.3	15.0 (7.1)	1.9	1.7 (2.3)	137.6	46 310.7	114 19.5	6 40.7
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	60.8	56.3 (12.3)	34.3	25.4 (7.9)	1149.8	313 1432.5	441 598.9	144 709.4
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	24.9	23.6 (8.1)	10.5	10.7 (5.7)	639.4	171 771.5	234 355.9	84 420.0
-X60-X84 Suicidi	0-75+	19.3	18.0 (7.0)	2.6	2.7 (3.0)	325.4	83 392.9	113 99.6	21 113.6
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	1.4	.8 (1.3)	.0	.0 (.0)	.0	0 2.3	1 .0	0 .0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	12.7	11.3 (6.1)	26.0	22.5 (8.5)	111.8	39 252.7	96 221.4	75 433.2
C21 C21 T.m.colon-retto	5-64	7.2	6.5 (4.7)	.0	.0 (.0)	58.0	20 162.9	63 .0	0 21.7
C43-C44 T.m.pelle	5-64	3.6	3.0 (3.0)	5.6	4.7 (3.8)	49.6	18 70.7	28 68.4	24 101.9
C50 T.m.mammella	5-64	1.8	1.7 (2.5)	16.7	14.5 (6.8)	4.2	1 19.0	6 129.6	44 249.2
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	- -	- .0	0 1.9
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	1.9	1.7 (2.3)	-	- -	- 19.5	6 31.8
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	1.9	1.7 (2.4)	-	- -	- 3.9	1 26.7
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	48.9	45.0 (12.3)	16.7	14.9 (7.0)	326.8	109 898.5	334 82.0	26 246.2
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	1.8	1.5 (2.2)	3.7	3.3 (3.3)	18.2	6 34.4	14 15.6	5 42.6
-B24 AIDS	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 .0	0 .0	0 .0
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0 .0	0 -	- -
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 .0	0 .0	0 .0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	60.1	20 111.7	40 .0	0 1.9
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 .0	0 .0	0 .0
I10-I15 Ipertensione	5-64	3.6	3.3 (3.4)	.0	.0 (.0)	15.4	5 77.4	29 .0	0 1.9
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	25.3	23.3 (8.9)	9.3	8.3 (5.2)	186.7	63 519.2	195 43.0	14 141.3
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	5.4	5.1 (4.2)	.0	.0 (.0)	19.7	6 81.8	29 .0	0 .0
J40-J47 Broncopn.cron.ostrutt	5-64	3.6	3.1 (3.2)	3.7	3.3 (3.3)	22.5	8 52.3	20 23.4	8 58.5
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 .0	0 .0	0 .0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 .0	0 .0	0 .0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 .0	0 .0	0 .0
K80-K82 Colenist.acuta e cro	5-64	1.8	1.7 (2.5)	.0	.0 (.0)	4.2	1 21.4	8 .0	0 .0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 .0	0 .0	0 .0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	54.5	49.0 (14.4)	17.3	13.7 (7.4)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	37.9	39.5 (14.8)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)				

Appendice

TABELLA A101. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 1 DSB 2

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	----tassi <65 anni	standard. YPLL----	----tassi # <75 anni	standard. YPLL----
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	132.5	126.5 (24.7)	17.5	16.0 (8.7)	2039.0	418 3332.6	808	220.5
C22 T.m.fegato	5-64	14.7	13.3 (7.7)	2.5	2.1 (3.0)	113.3	28 230.1	61	5.0
C32 T.m.laringe	5-64	2.5	2.2 (3.2)	2.5	2.1 (3.0)	5.4	1 90.0	26	5.0
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	2.5	2.2 (3.2)	.0	.0 (0.0)	5.4	1 37.7	10	.0
C67 T.m.vescica	5-64	2.5	2.1 (3.1)	.0	.0 (0.0)	124.1	30 367.5	101	15.0
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0	0	.0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0	0	.0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	17.2	16.0 (8.6)	5.0	4.2 (4.2)	102.1	24 344.7	93	30.0
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	9.8	8.7 (6.2)	2.5	3.2 (4.6)	81.0	20 201.2	55	160.5
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	64.8	63.3 (15.7)	21.0	9.8 (4.3)	1592.3	310 2022.2	450	5.0
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	33.3	33.1 (11.5)	3.5	1.8 (1.8)	1006.4	198 1225.7	273	.0
-X60-X84 Suicidi	0-75+	14.8	15.2 (8.0)	3.5	2.7 (2.8)	388.8	64 487.1	94	5.0
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	1.9	1.7 (2.5)	.0	.0 (0.0)	68.9	16 81.7	21	.0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	17.2	15.0 (8.1)	20.0	17.6 (8.8)	148.4	39 335.6	95	218.1
C43-C44 T.m.pelle	5-64	12.3	10.9 (7.0)	2.5	2.1 (3.0)	81.5	21 227.0	64	15.0
C50 T.m.mammella	5-64	4.9	4.0 (4.1)	5.0	4.5 (4.5)	66.9	18 108.5	31	42.7
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	10.0	8.8 (6.2)	.0	0 0	0	124.1
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (0.0)	-	- -	-	.0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	2.5	2.2 (3.1)	-	- -	-	36.3
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	63.8	58.0 (16.1)	12.5	11.5 (7.3)	559.8	133 1210.7	325	153.7
-B24 AIDS	5-64	4.9	4.4 (4.4)	2.5	2.1 (3.0)	42.2	10 89.4	24	5.0
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0	0	.0
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0 0	0	-
C91-C95 Leucemie	0-14	2.5	2.2 (3.2)	.0	.0 (0.0)	5.4	1 24.5	6	.0
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	15.4	4 58.8	16	102.4
I10-I15 Ipertensione	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0	0	0
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	39.2	36.1 (12.8)	7.5	6.4 (5.3)	360.5	83 737.4	194	46.3
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	4.9	4.2 (4.2)	.0	.0 (0.0)	55.3	15 132.2	39	.0
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 16.3	5	.0
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	2.5	2.2 (3.2)	.0	.0 (0.0)	5.4	1 24.5	6	.0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0	0	.0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0	0	.0
K80-K82 Colenist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0	0	.0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0	0	.0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	61.9	60.4 (19.2)	46.2	39.5 (15.0)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	21.6	21.6 (12.6)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (0.0)				

Appendice

TABELLA A102. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.2 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE	
I GRUPPO: prevenzione primaria	0	0	1	4	9	11	16	17	17	26	29	45	66	87	139	233	196	209	1105	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	2	6	9	4	2	4	34	
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	6	10	15	12	7	63	
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	1	6	8	3	0	26	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	12	16	29	38	48	76	32	20	281
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	8	8	16	10	10	60
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	1	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	9	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	7	17	37	84	106	147	412	
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	4	4	6	7	8	8	4	50
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	0	1	4	9	10	10	13	11	9	3	7	12	5	14	22	23	17	170	
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	0	4	7	7	9	9	5	4	1	3	5	2	4	2	3	4	69	
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	2	2	0	2	3	4	2	1	4	2	5	9	6	5	47	
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	1	2	0	2	2	0	8	5	14	22	25	32	28	22	163	
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	7	4	13	22	22	30	24	19	147	
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	2	4	3	14		
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
III GRUPPO: assist.osp.territ	1	0	0	0	0	0	0	1	3	10	9	20	29	31	69	108	173	253	335	1042
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	2	5	7	7	7	7	44
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	8	7	9	12	6	46
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	4	
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	8	25	24	42	111
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	6	15	20	22	43	61	90	129	190	584
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	6	4	17	22	56
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	16	36	59	61	179
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	9	
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	

TABELLA A103. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.2 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE	
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	0	0	2	1	4	1	9	8	2	12	19	25	30	50	107	192	434	897	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1	2	9		
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	6	7	16	10	11	54	
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	8	10	6	10	11	17	6	75
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	9	
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	2	3	10	6	20	56	149	374	624	
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	7	4	11	1	3	32	
V01-Y99 Cause esterne mortal	1	0	0	1	0	3	0	7	4	1	1	6	1	1	7	11	12	29	85	
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	1	0	0	1	0	2	0	4	1	0	1	2	0	0	1	4	2	2	21	
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	0	0	0	3	1	1	12	
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	3	3	8	10	14	22	19	24	30	33	46	55	267	
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	6	5	6	15	16	16	31	105	
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	5	10	
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	7	16	11	13	12	14	22	125	
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	5	
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	1	1	3	1	6	2	19	
III GRUPPO: assist.osp.territ	2	0	0	0	0	1	2	3	3	7	4	6	25	30	59	94	208	566	1010	
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	2	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	0	1	4	7	10	7	8	45	
-B24 AIDS	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	4	1	4	2	10	5	32	
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	6	6	12	29	111	169	
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	1	16	13	32	58	128	344	598	
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	3	7	43	61	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	8	22	43	83		
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	10	
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Appendice

TABELLA A104. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.2 -

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	---tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni	---tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	96.4	89.5 (8.2)	33.0	29.2 (4.5)	1373.4	1864 2283.1	3569	433.1 600 726.5 1195
C22 T.m.fegato	5-64	3.6	3.2 (1.5)	.8	.7 (.6)	35.2	54 77.6	133	11.2 18 20.0 35
C32 T.m.laringe	5-64	5.2	4.8 (1.8)	1.6	1.5 (1.0)	30.5	44 87.5	144	23.1 30 48.4 81
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	3.2	2.9 (1.4)	.0	.0 (.0)	20.9	30 49.6	81	.0 0 2.4 5
C67 T.m.vescica	5-64	26.8	24.4 (4.2)	10.0	8.5 (2.4)	182.6	271 485.7	809	62.8 96 146.2 256
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 0 0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	3.6	3.2 (1.4)	.8	.9 (.9)	85.5	129 104.5	174	30.2 33 35.6 44
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	8.4	7.5 (2.3)	7.6	6.7 (2.2)	73.1	111 189.0	326	73.7 96 144.6 239
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	6.8	6.1 (2.0)	2.4	2.0 (1.1)	68.7	104 131.7	220	22.2 35 52.9 96
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	51.7	46.9 (5.2)	24.1	15.6 (2.5)	864.8	1104 1098.7	1585	209.0 291 270.9 429
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	21.0	20.8 (3.6)	5.9	5.0 (1.6)	612.3	760 746.5	1043	132.4 173 159.4 234
-X60-X84 Suicidi	0-75+	14.3	12.4 (2.6)	3.4	2.5 (1.0)	149.2	198 207.0	311	39.5 65 53.8 99
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.6	.6 (.6)	.8	.9 (.7)	21.4	28 26.0	38	29.2 41 35.8 56
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	13.6	12.7 (3.0)	31.5	26.7 (4.2)	143.8	195 302.3	479	293.1 461 554.5 984
C43-C44 T.m.pelle	5-64	12.0	11.2 (2.8)	8.4	7.1 (2.1)	120.2	165 265.9	425	70.7 111 143.3 258
C50 T.m.mammella	5-64	1.6	1.6 (1.1)	.4	.3 (.4)	23.7	30 35.3	51	.8 1 7.5 14
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	19.1	16.2 (3.3)	.0	0 1.0	3	176.0 278 328.8 581
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.4	.3 (.4)	-	- -	-	7.0 11 9.2 16
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.8	.7 (.6)	-	- -	-	5.0 8 14.4 25
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	41.2	37.2 (5.1)	20.3	17.3 (3.4)	369.6	553 870.6	1466	219.6 329 438.3 780
-B24 AIDS	5-64	4.0	3.5 (1.5)	2.8	2.4 (1.2)	72.9	109 114.5	191	92.5 131 122.2 200
C62 T.m.testicolo	5-64	1.6	1.3 (.9)	2.0	1.7 (1.0)	23.3	38 32.6	58	62.1 90 74.6 120
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0 0	0	- - -
C91-C95 Leucemie	0-14	.4	.4 (.5)	.0	.0 (.0)	15.8	25 48.2	84	31.8 53 60.8 111
I10-I109 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.4	.4 (.5)	.4	.3 (.4)	2.6	4 7.6	13	.8 1 3.6 6
I10-I15 Ipertensione	5-64	3.6	3.3 (1.5)	2.0	1.7 (1.0)	29.4	44 65.6	110	16.5 26 43.6 81
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	28.4	25.7 (4.3)	9.2	7.9 (2.3)	228.6	341 557.3	934	57.2 84 158.9 288
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.6	1.5 (1.0)	.4	.3 (.4)	11.7	18 33.0	56	5.5 9 15.4 30
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	.8	.7 (.7)	1.2	1.0 (.8)	3.4	5 29.2	54	7.4 11 21.6 40
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.4	.4 (.5)	.0	.0 (.0)	2.6	4 8.2	14	.0 0 1.9 4
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	0 0 0 0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	0 0 0 0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	.5	1 0 0 1
000-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.5	.5 (.6)	.0	0 0	0	8.0 14 9.9 19
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	70.1	66.0 (8.1)	34.1	31.0 (5.5)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	53.4	52.8 (8.0)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.5	.5 (.4)				

Appendice

TABELLA A105. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 2 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	tassi standard. YPLL--
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	93.1	86.9 (11.4)	31.7	27.3 (6.0)	1447.7	1000 2309.2	1831	373.5 288 639.4 571
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	1.6	1.4 (1.4)	.8	.7 (1.0)	6.6	5 38.4	34	7.9 6 13.0 11
C22 T.m.fegato	5-64	4.7	4.2 (2.5)	.8	.7 (1.0)	20.5	15 68.8	58	7.9 6 26.3 25
C32 T.m.laringe	5-64	2.3	2.1 (1.8)	.0	.0 (0)	15.5	11 43.8	38	.0 0 3.9 4
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	24.8	22.6 (5.7)	10.6	8.9 (3.4)	161.7	123 422.9	359	54.9 45 143.2 134
C67 T.m.vescica	5-64	1.6	1.4 (1.4)	.8	.6 (.9)	6.6	5 41.9	36	1.5 1 6.8 6
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 0 0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	3.9	3.2 (2.1)	.8	.6 (.9)	77.4	64 98.3	89	13.2 11 18.2 18
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	7.8	6.8 (3.1)	6.8	6.3 (3.1)	74.5	60 197.6	175	111.4 71 170.6 135
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	7.8	6.9 (3.1)	2.3	1.9 (1.6)	80.6	63 148.9	126	22.7 19 50.4 48
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	52.5	49.2 (7.6)	22.8	14.3 (3.3)	1004.1	655 1248.2	918	154.0 128 207.1 191
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	22.1	21.8 (5.2)	3.8	2.6 (1.4)	662.0	434 807.2	594	34.9 31 47.0 46
-X60-X84 Suicidi	0-75+	14.9	14.0 (4.0)	5.4	4.2 (1.9)	222.1	140 295.9	213	74.5 65 100.8 98
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.6	.6 (1.0)	1.1	1.2 (1.2)	30.1	19 34.5	24	40.2 28 49.1 38
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	16.3	15.0 (4.7)	32.4	27.3 (5.9)	173.7	126 350.2	288	297.7 249 569.4 533
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	13.2	12.0 (4.2)	11.3	9.5 (3.5)	128.1	96 281.9	236	94.2 79 190.8 179
C43-C44 T.m.pelle	5-64	3.1	3.0 (2.1)	.8	.6 (.9)	45.6	30 67.1	50	1.5 1 10.6 10
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	15.8	13.3 (4.1)	.0	0 1.1	1	147.7 124 280.0 263
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.8	.6 (.9)	-	-	-	13.2 11 17.3 16
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.8	.7 (1.0)	-	-	-	7.9 6 16.8 15
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	3.0	2.6 (1.8)	-	-	-	33.1 28 53.8 50
III GRUPPO: assist.osp.territ.									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	34.9	31.5 (6.7)	20.4	17.3 (4.7)	293.1	226 772.3	664	178.7 144 400.1 375
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	2.3	2.1 (1.8)	3.8	3.2 (2.0)	15.5	11 40.5	34	50.0 41 90.1 84
-B24 AIDS	5-64	.0	.0 (.0)	2.3	1.9 (1.6)	.0	0 0	0	38.0 31 51.2 46
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0 0	0	- - -
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 0 0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	20.0	18 49.6	45	11.8 10 37.0 35
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.8	.6 (.9)	.0	0 4.5	4	1.5 1 6.8 6
I10-I15 Ipertensione	5-64	3.9	3.5 (2.2)	1.5	1.3 (1.3)	34.5	26 73.8	63	14.9 13 37.7 36
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	24.1	21.7 (5.5)	9.8	8.5 (3.3)	205.9	159 510.2	438	74.8 56 175.9 161
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.6	1.4 (1.5)	.8	.6 (.9)	10.6	8 38.0	31	10.5 9 23.6 23
J40-J47 Broncopn.cron.ostrutt	5-64	1.6	1.4 (1.4)	.0	.0 (.0)	6.6	5 48.6	44	.0 0 9.5 10
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 5.6	5	.0 0 0 0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	0 0 0 0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	0 0 0 0
K80-K82 Colenist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 1.1	1	.0 0 0 1
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.9	.9 (1.3)	.0	0 0	0	15.2 14 18.8 19
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	71.6	68.4 (11.6)	37.3	36.2 (8.5)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	45.3	44.6 (10.3)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	1.0	.9 (.9)				

TABELLA A106. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 2 DSB 2

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI		FEMMINE		# <75 anni
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)			standard. YPLL---	standard. YPLL---	# <65 anni	# <75 anni	
I GRUPPO:prevenzione primaria												
C00-C15	T.m.prime vie aer-di	5-64	89.7	83.9 (19.4)	31.2	29.9 (11.9)	1284.5	300	2148.0	568	471.8	96
		5-64	7.1	6.1 (5.0)	.0	.0 (.0)	81.1	21	129.4	38	.0	0
C22	T.m.fegato	5-64	11.8	11.0 (7.0)	4.8	4.8 (4.9)	88.9	21	182.4	49	100.8	20
C32	T.m.laringe	5-64	4.7	4.3 (4.4)	.0	.0 (.0)	41.7	10	75.4	20	.0	0
C33-C34	T.m.trach bronch.pol	5-64	14.2	13.3 (7.7)	9.6	8.6 (6.1)	94.4	23	364.2	99	41.0	10
C67	T.m.vescica	5-64	4.7	4.6 (4.6)	.0	.0 (.0)	10.9	3	52.8	14	.0	0
F10	Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
F11-F19	Farmacodipendenza	5-64	7.1	6.8 (5.6)	2.4	3.3 (4.6)	221.4	51	259.1	66	131.6	21
I60-I69	Dist.circol.encefalo	5-64	9.4	8.3 (5.9)	2.4	2.1 (3.0)	107.8	28	221.7	64	5.0	1
K70-K76	Cirrosi epatica	5-64	9.4	8.5 (6.1)	4.8	4.1 (4.1)	85.0	23	167.7	48	56.9	15
V01-Y99	Cause esterne mortal	0-75+	41.7	37.4 (11.2)	17.3	11.8 (5.7)	553.4	121	695.0	171	136.4	29
-V01-V99	Incidenti mezzi tras	0-75+	12.7	13.2 (7.2)	10.4	8.6 (5.2)	448.6	93	531.7	123	136.4	29
-X60-X84	Suicidi	0-75+	12.7	10.3 (5.6)	1.7	.8 (1.1)	41.1	11	71.3	21	.0	0
-X85-Y09	Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.												
C18-C21	T.m.colon-retto	5-64	9.4	9.0 (6.4)	28.8	25.6 (10.5)	31.3	8	172.0	48	250.4	63
		5-64	9.4	9.0 (6.4)	9.6	8.6 (6.1)	31.3	8	168.5	46	71.6	18
C43-C44	T.m.pelle	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	3.4	1	.0	0
C50	T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	19.2	17.0 (8.5)	.0	0	.0	0	178.8	45
C53	T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0
C54	T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0
C55	T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0
III GRUPPO:assist.osp.territ												
A00-B99	Mal.batt.vir.parassi	5-64	47.2	43.1 (13.7)	12.0	10.6 (6.7)	421.1	108	977.2	275	420.0	91
		5-64	4.7	3.9 (4.0)	2.4	2.1 (3.0)	63.7	18	116.3	35	370.8	79
-B24	AIDS	5-64	4.7	3.9 (4.0)	2.4	2.1 (3.0)	63.7	18	91.9	28	217.7	48
C62	T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	.0	0	-	-
C81	Malattia di Hodgkin	5-64	2.4	2.1 (3.0)	.0	.0 (.0)	15.0	4	35.2	10	.0	0
C91-C95	Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	5.4	1	52.6	14	.0	0
I00-I09	Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
I10-I15	Ipertensione	5-64	2.4	2.2 (3.2)	2.4	2.1 (3.0)	26.7	6	50.5	14	5.0	1
I20-I25	Mal.ischemiche cuore	5-64	30.7	28.2 (11.1)	7.2	6.3 (5.2)	262.2	66	619.2	173	44.1	11
J10-J22	Mal.respirat.acute	5-64	2.4	2.0 (2.8)	.0	.0 (.0)	33.0	9	53.9	16	.0	0
J40-J47	Broncopn.cron.ostrut	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	17.4	5	.0	0
K25-K28	Ulcera peptica	5-64	2.4	2.1 (3.0)	.0	.0 (.0)	15.0	4	31.7	9	.0	0
K35-K38	Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
K40-K46	Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
K80-K82	Colenist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
O00-O99	Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
Screening di popolazione												
C18-C21	T.m.colon-retto	50-74	82.1	75.4 (21.1)	39.8	36.9 (15.0)						
		50-69	-	- (-)	70.3	69.1 (22.9)						
C53	T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)						

Appendice

TABELLA A107. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 2 DSB 3

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI	FEMMINE		# <75 anni	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)				standard. YPLL---	standard. YPLL---		
I GRUPPO:prevenzione primaria												
C00-C15	T.m.prime vie aer-di	5-64	110.7	101.2 (21.7)	33.7	28.7 (11.3)	1413.1	315	2487.7	641	220.4	54 540.7
C22	T.m.fegato	5-64	7.6	6.6 (5.5)	2.6	2.2 (3.1)	77.8	19	143.9	39	45.8	11 72.1
C32	T.m.laringe	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	22.1	8	.0	0 14.7
C33-C34	T.m.trach bronch.pol	5-64	40.3	35.7 (12.7)	5.2	4.5 (4.5)	311.3	75	771.6	210	21.3	5 81.6
C67	T.m.vescica	5-64	2.5	2.4 (3.4)	.0	.0 (.0)	17.1	4	55.3	15	.0	0 .0
F10	Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
F11-F19	Farmacodipendenza	5-64	2.5	1.9 (2.7)	.0	.0 (.0)	50.0	14	61.8	19	.0	0 .0
I60-I69	Dist.circol.encefalo	5-64	15.1	13.9 (8.0)	15.5	13.4 (7.8)	99.1	23	266.4	71	75.4	18 222.9
K70-K76	Cirrosi epatica	5-64	7.6	6.7 (5.6)	2.6	2.2 (3.1)	78.5	19	135.1	36	5.1	1 25.8
V01-Y99	Cause esterne mortal	0-75+	52.3	45.2 (12.5)	28.7	15.6 (5.9)	779.4	163	1031.2	244	72.8	19 123.7
-V01-V99	Incidenti mezzi tras	0-75+	29.9	27.4 (10.1)	3.6	2.6 (2.6)	661.8	133	836.6	190	51.5	14 63.7
-X60-X84	Suicidi	0-75+	11.2	8.4 (4.9)	1.8	1.0 (1.4)	50.0	14	75.1	23	.0	0 2.6
-X85-Y09	Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.												
C18-C21	T.m.colon-retto	5-64	12.6	11.5 (7.3)	28.5	25.0 (10.7)	111.9	26	254.6	69	260.2	59 489.3
C43-C44	T.m.pelle	5-64	12.6	11.5 (7.3)	.0	.0 (.0)	111.9	26	254.6	69	.0	0 7.7
C50	T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
C53	T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	25.9	22.6 (10.1)	.0	0	.0	0	186.5	43 379.6
C54	T.m.corpo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 12.1
C55	T.m.utero n.s.	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
III GRUPPO:assist.osp.territ												
A00-B99	Mal.batt.vir.parassi	5-64	42.8	38.7 (13.3)	25.9	21.8 (9.8)	261.4	61	787.6	213	212.6	53 419.8
-B24	AIDS	5-64	5.0	4.3 (4.4)	2.6	2.2 (3.1)	50.6	13	109.9	30	45.8	11 60.0
C62	T.m.testicolo	5-64	2.5	2.1 (3.0)	2.6	2.2 (3.1)	45.3	11	59.4	16	45.8	11 60.0
C81	Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
C91-C95	Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
I00-I09	Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
I10-I15	Ipertensione	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
I20-I25	Mal.ischemiche cuore	5-64	32.7	29.9 (11.8)	5.2	4.3 (4.3)	5.3	1	26.7	8	50.9	13 85.8
J10-J22	Mal.respirat.acute	5-64	2.5	2.2 (3.2)	.0	.0 (.0)	5.3	1	29.7	9	.0	0 5.1
J40-J47	Broncopn.cron.ostrut	5-64	.0	.0 (.0)	5.2	4.6 (4.6)	.0	0	8.7	4	43.9	10 82.1
K25-K28	Ulcer.a peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
K35-K38	Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
K40-K46	Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
K80-K82	Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
O00-O99	Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0 .0
Screening di popolazione												
C18-C21	T.m.colon-retto	50-74	74.6	66.9 (19.8)	17.6	10.7 (6.6)						
C50	T.m.mammella	50-69	-	- (-)	73.9	75.1 (24.2)						
C53	T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)						

Appendice

TABELLA A108. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 2 DSB 4

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

Screening di popolazione

C18-C21	T.m.colon-retto	50-74	49.2	49.9 (17.6)	34.4	26.1 (11.6)
C50	T.m.mammella	50-69	-	(-)	43.0	43.1 (18.0)
C53	T.m.collo dell'utero	25-64	-	(-)	.0	.0 (.0)

Appendice

TABELLA A109. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.3 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	0	0	0	2	4	4	5	7	4	15	8	19	29	39	78	90	107	116	527
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	5	1	2	18	
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	4	8	4	4	27	
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	3	0	8
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	11	17	30	29	20	7	126
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	9	8	7	36	
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	7	5	19	28	60	83	208
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	2	5	1	1	17	
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	0	0	2	3	4	2	5	2	9	4	5	3	2	13	5	10	12	81
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	0	2	2	3	1	4	0	3	2	0	1	1	4	1	2	3	29
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	2	1	1	5	2	4	0	20
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	2	7	14	15	10	4	59
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	2	7	13	13	9	4	55
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
III GRUPPO: assist.osp.territ	1	0	1	0	0	0	0	0	4	5	7	12	21	35	58	100	123	160	527
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	4	0	5	4	1	21
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C91-C95 Leucemie	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	4	1	7	5	24
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	10	5	11	35
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	10	15	18	41	56	68	96	313
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	5	10	14	36
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	21	25	29	87
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	

TABELLA A110. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.3 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	0	0	1	2	0	2	1	2	2	3	5	3	14	26	51	83	181	377
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	5
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	2	16
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	8	7	4	2	29
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	11
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	10	32	56	149	256
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	2	1	0	8
V01-Y99 Cause esterne mortal	1	0	0	1	2	0	2	0	1	2	1	2	0	1	2	3	11	22	51
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	0	1	2	0	1	0	0	2	0	2	0	1	0	1	1	1	12
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	4	6	12	10	13	23	24	27	128
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	2	5	10	6	14	44
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	5	10	5	6	8	10	58
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	5
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	4	4	15
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	1	4	7	16	24	45	107	260	470
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	2	7	6	4	26
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C91-C95 Leucemie	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	3	5	1
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	11	35	58
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	6	12	22	63	175	288
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	10	16	30
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	9	23	41
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELLA A111. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.3 -

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI			FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	----tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni	----tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni	#	
I GRUPPO: prevenzione primaria											
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	85.8	78.3 (11.3)	19.2	17.8 (5.6)	1173.9	719 2020.0	1448	416.3	225	624.2
C22 T.m.fegato	5-64	3.5	3.2 (2.2)	.9	.8 (1.1)	11.0	8 55.5	43	9.6	6	20.9
C32 T.m.laringe	5-64	4.4	3.9 (2.4)	.0	.0 (0.0)	16.4	11 63.0	49	.0	0	2.7
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	.9	.8 (1.0)	.0	.0 (0.0)	5.4	4 22.5	18	.0	0	0
C67 T.m.vescica	5-64	20.3	17.8 (5.2)	2.7	2.2 (1.7)	123.1	86 383.9	303	25.7	19	71.3
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0	0	.0	0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	5.3	5.0 (2.9)	.0	.0 (0.0)	152.7	95 181.0	125	.0	0	0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	11.5	10.2 (4.0)	3.7	3.0 (2.1)	71.5	49 199.2	156	18.3	13	73.6
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	3.5	3.1 (2.1)	1.8	1.5 (1.5)	35.0	25 80.3	63	22.1	15	42.9
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	53.9	45.5 (7.3)	32.2	19.3 (4.4)	751.4	436 987.3	655	340.6	173	411.9
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	19.3	18.0 (4.9)	7.6	7.6 (3.4)	472.0	258 576.2	356	227.5	108	277.7
-X60-X84 Suicidi	0-75+	13.3	10.7 (3.4)	2.5	1.8 (1.3)	109.3	65 165.7	115	42.1	28	52.1
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	2.7	2.4 (1.7)	1.3	1.0 (1.0)	39.1	28 61.4	48	9.6	6	15.6
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.											
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	8.0	6.9 (3.2)	28.3	23.5 (5.9)	65.2	46 169.2	135	233.5	161	468.5
C43-C44 T.m.pelle	5-64	8.0	6.9 (3.2)	6.4	5.4 (2.8)	65.2	46 168.0	134	67.9	46	121.1
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	.9	.7 (1.0)	.0	0 1.1	1	18.7	14	27.6
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	19.2	15.8 (4.8)	.0	0 0	0	132.0	91	282.5
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.9	.8 (1.1)	-	- -	-	9.6	6	16.6
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.9	.7 (1.0)	-	- -	-	5.2	4	11.0
III GRUPPO: assist.osp.territ											
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	44.2	39.4 (7.8)	16.4	13.9 (4.6)	407.0	261 956.5	720	178.7	113	372.8
-B24 AIDS	5-64	5.3	4.6 (2.6)	2.7	2.3 (1.8)	110.6	69 167.7	119	37.4	26	72.7
C62 T.m.testicolo	5-64	2.7	2.2 (1.8)	.9	.7 (1.0)	40.7	29 56.0	44	18.7	14	23.2
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	-.7	(-)	.0	0 0	0	-	-	-
C91-C95 Leucemie	0-14	5.1	5.4 (7.5)	5.6	5.7 (8.1)	77.4	43 123.2	81	82.1	45	105.7
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 5.0	4	.0	0	0
I10-I15 Ipertensione	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	9.5	6 40.1	31	.0	0	17.7
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	.0	.0 (.0)	30.1	26.5 (6.4)	9.1	7.5 (3.3)	196.2	135 542.3	424	57.5
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	9.5	6 33.9	26	.0	0	4.4
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	3.8	3 44.0	35	1.8	1	18.5
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0	0	.0	0	0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0	0	.0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0	0	.0	0	0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0	0	.0	0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (0.0)	.0	0 0	0	.0	0	0
Screening di popolazione											
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	59.8	53.3 (10.4)	20.2	17.2 (5.9)						
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	55.8	55.1 (12.1)						
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	1.2	1.2 (1.2)						

Appendice

TABELLA A112. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 3 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	MASCHI	FEMMINE		# <75 anni		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)		standard. YPLL---	# <75 anni	standard. YPLL---			
I GRUPPO:prevenzione primaria												
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	.0	.0 (. .)	11.8	12.2 (17.2)	.0	0	.0	0	143.7	6	234.7
C22 T.m.fegato	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	67.1	4	.0	0	.0
C32 T.m.laringe	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	32.8	26.8 (22.3)	.0	.0 (. .)	336.4	21	630.6	43	.0	0	.0
C67 T.m.vescica	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	10.9	12.4 (17.6)	.0	.0 (. .)	29.4	1	133.2	6	.0	0	62.6
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	10.9	12.4 (17.6)	11.8	10.2 (14.4)	29.4	1	200.3	10	216.0	11	283.1
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	57.1	58.0 (32.1)	39.8	25.6 (18.7)	916.5	39	1332.2	64	864.7	40	969.2
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	24.5	27.7 (23.3)	8.0	7.7 (10.8)	806.8	34	1028.9	49	158.5	9	225.9
-X60-X84 Suicidi	0-75+	16.3	15.2 (15.9)	.0	.0 (. .)	29.4	1	133.2	6	.0	0	.0
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.												
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	.0	.0 (. .)	35.4	31.7 (26.0)	.0	0	95.5	6	325.5	16	597.5
C43-C44 T.m.pelle	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	95.5	6	.0	0	10.4
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (. .)	23.6	19.5 (19.5)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (- -)	11.8	12.2 (17.2)	-	-	-	-	143.7	6	234.7
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (- -)	.0	.0 (. .)	-	-	-	-	.0	0	.0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (- -)	.0	.0 (. .)	-	-	-	-	.0	0	10.4
III GRUPPO:assist.osp.territ												
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	21.8	19.1 (19.5)	.0	.0 (. .)	208.3	13	352.5	23	.0	0	.0
-B24 AIDS	5-64	10.9	7.7 (11.0)	.0	.0 (. .)	128.0	9	182.5	14	.0	0	.0
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (. .)	-	- (- -)	.0	0	.0	0	-	-	-
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	67.1	4	.0	0	.0
I10-I15 Ipertensione	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	54.6	60.1 (38.1)	11.8	9.6 (13.6)	248.8	11	863.8	45	158.5	9	236.3
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	67.1	4	.0	0	.0
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (. .)	.0	.0 (. .)	.0	0	.0	0	.0	0	.0
Screening di popolazione												
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	92.5	70.8 (41.9)	27.7	14.5 (16.9)							
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (- -)	36.4	33.7 (37.7)							
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (- -)	16.1	18.3 (18.3)							

TABELLA A113. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 3 DSB 2

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	# <75 anni	# <65 anni	# <75 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	95.7	88.2 (22.2)	9.1	9.6 (8.3)	1663.5	299 2568.4	548	269.7
C22 T.m.fegato	5-64	11.6	9.9 (7.1)	.0	.0 (.0)	.0	0 3.7	1	.0
C32 T.m.laringe	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 3.7	1	.0
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	20.3	17.4 (9.3)	3.0	2.4 (3.3)	157.1	34 441.9	110	16.7
C67 T.m.vescica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 19.5	5	.0
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	8.7	7.2 (6.0)	.0	.0 (.0)	212.4	46 255.0	61	.0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	5.8	4.8 (4.9)	.0	.0 (.0)	46.3	10 133.9	34	.0
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 15.7	4	.0
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	69.5	61.5 (16.1)	35.3	18.5 (7.6)	1201.6	199 1560.1	299	253.0
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	34.7	34.3 (12.8)	6.2	6.7 (6.2)	1022.2	160 1219.5	216	253.0
-X60-X84 Suicidi	0-75+	17.4	13.3 (6.8)	2.1	.9 (1.3)	74.7	16 156.8	39	.0
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	4.3	3.9 (3.9)	2.1	1.1 (1.6)	81.6	18 116.3	28	.0
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	11.6	9.6 (6.8)	36.2	29.3 (12.0)	80.2	18 214.1	53	268.5
C43-C44 T.m.pelle	5-64	11.6	9.6 (6.8)	6.0	4.9 (4.9)	80.2	18 210.4	51	47.7
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 3.7	1	.0
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	27.2	22.0 (10.4)	.0	0 0	0	204.0
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	- -	-	.0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	3.0	2.4 (3.3)	-	- -	-	16.7
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	49.3	43.5 (15.0)	9.1	7.1 (5.8)	497.8	96 1084.9	249	73.2
-B24 AIDS	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 15.7	4	.0
C62 T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-.0	-.0 (-)	.0	0 0	0	.0
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0
C91-C95 Leucemie	0-14	16.8	17.2 (24.5)	.0	.0 (.0)	182.4	29 242.9	45	67.6
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0
I10-I15 Ipertensione	5-64	2.9	2.4 (3.5)	.0	.0 (.0)	29.4	6 79.5	19	.0
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	34.8	29.8 (12.2)	3.0	2.4 (3.4)	280.0	60 656.7	159	5.6
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 35.2	9	.0
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	2.9	2.5 (3.7)	.0	.0 (.0)	6.1	1 54.6	14	.0
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0
K80-K82 Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	63.2	61.2 (20.5)	19.4	15.3 (9.8)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	56.5	58.0 (22.3)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)				

Appendice

TABELLA A114. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 3 DSB 3

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	# <65 anni	MASCHI	FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)					standard. YPLL---	----tassi standard. YPLL---
I GRUPPO:prevenzione primaria											
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	77.8	69.8 (13.5)	22.1	20.2 (7.5)	913.1	358	1708.2	774	376.7	131
C22 T.m.fegato	5-64	5.8	5.0 (3.6)	.0	.0 (.0)	17.8	8	87.8	41	.0	0
C32 T.m.laringe	5-64	1.4	1.2 (1.8)	.0	.0 (.0)	3.0	1	25.6	13	.0	0
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	1.4	1.2 (1.7)	.0	.0 (.0)	8.7	4	35.0	16	.0	0
C67 T.m.vescica	5-64	18.7	16.3 (6.4)	2.9	2.4 (2.4)	73.2	31	313.4	150	33.5	15
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	2.9	2.5 (2.5)	.0	.0 (.0)	11.7	5	66.2	33	.0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	4.3	4.4 (3.7)	.0	.0 (.0)	140.5	49	165.1	64	.0	0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	14.4	12.7 (5.7)	5.9	4.9 (3.5)	89.8	38	241.2	116	29.6	13
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	4.3	3.7 (3.0)	1.5	1.2 (1.7)	54.2	24	101.2	49	8.4	4
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	45.7	36.7 (8.2)	29.7	18.7 (5.6)	514.1	199	672.2	293	305.2	100
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	10.9	8.9 (4.1)	8.2	8.0 (4.4)	160.6	64	205.5	91	222.3	66
-X60-X84 Suicidi	0-75+	10.9	8.8 (4.1)	3.1	2.5 (2.1)	137.0	48	176.6	70	67.4	28
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	2.2	2.0 (2.1)	1.0	1.0 (1.5)	24.5	10	44.2	20	15.5	6
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.											
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	7.2	6.1 (3.9)	23.6	19.6 (6.9)	64.4	29	152.6	76	205.0	88
C43-C44 T.m.pelle	5-64	7.2	6.1 (3.9)	7.4	6.3 (4.0)	64.4	29	152.6	76	86.2	36
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	1.5	1.2 (1.7)	.0	0	.0	0	30.7	14
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	14.7	12.1 (5.4)	.0	0	.0	0	88.1	38
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	-	.0	0
										7.2	4
III GRUPPO:assist.osp.territ											
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	37.5	33.0 (9.2)	20.6	17.6 (6.7)	359.5	141	853.0	396	230.7	88
-B24 AIDS	5-64	5.8	5.0 (3.5)	4.4	3.7 (3.0)	153.9	56	220.9	93	60.6	26
C62 T.m.testicolo	5-64	2.9	2.4 (2.5)	1.5	1.2 (1.7)	47.3	20	64.2	30	30.7	14
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	.0	0	-	-
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
I10-I15 Ipertensione	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	24.0	13	.0	0
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	24.5	21.5 (7.4)	11.8	9.8 (4.9)	152.4	64	455.6	220	69.6	30
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	1.4	1.3 (1.9)	.0	.0 (.0)	15.8	6	29.4	14	.0	0
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	1.4	1.2 (1.8)	1.5	1.2 (1.7)	3.0	1	43.9	21	2.9	1
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
K80-K82 Colecit.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0	0
Screening di popolazione											
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	54.2	46.3 (12.1)	19.8	18.4 (8.1)						
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	57.7	55.9 (15.5)						
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)						

TABELLA A115. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n. 4 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Maschi.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	0	0	0	4	9	4	8	10	11	8	13	31	51	65	100	149	152	172	787
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	5	3	4	0	20
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	5	11	9	2	38
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	9	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	5	14	23	30	43	43	40	221
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	4	17	18	7	57
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	1	3	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	8	9	24	55	62	122	287
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	5	4	4	12	7	5	47
V01-Y99 Cause esterne mortal	0	0	0	4	8	1	3	5	4	2	3	5	7	5	5	11	13	21	97
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	0	2	8	0	0	2	1	1	2	2	1	2	2	4	3	3	33
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	1	0	1	2	2	2	0	1	2	3	1	2	3	5	4	29
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	11	19	18	32	24	20	134
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	9	17	14	29	24	18	118
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	3	0	2	15	
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	8	10	19	35	64	92	128	157	240
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	2	2	7	6	10	7	39
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
C62 T.m.testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	7	5	9	8	437
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	5	8	10	11	72
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	8	15	20	41	53	68	82	421
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	3	3	9	9	22	52
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	11	20	34	47
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	4	10
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	7

TABELLA A116. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n. 4 -

Numero dei decessi registrati nella popolazione residente, per eta' e per causa. Femmine.

CAUSA	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE
I GRUPPO: prevenzione primaria	1	0	1	1	1	0	5	1	1	3	7	15	13	29	46	76	135	269	604
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	2	1	8
C22 T.m.fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	4	4	1	15
C32 T.m.laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	3	14	9	8	13	3	60
C67 T.m.vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8
F10 Alcoolismo psic.alco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	5	24	50	96	229	413
K70-K76 Cirrosi epatica	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	2	6	2	6	7	4	31
V01-Y99 Cause esterne mortal	1	0	0	1	1	0	3	1	0	1	1	4	2	2	7	5	11	27	67
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	7
-X60-X84 Suicidi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	2	0	0	0	8
-X85-Y09 Omicidi	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.	0	0	0	0	0	0	2	0	4	10	12	8	19	28	20	33	47	39	222
C18-C21 T.m.colon-retto	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	0	6	4	7	20	20	22	89
C43-C44 T.m.pelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	5	3	14
C50 T.m.mammella	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	6	5	10	19	8	8	16	92
C53 T.m.collo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3
C54 T.m.corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3
C55 T.m.utero n.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	5	3	5	1	21
III GRUPPO: assist.osp.territ	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	10	7	10	20	43	107	132	368	703
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	4	7	18	17	50	
-B24 AIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C81 Malattia di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C91-C95 Leucemie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	4	10	5	3	28
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5
I10-I15 Ipertensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	7	13	19	70	114
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	3	5	12	22	57	70	185	362
J10-J22 Mal.respirat.acute	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	4	3	11	37	60
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	14	7	45	70
K25-K28 Ulcera peptica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	6	9
K35-K38 Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
K40-K46 Ernia addominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
K80-K82 Colecist.acuta e cro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
000-O99 Gravid.parto puerper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Appendice

TABELLA A117. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL n.4 -

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	# <75 anni	# <65 anni	# <75 anni
I GRUPPO:prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	93.5	83.3 (9.8)	29.9	25.2 (5.2)	1322.2	1084 2195.4	2198	414.8 351 707.8
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	3.8	3.1 (1.8)	1.2	1.0 (1.0)	25.6	25 60.2	69	12.9 13 21.7
C22 T.m.fegato	5-64	2.5	2.1 (1.4)	1.9	1.5 (1.2)	12.6	13 55.4	65	8.5 9 26.6
C32 T.m.laringe	5-64	1.3	1.0 (1.0)	.6	.5 (.6)	4.8	5 20.8	25	1.1 1 5.1
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	30.7	25.3 (5.1)	8.1	6.5 (2.5)	196.3	196 522.8	608	58.7 61 153.5
C67 T.m.vescica	5-64	3.1	2.6 (1.6)	.0	.0 (.0)	13.8	14 56.8	66	.0 0 .6
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 .0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	6.9	6.7 (2.9)	.0	.0 (.0)	208.2	176 245.9	231	.0 0 .0
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	9.4	7.7 (2.8)	5.6	4.7 (2.2)	53.4	54 161.2	193	65.1 51 127.5
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	9.4	7.8 (2.8)	3.7	3.1 (1.7)	91.2	91 171.2	196	45.4 45 85.4
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	45.3	40.0 (6.0)	28.9	16.9 (3.3)	716.4	510 900.7	745	223.0 171 287.4
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	15.4	15.7 (4.1)	3.0	3.4 (1.9)	443.6	286 528.9	391	109.9 69 132.7
-X60-X84 Suicidi	0-75+	13.6	11.3 (3.0)	3.4	2.8 (1.4)	170.3	143 227.5	219	33.0 34 55.3
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.5	.4 (.5)	1.7	1.5 (1.0)	12.6	14 15.6	19	35.8 36 45.9
									51
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	13.2	10.7 (3.3)	34.3	27.6 (5.2)	67.7	69 227.8	268	288.0 294 588.4
C21 C21 T.m.colon-retto	5-64	10.0	8.1 (2.8)	10.0	8.1 (2.8)	46.3	48 176.6	209	91.0 93 167.4
C43-C44 T.m.pelle	5-64	2.5	2.1 (1.4)	1.9	1.5 (1.1)	20.2	20 45.8	53	12.9 14 27.0
C50 T.m.mammella	5-64	.6	.5 (.7)	18.1	14.6 (3.8)	1.2	1 5.3	6	156.3 159 324.7
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.6	.5 (.7)	-	-	-	6.3 6 13.0
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.6	.5 (.7)	-	-	-	6.3 6 13.0
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	3.1	2.4 (1.5)	-	-	-	15.2 16 43.3
									55
III GRUPPO:assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	52.1	43.2 (6.7)	20.6	17.0 (4.2)	397.6	391 1004.7	1161	183.4 171 393.7
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	4.4	3.7 (1.9)	1.9	1.5 (1.2)	54.2	54 92.4	105	13.0 14 29.7
-B24 AIDS	5-64	1.9	1.6 (1.3)	.0	.0 (.0)	19.7	19 31.7	34	.0 0 .0
C62 T.m.testicolo	5-64	.6	.5 (.6)	-	- (-)	12.6	14 16.3	20	- - -
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	15.4	15 57.8	68	16.9 18 40.4
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0 0 .6
I10-I15 Ipertensione	5-64	6.3	5.2 (2.3)	2.5	2.0 (1.4)	40.4	40 103.0	119	16.9 18 39.4
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	32.6	27.2 (5.3)	10.0	8.1 (2.8)	244.2	238 625.3	718	73.4 75 182.6
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	3.8	3.1 (1.7)	2.5	2.4 (1.8)	24.8	25 60.7	70	55.7 40 76.6
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	1.3	1.0 (1.0)	.6	.5 (.6)	2.4	3 35.0	45	1.1 1 11.3
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.6	.5 (.7)	.6	.5 (.7)	3.6	4 12.3	15	6.3 6 13.0
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	0 0 0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	1	.0 0 0
K80-K82 Colenist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	.7	1 .0 0
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	0 0 0
									0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	65.6	61.0 (9.1)	26.3	24.3 (5.8)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	65.4	63.5 (10.5)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.8	.8 (.7)				

Appendice

TABELLA A118. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 4 DSB 1

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		MASCHI		FEMMINE	
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	----tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni	----tassi standard. YPLL--- <65 anni	# <75 anni
I GRUPPO: prevenzione primaria									
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	92.3	81.3 (12.8)	29.8	25.0 (6.8)	1309.9	619	2130.7	1224
C22 T.m.fegato	5-64	2.2	1.8 (1.9)	2.1	1.8 (1.8)	27.0	15	54.3	35
C32 T.m.laringe	5-64	1.1	.8 (1.2)	2.1	1.7 (1.7)	2.0	1	30.0	21
C33-C34 T.m.trach bronch.pol	5-64	1.1	.8 (1.2)	1.1	.8 (1.1)	2.0	1	16.0	11
C67 T.m.vescica	5-64	39.1	31.8 (7.5)	7.5	6.0 (3.2)	240.0	138	606.1	403
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	5.4	4.6 (3.0)	.0	.0 (.0)	140.4	79	167.1	104
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	7.6	6.0 (3.3)	4.3	3.9 (2.9)	36.2	21	110.1	76
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	9.8	7.9 (3.7)	2.1	1.7 (1.7)	87.0	51	159.2	106
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	42.4	39.0 (8.1)	30.4	17.9 (4.4)	761.4	305	933.8	433
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	16.3	17.3 (5.8)	3.7	3.6 (2.5)	505.7	179	597.8	243
-X60-X84 Suicidi	0-75+	12.2	10.0 (3.7)	3.7	2.8 (1.8)	143.7	85	198.1	130
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	2.2	2.1 (1.7)	.0	0	.0	0
							0	59.8	36
							0	76.8	51
II GRUPPO: diagnosi prec.e ter.									
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	9.8	7.8 (3.7)	40.5	32.0 (7.4)	48.6	29	195.1	133
C43-C44 T.m.pelle	5-64	7.6	6.1 (3.3)	10.7	8.5 (3.8)	40.4	24	159.0	108
C50 T.m.mammella	5-64	2.2	1.7 (1.7)	3.2	2.5 (2.0)	8.2	5	36.1	25
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	.0	.0 (.0)	19.2	15.2 (5.1)	.0	0	.0	0
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	1.1	.9 (1.3)	-	-	-	10.7
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	1.1	.9 (1.3)	-	-	-	6
				5.3	4.1 (2.6)	-	-	-	22.4
						-	-	-	15
						-	-	-	25.6
						-	-	-	16
						-	-	-	66.0
						-	-	-	49
III GRUPPO: assist.osp.territ									
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	57.5	47.3 (9.2)	18.1	14.9 (5.2)	417.1	234	1043.9	688
-B24 AIDS	5-64	4.3	3.7 (2.7)	2.1	1.6 (1.6)	59.5	33	96.0	60
C62 T.m.testicolo	5-64	1.1	.9 (1.4)	.0	.0 (.0)	20.8	11	27.2	16
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	24.8	14	69.1	45
I10-I19 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
I10-I15 Ipertensione	5-64	9.8	8.0 (3.8)	2.1	1.7 (1.7)	69.0	39	161.1	105
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	32.6	26.8 (7.0)	8.5	6.7 (3.3)	241.5	135	614.0	404
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	4.3	3.4 (2.4)	2.1	2.4 (2.6)	12.2	8	47.2	33
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	2.2	1.6 (1.7)	.0	.0 (.0)	4.0	3	37.6	28
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	1.1	.8 (1.2)	1.1	.9 (1.3)	6.2	4	15.8	11
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	1.3	1
K80-K82 Colecit.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	1.3	1
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0
						-	-	-	0
Screening di popolazione									
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	58.9	55.6 (11.6)	31.4	29.1 (8.4)				
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	60.6	59.6 (13.4)				
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	1.4	1.4 (1.3)				

Appendice

TABELLA A119. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 4 DSB 2

Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI		FEMMINE		----tassi <65 anni	# <75 anni	MASCHI	FEMMINE		# <75 anni
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)				standard. YPLL---	standard. YPLL---	
I GRUPPO:prevenzione primaria											
C00-C15	T.m.prime vie aer-di	5-64	69.2	63.9 (18.2)	34.9	31.4 (12.7)	999.7	178	1819.4	421	553.3
		5-64	2.7	2.2 (3.2)	.0	.0 (.0)	5.3	1	27.1	8	.0
C22	T.m.fegato	5-64	2.7	2.2 (3.2)	2.7	2.2 (3.1)	5.3	1	51.6	14	5.2
C32	T.m.laringe	5-64	2.7	2.1 (3.1)	.0	.0 (.0)	15.5	4	32.7	9	.0
C33-C34	T.m.trach bronch.pol	5-64	10.6	8.8 (6.3)	8.1	6.7 (5.5)	82.1	20	322.7	93	47.9
C67	T.m.vescica	5-64	2.7	2.2 (3.2)	.0	.0 (.0)	5.3	1	54.5	15	.0
F10	Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
F11-F19	Farmacodipendenza	5-64	5.3	5.3 (5.4)	.0	.0 (.0)	146.9	28	178.7	38	.0
I60-I69	Dist.circol.encefalo	5-64	13.3	11.1 (7.1)	8.1	6.4 (5.3)	67.4	16	221.1	63	45.5
K70-K76	Cirrosi epatica	5-64	5.3	4.3 (4.4)	5.4	4.9 (4.9)	51.4	13	145.5	43	150.7
V01-Y99	Cause esterne mortal	0-75+	47.3	40.3 (12.4)	26.0	17.3 (7.7)	620.3	94	784.9	141	304.1
-V01-V99	Incidenti mezzi tras	0-75+	11.8	11.9 (7.4)	3.7	5.2 (5.6)	356.6	51	412.4	68	213.6
-X60-X84	Suicidi	0-75+	17.7	14.6 (7.4)	3.7	3.7 (3.7)	217.1	31	272.8	48	90.5
-X85-Y09	Omicidi	0-75+	.0	.0 (.0)	1.9	1.0 (1.4)	.0	0	.0	0	.0
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.											
C18-C21	T.m.colon-retto	5-64	16.0	13.4 (7.8)	16.1	13.4 (7.7)	62.6	15	225.1	61	194.6
		5-64	13.3	11.2 (7.1)	2.7	2.1 (3.0)	57.3	14	200.9	55	35.2
C43-C44	T.m.pelle	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
C50	T.m.mammella	5-64	2.7	2.2 (3.2)	13.4	11.2 (7.1)	5.3	1	24.2	6	159.4
C53	T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	.0	.0
C54	T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	.0	.0
C55	T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	-	-	.0	12.2
III GRUPPO:assist.osp.territ											
A00-B99	Mal.batt.vir.parassi	5-64	42.6	35.9 (12.7)	16.1	13.6 (7.9)	339.6	80	864.2	239	171.6
		5-64	8.0	6.7 (5.5)	.0	.0 (.0)	88.7	21	144.0	39	.0
-B24	AIDS	5-64	5.3	4.5 (4.6)	.0	.0 (.0)	32.7	8	68.9	18	.0
C62	T.m.testicolo	5-64	.0	.0 (.0)	-	- (-)	.0	0	2.9	1	-
C81	Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
C91-C95	Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	49.9	15	27.5
I00-I09	Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
I10-I15	Ipertensione	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	8.7	4	.0
I20-I25	Mal.ischemiche cuore	5-64	31.9	27.0 (11.0)	13.4	11.3 (7.2)	215.0	50	574.1	156	144.0
J10-J22	Mal.respirat.acute	5-64	2.7	2.1 (3.1)	.0	.0 (.0)	35.9	9	54.1	15	.0
J40-J47	Broncopn.cron.ostrut	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	30.3	9	.0
K25-K28	Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
K35-K38	Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
K40-K46	Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
K80-K82	Colecist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
O00-O99	Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0	.0	0	.0
Screening di popolazione											
C18-C21	T.m.colon-retto	50-74	67.7	62.3 (19.2)	17.5	14.9 (9.3)					
C50	T.m.mammella	50-69	-	- (-)	58.5	54.6 (20.0)					
C53	T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)					

Appendice

TABELLA A120. REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE. 2003-2004.
ASL 4 DSB 3


Tasso di mortalita' evitabile grezzo(AMR) e stand.(SAMR), tassi stand., numero (#) di Anni di Vita Potenz.Persi(YPLL) per 100.000 resid.,per causa.

CAUSA	classi di eta'	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		AMR	SAMR(E.S.)	AMR	SAMR(E.S.)	<65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	# <65 anni	tassi standard. YPLL--	# <75 anni	#	
I GRUPPO:prevenzione primaria	5-64	127.9	112.4 (26.2)	24.0	19.0 (10.2)	1783.5	288 2872.3	553	361.9	50	636.6	124	
C00-C15 T.m.prime vie aer-di	5-64	10.1	8.2 (6.7)	.0	.0 (.0)	45.8	9 119.2	26	.0	0	2.8	1	
C22 T.m.fegato	5-64	6.7	5.5 (5.5)	.0	.0 (.0)	52.2	10 135.1	30	.0	0	.0	0	
C32 T.m.laringe	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 20.2	5	.0	0	.0	0	
C33-C34 T.m.trach.bronch.pol	5-64	30.3	24.8 (11.7)	10.3	8.2 (6.7)	204.1	39 509.6	113	71.3	14	155.0	35	
C67 T.m.vescica	5-64	6.7	5.4 (5.5)	.0	.0 (.0)	25.7	5 73.5	16	.0	0	2.8	1	
F10 Alcoolismo psic.alco	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0	.0	0	
F11-F19 Farmacodipendenza	5-64	13.5	14.7 (10.7)	.0	.0 (.0)	502.5	70 582.1	90	.0	0	.0	0	
I60-I69 Dist.circol.encefalo	5-64	10.1	8.2 (6.7)	6.9	5.4 (5.4)	83.7	16 234.3	54	12.8	3	106.9	29	
K70-K76 Cirrosi epatica	5-64	13.5	11.2 (8.0)	6.9	5.4 (5.4)	151.9	28 234.4	48	12.8	3	72.6	16	
V01-Y99 Cause esterne mortal	0-75+	51.8	42.9 (13.8)	27.5	13.7 (6.8)	717.6	111 963.4	171	265.1	31	296.5	41	
-V01-V99 Incidenti mezzi tras	0-75+	17.3	15.9 (8.9)	.0	.0 (.0)	380.5	56 482.9	81	.0	0	.0	0	
-X60-X84 Suicidi	0-75+	12.3	10.6 (7.0)	2.3	1.8 (2.6)	181.3	26 246.0	41	.0	0	14.7	4	
-X85-Y09 Omicidi	0-75+	2.5	2.3 (3.3)	.0	.0 (.0)	75.4	14 93.3	19	.0	0	.0	0	
II GRUPPO:diagnosi prec.e ter.	5-64	20.2	16.3 (9.5)	37.7	30.9 (13.2)	128.7	25 328.5	74	375.5	69	695.3	150	
C18-C21 T.m.colon-retto	5-64	13.5	10.9 (7.7)	17.1	13.8 (8.8)	51.4	10 204.3	46	189.7	36	293.4	63	
C43-C44 T.m.pelle	5-64	6.7	5.4 (5.5)	.0	.0 (.0)	77.3	15 124.2	28	.0	0	.0	0	
C50 T.m.mammella	5-64	.0	.0 (.0)	20.6	17.1 (9.9)	.0	0 0	0	185.8	33	396.3	85	
C53 T.m.collo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	- -	-	.0	0	.0	0	
C54 T.m.corpo dell'utero	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	- -	-	.0	0	.0	0	
C55 T.m.utero n.s.	5-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)	-	- -	-	.0	0	5.6	3	
III GRUPPO:assist.osp.territ	5-64	47.1	38.6 (14.6)	34.3	27.4 (12.3)	408.3	78 1047.2	235	221.9	43	622.1	148	
A00-B99 Mal.batt.vir.parassi	5-64	.0	.0 (.0)	3.4	2.8 (4.0)	.0	0 23.8	6	33.5	6	60.3	14	
-B24 AIDS	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0	.0	0	
C62 T.m.testicolo	5-64	3.4	2.9 (4.1)	-	- (-)	75.4	14 93.3	19	-	-	-	-	
C81 Malattia di Hodgkin	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0	.0	0	
C91-C95 Leucemie	0-14	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	6.4	1 32.7	8	6.4	1	52.1	14	
I00-I09 Cardiopat.reumat.cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0	2.8	1	
I10-I15 Ipertensione	5-64	3.4	2.7 (3.9)	6.9	5.5 (5.5)	6.4	1 45.7	10	52.3	10	109.0	24	
I20-I25 Mal.ischemiche cuore	5-64	33.7	27.6 (12.4)	10.3	8.3 (6.7)	275.7	53 703.6	158	46.2	9	208.5	53	
J10-J22 Mal.respirat.acute	5-64	3.4	2.6 (3.8)	6.9	5.4 (5.4)	44.3	9 100.1	23	77.1	15	131.1	29	
J40-J47 Broncopn.cron.ostrut	5-64	.0	.0 (.0)	3.4	2.7 (3.8)	.0	0 31.0	9	6.4	1	43.6	10	
K25-K28 Ulcera peptica	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 16.6	4	.0	0	14.7	4	
K35-K38 Appendicite	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0	.0	0	
K40-K46 Ernia addominale	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0	.0	0	
K80-K82 Colenist.acuta e cro	5-64	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0	.0	0	
O00-O99 Gravid.parto puerper	15-49	.0	.0 (.0)	.0	.0 (.0)	.0	0 0	0	.0	0	.0	0	
Screening di popolazione													
C18-C21 T.m.colon-retto	50-74	82.6	75.8 (23.3)	20.9	20.4 (12.4)								
C50 T.m.mammella	50-69	-	- (-)	89.6	86.0 (28.0)								
C53 T.m.collo dell'utero	25-64	-	- (-)	.0	.0 (.0)								



Le Monografie Vol 2

Documento di **V**alutazione sui determinanti di **S**alute e sulle **S**trategie del servizio sanitario regionale



Regione Umbria

Assessorato Sanità

Direzione Sanità
e Servizi Sociali

S e r v i z i o II

MONOGRAFIA 1: Umbria: situazione demografica e stima della non autosufficienza negli anziani

MONOGRAFIA 2: La mortalità evitabile in Umbria. 1994 - 2004

Edito da:



Via M. Angeloni 61 - 06124 Perugia
tel. 075 5056987 - fax 075 5058796
e-mail: info@sedes.it
www.sedes.it

Finito di stampare nel mese di Agosto 2006